GBR 40™

Gibberellic Acid 40% WSG

(Plant Growth Regulator)

Read Leaflet Before Use.

The formulation contains Gibberellic acid effective as plant growth regulator used in Grape and Paddy.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in water (Liter)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each Application (In Hours)
		A.I. (PPM)	Formulation (Gram)			
Grape	Pre-bloom-elongation	40	50	500	-	-
	Fruit setting - thinning	40	50	500	-	-
	6-7 mm berry size enlargement	40	50	500	-	-
Rice	20-25 days after transplanting	20-25	50-62.5	500	-	-
	At panicle emergence	20-25	50-62.5	500	-	-

Direction of Use: Measure the requisite quantity of the Gibberellic acid 40% WSG and mix it well with small quantity of water with proper stirring using wooden stick and then add the remaining quantity of water as specified while stirring vigorously.

Time of Application: In grape spray Gibberellic acid 40% WSG at recommended does before flowering and after fruit setting for proper fruit setting and fruit enlargement.

Precautions: 1. Keep away from foodstuff, empty foodstuff container and animal feedstuff. 2. Avoid inhalation of spray mist and contact with mouth, skin and eye. 3. Wear protective clothing such as mask, goggles, boots while spraying and do not expose to spray drift spray in the direction of wind. 4. Do not blow nozzles with mouth. 5. Clean spray sprayer, buckets and other utensils with water after use. 6. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 7. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.

Symptoms of Poisoning: Nausea, vomiting, stomach pain, giddiness, tremor, headache and skin and eye irritation.

First Aid: 1. If ingested - If swallowed, induced vomiting by tickling the back of throat. Seek medical attention, if required. 2. If inhaled - Move to clean and fresh air. Seek medical attention. 3. In case of skin contact - Wash thoroughly the affected part of body and clothes with soap and plenty of water. Seek medical attention. 4. In case of eye contact - Flush with copious amount of water. If irritation persists, seek medical attention.

Phytotoxicity:-

Antidote: No specific antidote. Treat symptomatically.

Disposal of Used Container: 1. The packages or surplus materials and washings from the machine and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environment and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent the re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions: 1. The packages containing Gibberellic acid 40% WSG should be stored in original packaging and separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles specially food stuff. It should be kept in separate almirah under lock and key depending upon the quantity and nature. 2. The rooms or premises meant for storing Gibberellic acid 40% WSG should be well lit, well built, cool and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Caution: Not to be used on crops other than those prescribed on label and leaflets. Destroy the container after use as directed on leaflet.

Chemical Composition:

Gibberellic acid a.i.	40.00 % w/w
Polysorbate 20	01.50 % w/w
Polyvinylpyrrolidone Agrimer 30	01.00 % w/w
Lactose	Q.S. %
Total	**100.00% w/w**

" DANGEROUS TO RE USE EMPTY CONTAINER "

Manufactured & Marketed by: **GHARDA CHEMICALS LIMITED**
Regd. Office: 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400 050.
Factory : Industrial Growth Centre, Phase II, Samba, (J&K) -184121

जीबीआर ४०

जिबरेलिक ऐसिड ४०% डब्लू.एस.जी.
(पौध विकास नियन्त्रक)

इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़े ।

इस फोर्मूले मे जिबरेलिक ऐसिड होता है, जो पौधो की वृद्धि के नियामक के समान प्रभावी है। इसे अंगूर और धान पर उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

उपयोग

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल कटाने के बीच अन्तराल (दिन)	पुन: प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
		स.तत्व (पी.पी. एम)	संरचना (ग्राम)			
अंगूर	फल आने से पहले लंबा होना	४०	५०	५००	-	-
	फल बनाना / पतला होना	४०	५०	५००	-	-
	६-७ मि.मि. बैरी का साईज बड़ होना	४०	५०	५००	-	-
धान	रोपाई के २०-२५ दिन बाद	२०-२५	५०-६२.५	५००	-	-
	पन्ना उद्भव पर	२०-२५	५०-६२.५	५००	-	-

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश: पहले पानी की थोडी सी मात्रा मे जिबरेलिक ऐसिड ४०% डब्लू.एस.जी. की सुझाई गयी मात्रा को अच्छी तरह से घोल ले, फिर पानी की बाकी मात्रा को अच्छी तरह लकडी के साथ घोलते हुए मिला लें।

प्रयोग का समय: फल आने से पहले लंबा होने के लिए और फल धारना के बाद फसल बनना, पतला होना और फल का आकार बडा होने के लिए।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: १. खाद्यसामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचे। ३. प्रयोग के समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे जैसे की मास्क, चश्में, जुते पहनें। फुंवारा से बचें। ४. नोजल्स को मुंह से न फूके। ५ प्रयोग से बाद छिड़काव यंत्र, बाल्टीया व अन्य बर्तनों को अच्छी तरह धो लें। ६. छिड़काव के बाद दूषित कपडों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ७. छिड़काव करते समय खाना, पीना या धूम्रपान नही करना चाहिए।

विष के लक्षण: विष बाधा के लक्षणों में मितली, उल्टी, पेट में दर्द, चक्कर आना, कंपकंपी, सिरदर्द, आँखों और त्वचा में जलन हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा: १. निगले जाने पर - अगर निगल लिया हो तो गले के पिछले हिस्से में गुदगुदी करकर उल्टी कराए। डॉक्टर को बुलाइयें। २. सूंघे जाने पर - मरीज व्यक्ति को ताजी हवा में ले जाएं। ३. त्वचा के सम्पर्क में आने पर - दूषित कपड़ों को उतार दे तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोएं। ४. आँख के संपर्क मे आने पर - आँखों को १५ मिनट तक साफ पानी से अच्छी तरह छपछपायें।

पौधविशाक्तता: -

विष नाशक: कोई विशिष्ट विषनाशक नही है। लक्षणानुसार उपचार करें।

खाली डिब्बों का निपटारा: १. खाली डिब्बे तथा बचा हुआ घोल या छिड़काव यंत्रो का धोवन का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें। जिससे पीने का पानी तथा वातावरण प्रदूषित होने का डर न हों। २. उपयोग के बाद खाली डिब्बों को दुबारा उपयोग में न लाए, अत: बाहर खुला न छोडें। ३. खाली डिब्बों को उपयोग के बाद तोड कर आबादी से दूर जमीन मे गाड दें।

संग्रहण की शर्ते: १. इस उत्पाद रखें हुए डिब्बों / पैकेजस को अलग कमरों या उन कमरों या जगहों जिसमें अन्य वस्तुए रखी जाती है, उनसे दूर रखना चाहिए या अलग अलमारियों में ताला चाबी लगाकर खरपतवारनाशक की प्रमाण व प्रकार से हिसाब से रखें। २. जिस कमरें या अलमारी में उत्पाद का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सुखा, प्रकाशमय, हवादार तथा पर्याप्त आकार का होना चाहिए जिससे उत्पाद के भाप से वातावरण प्रदूषित होने का खतरा न रहें।

चेतावनी: इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। पत्रक पर दिए निर्देश अनुसार उपयोग के बाद खाली डिब्बों को नष्ट करें।

रासायनिक संरचना

जिबरेलिक ऐसिड स.त.	४०.००% भा/भा
पोलीसोरबेट २०	०१.५०% भा/भा
पालीविनाईलपायरोलीडोन एग्रीमर ३०	०१.००% भा/भा
लेक्टोस	पर्याप्त मात्रा %
कुल	**१००.००% भा/भा**

" खाली कंटेनर का दोबारा उपयोग करना खतरनाक है । "

निर्माता और विक्रेता: **घरडा केमिकल्स लिमिटेड,**
पंजी. कार्यालय: ४८ हिल रोड बांद्रा (प), मुंबई - ४०० ०५०, भारत.
फॅक्टरी: इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, फेज २, साम्बा, जम्मू-कश्मिर - १८४१२१.

जीबीआर ४०

जिबरेलिक आम्ल ४०% डब्ल्यू.एस.जी
(वनस्पती वाढ नियंत्रक)

वापरण्यापूर्वी माहिती पत्रक वाचा.

या मिश्रणामध्ये जिबरेलिक आम्ल आहे जे द्राक्ष आणि भातामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वनस्पतींच्या वाढीचे नियंत्रक म्हणून प्रभावी आहे.

शिफारस:

पीक	पिकाची अवस्था	मात्रा / हेक्टर		पाण्यात सौम्यीकरण (लिटर)	शेवटची फवारणी आणि कापणीच्या दरम्यान अंतर (दिवसांत)	प्रत्येक फवारणीनंतर पुन्हा प्रवेशाचा कालावधी (तास)
		स.घ. (पी.पी. एम)	द्रावण (लिटर)			
द्राक्ष	बहारापूर्वी पेरातील अंतर वाढणे	४०	५०	५००	-	-
	फळधारणा - विरळणी	४०	५०	५००	-	-
	६-७ म्मिी वेरीचा आकार वाढणे	४०	५०	५००	-	-
भात	लागवडीनंतर २०-२५ दिवस	२०-२५	५०-६२.५	५००	-	-
	लोंब्या येण्याच्या वेळी	२०-२५	५०-६२.५	५००	-	-

वापरासाठी निर्देश: जिबरेलिक आम्लाचे आवश्यक प्रमाण ४०% डब्ल्यू.एस.जी मोजा आणि लाकडी काठीचा वापर करून योग्य प्रकारे ढवळून थोड्या प्रमाणात पाण्यात चांगले मिसळा आणि नंतर जोरात हलवताना निश्चित केल्याप्रमाणे उरलेले पाणी घाला.

फवारणी करण्याची वेळ: द्राक्ष फवारणीमध्ये जिबरेलिक आम्ल 40% डब्ल्यू. एस.जी फुले येण्यापूर्वी आणि फळधारणा नंतर योग्य फळधारणेसाठी आणि फळांच्या वाढीसाठी शिफारस केली जाते.

खबरदारी: १. अन्नपदार्थ, रिकामे खाद्यपदार्थांच्या डब्ब्यांपासून आणि जनावरांच्या खाद्यापासून दूर ठेवा. २. स्प्रे धुक्याचा श्वास घेणे टाळा आणि तोंड, त्वचा आणि डोळ्याशी संपर्क टाळा. ३. फवारणी करताना मास्क, गॉगल, बूट यांसारखे संरक्षक कपडे घालावेत आणि वाऱ्याच्या दिशेने स्प्रे करू नये. ४. नॉझल्समध्ये तोंडाने हवा घालू नका. ५. स्प्रेचा स्प्रेअर, बादल्या व इतर भांडी वापरल्यानंतर पाण्याने स्वच्छ करा. ६. फवारणीनंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे काही भाग चांगले धुवावेत. ७. फवारणी करताना धूम्रपान, मद्यपान, खाऊ व काहीही चावू नये.

विषबाधाची लक्षणे: मळमळ, उलट्या, पोटदुखी, चक्कर येणे, थरथरणे, डोकेदुखी आणि त्वचा आणि डोळ्यांची जळजळ.

प्रथमोपचार: १. खाल्ल्यास - गिळल्यास घशाच्या मागील बाजूस गुदगुल्या करून उलट्या काढा. आवश्यक असल्यास वैद्यकीय मदत घ्या.

२. श्वासावाटे आत गेल्यास - स्वच्छ आणि ताज्या हवेमध्ये जा. वैद्यकीय मदत घ्या. ३. त्वचेशी संपर्क झाल्यास - शरीराचा आणि कपड्यांचा प्रभावित भाग साबणाने आणि भरपूर पाण्याने स्वच्छ धुवा. वैद्यकीय मदत घ्या. ४. डोळ्यांशी संपर्क झाल्यास - मुबलक प्रमाणात पाण्याने फ्लश करा. जर चिडचिड कायम राहिली तर वैद्यकीय मदत घ्या.

फायटोटॉक्सिसिटी : -

उतारा: कोणताही विशिष्ट उतारा नाही. लक्षणात्मक उपचार करा.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट: १. पर्यावरण आणि जल प्रदूषण टाळण्यासाठी मशीन आणि कंटेनरमधील पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त सामग्री आणि धुतल्या नंतरच्या पाण्याचे सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावा. २. वापरलेली पॅकेजेस पुन्हा वापरण्यासाठी बाहेर ठेवू नका. ३. पॅकेजेस तोडून वस्तीपासून दूर गाडले पाहिजे.

साठवणुकीच्या अटी: १. जिबरेलिक आम्ल 40% डब्ल्यू.एस.जी असलेले पॅकेज मूळ पॅकेजिंगमध्ये संग्रहित करावेत आणि इतर वस्तू विशेषतः खाद्यपदार्थ ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या किंवा परिसरापासून दूर स्वतंत्र खोल्या किंवा परिसरामध्ये ठेवावे. प्रमाण आणि स्वरूपानुसार ते कुलूपबंद स्वतंत्र कपाटात ठेवावे. २. जिबरेलिक आम्ल 40% डब्ल्यू.एस.जी साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा परिसर चांगल्या प्रकारे उजळलेला, चांगला बांधलेला, थंड आणि हवेशीर असावा आणि बाष्पाने दूषित होऊ नये म्हणून पुरेसा मोठा असावा.

खबरदारी : लेबल व पत्रकांवर विहित केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापरू नये. पत्रकावर निर्देश दिल्याप्रमाणे वापरल्यानंतर कंटेनर नष्ट करा.

रासायनिक रचना:

जिबरेलिक आम्ल स.घ.	४०.००% भा/भा
पॉलीसोर्बेट २०	०१.५०% भा/भा
पॉलीविनाइलपायरोलिडोन एग्रीमर ३०	०१.००% भा/भा
लॅक्टोज	पुरेशा प्रमाणात %
एकूण	**१००.००% भा/भा**

" रिकामे कंटेनर पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे."

उत्पादन कर्ता व विक्रेता: **घरडा केमिकल्स लिमिटेड,**
रजी. कार्यालय: ४८ हिल रोड बांद्रा (प), मुंबई - ४०० ०५०. भारत.
फॅक्टरी: इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, फेज २, साम्बा, जम्मू-कश्मिर - १८४१२१.

જીબીઆર 40

જીબરેલીક એસિડ 40% ડબ્લ્યુ.એસ.જી
(પ્લાન્ટ ગ્રોથ રેગ્યુલેટર)

વાપરતાં પહેલાં પત્રિકા વાંચો.

દ્રાક્ષ અને ડાંગરમાં વપરાતા છોડના ગ્રોથ રેગ્યુલેટર તરીકે અસરકારક જીબરેલીક એસિડનો સમાવેશ થાય છે.

ભલામણ:

પાક(ઓ)	કીટક નું સામાન્ય નામ	ડોઝ/હેક્ટર		મિશ્રણ પાણીમાં (લિટર)	છેલ્લા સ્પ્રે અને લણણી ની વચ્ચે નો સમયગાળો (દિવસ)	ફરીથી પ્રવેશ નો સમયગાળો દરેક અરજી પછી (કલાકોમાં)
		એ.આઈ. (પીપીએમ)	સંયોજન (ગ્રામ)			
દ્રાક્ષ	પૂર્વ-મોર-વિસ્તરણ	40	50	500	-	-
	ફળ સેટિંગ - પાતળું	40	50	500	-	-
	6-7 મીમી બેરીના કદમાં વધારો	40	50	500	-	-
ડાંગર	રોપણી પછી 20-25 દિવસ	20-25	50-62.5	500	-	-
	પેનિકલના ઉદભવ સમયે	20-25	50-62.5	500	-	-

ઉપયોગની દિશા: જીબરેલીક એસિડ 40% ડબ્લ્યુ.એસ.જી ના જરૂરી જથ્થાને માપી અને તેને લાકડીનો ઉપયોગ કરીને યોગ્ય રીતે હલાવી થોડા પ્રમાણમાં પાણી સાથે સારી રીતે ભેળવી દો અને પછી જોરથી હલાવતા વખતે ઉલ્લેખિત પાણીનો બાકીનો જથ્થો ઉમેરો.

અરજીનો સમય: દ્રાક્ષમાં જીબરેલીક એસિડ 40% ડબ્લ્યુ.એસ.જી નું વપરાશ ફળ ઉગતા પહેલા અને ફળ સેટિંગ પછી યોગ્ય ફળ સેટિંગ અને ફળના વિસ્તરણ માટે થાય છે.

સાવચેતીનાં પગલાં: 1. ખાદ્યપદાર્થો, ખાદ્યપદાર્થોના ખાલી પાત્રો અને પ્રાણીઓના ખોરાકથી દૂર રહો. 2. સ્પ્રે મિસ્ટને શ્વાસમાં લેવાનું ટાળો સાથેજ મોં, ચામડી અને આંખ સાથે સંપર્ક ટાળો. 3. બૂટ જેવા રક્ષણાત્મક વસ્ત્રો પહેરો અને પવનની દિશામાં સ્પ્રે ડ્રિફ્ટ સ્પ્રેના સંપર્કમાં ન આવશો. 4. મોં વડે નોઝલ ફૂંકશો નહીં. 5. ઉપયોગ કર્યા પછી સ્પ્રે સ્પ્રેયર, ડોલ અને અન્ય વાસણોને પાણીથી સાફ કરો. 6. છંટકાવ કર્યા પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરના ભાગોને સારી રીતે ધોઈ લો. 7. છંટકાવ કરતી વખતે ધૂમ્રપાન, પીવું, ખાવું અને ચાવવું નહીં.

ઝેરના લક્ષણો: ઉબકા, ઉલટી, પેટમાં દુખાવો, ચક્કર, ધ્રુજારી, માથાનો દુખાવો અને ત્વચા અને આંખમાં બળતરા.

પ્રાથમિક સારવાર: 1. જો ગળી જવાય તો - જો ગળી જાય, તો ગળાના પાછળના ભાગમાં ગલીપચી કરીને ઉલટી કરાવવાનો પ્રયાસ કરવો. જો જરૂરી હોય તો, ડોક્ટરની સહાય મેળવો. 2. જો શ્વાસ લેવામાં આવે તો - સ્વચ્છ અને તાજી હવામાં ખસેડો. ડોક્ટરની સહાય મેળવો. 3. ત્વચાના સંપર્કના કિસ્સામાં - શરીરના અસરગ્રસ્ત ભાગ અને કપડાંને સાબુ અને પુષ્કળ પાણીથી સારી રીતે ધોઈ લો. ડોક્ટરની સહાય મેળવો. 4. આંખના સંપર્કના કિસ્સામાં - પુષ્કળ પ્રમાણમાં પાણીથી ફ્લશ કરો. જો બળતરા ચાલુ રહે, તો ડોક્ટરની સહાય મેળવો.

ફાયટોટોક્સિસિટી : -

મારણ: કોઈ ચોક્કસ મારણ નથી. લક્ષણો પ્રમાણે સારવાર કરો.

વપરાયેલ કન્ટેનરનો નિકાલ: 1. મશીન અને કન્ટેનરમાંથી પેકેજો અથવા વધારાની સામગ્રી ને, ધોઈ ને સલામત રીતે નિકાલ કરવામાં આવશે જેથી પર્યાવરણ અને જળ પ્રદૂષણને અટકાવી શકાય. 2. પુનઃઉપયોગને રોકવા માટે વપરાયેલ પેકેજોને બહાર છોડવામાં આવશે નહીં. 3. પેકેજ તોડી નાખવામાં આવશે અને રહેઠાણથી દૂર દાટી દેવામાં આવશે.

સ્ટોરેજ શરતો: જીબરેલીક એસિડ 40% ડબ્લ્યુ.એસ.જી ધરાવતાં પેકેજો મૂળ પેકેજિંગમાં સંગ્રહિત હોવા જોઈએ અને અન્ય વસ્તુઓ ખાસ કરીને ખાદ્ય સામગ્રી સંગ્રહિત કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ઓરડાઓ અથવા પરિસરથી અલગ રૂમ અથવા પરિસરમાં સંગ્રહિત હોવા જોઈએ. જથ્થા અને પ્રકૃતિના આધારે તેને તાળા અને ચાવી હેઠળ અલગ અલમિરાહમાં રાખવું જોઈએ.

જીબરેલીક એસિડ 40% ડબ્લ્યુ.એસ.જી સંગ્રહિત કરવા માટેના ઓરડાઓ અથવા જગ્યા સારી રીતે પ્રકાશિત, સારી રીતે બાંધેલી, ઠંડી અને વેન્ટિલેટેડ અને વરાળથી દૂષિત થવાથી બચવા માટે પૂરતા પરિમાણના હોવા જોઈએ.

સાવધાની: લેબલ અને પત્રિકાઓ પર સૂચવવામાં આવેલ પાક સિવાય ઉપર ઉપયોગ ન કરવો. પત્રિકા પરના નિર્દેશ મુજબ ઉપયોગ કર્યા પછી કન્ટેનરનો નાશ કરો.

રાસાયણિક રચના:

જીબરેલીક એસિડ એઆઈ	40.00 % વ/વ
પોલિસોર્બેટ 20	01.50 % વ/વ
પોલીવિનાઈલપાયરોલીડોન એગ્રીમર 30	01.00 % વ/વ
લેક્ટોઝ	ક્યુ.એસ. %
કુલ	**100.00% વ/વ**

''ખાલી ડબ્બા ફરીથી ઉપયોગ કરવાનું ખતરનાક છે.''

ઉત્પાદક અને વેચાણકર્તા: **ઘરડા કેમિકલ્સ લિમિટેડ**
રજિ. ઑફિસ: 48, હિલ રોડ, બાંદ્રા (પ), મુંબઈ - 400 050/ ભારત.
ફેક્ટરી: ઈન્ડસ્ટ્રિયલ ગ્રોથ સેન્ટાર, ફેઝ-૨, સાંબા, (જમ્મુ-કાશ્મીર) - ૧૮૪૧૨૧.

ਜੀਬੀਆਰ 40

ਜ਼ਿਬਰੈਲਿਕ ਐਸਿਡ 40% ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.ਜੀ.
(ਪੌਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਿਕ)

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਪੜ ਲਓ।

ਇਸ ਸੂਤਰੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਬਰੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।

ਸਿਫਾਰਸ਼:

ਫਸਲ	ਪੌਦੇ ਦਾ ਪੜਾਅ	ਮਾਤਰਾ/ਹੈਕਟੇਅਰ		ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ (ਲੀਟਰ)	ਕਟਾਈ/ਤੁੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ (ਦਿਨ)	ਹਰ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ (ਘੰਟੇ)
		ਏ. ਆਈ. (ਪੀ.ਪੀ.ਐਮ.)	ਸੂਤਰੀਕਰਣ (ਗ੍ਰਾ.)			
ਅੰਗੂਰ	ਖਿੜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ	40	50	500	-	-
	ਫਲ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ - ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ	40	50	500	-	-
	ਬੇਰੀ ਦਾ ਆਕਾਰ 6-7 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਧਣਾ	40	50	500	-	-
ਝੋਨਾ	ਝੋਨਾ ਲੁਆਈ ਤੋਂ 20-25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ	20-25	50-62.5	500	-	-
	ਪੌਦੇ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਦਾ ਉਭਰਨਾ	20-25	50-62.5	500	-	-

ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਜ਼ਿਬਰੈਲਿਕ ਐਸਿਡ 40% ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.ਜੀ. ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਪੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਮਾਤਰਾ ਪਾਓ।

ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਅੰਗੂਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਬਰੈਲਿਕ ਐਸਿਡ 40% ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.ਜੀ. ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਫਲ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਲਈ ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨੀ: 1. ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। 2. ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਫੁਹਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਮੂੰਹ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। 3. ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸਕ, ਚਸ਼ਮਾ, ਬੂਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਓ। 4. ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨੋਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਨਾ ਮਾਰੋ। 5. ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਸਪਰੇਅਰ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। 6. ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। 7. ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਓ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਬਾਓ।

ਜ਼ਹਿਰ ਚੜਨ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਕੰਬਣੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਨ।

ਮੁੱਢਲਾ ਉਪਚਾਰ: 1. ਜੇਕਰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਗਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਉਲਟੀ ਕਰਵਾਉ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। 2. ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ - ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। 3. ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ - ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। 4. ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ - ਖੁੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੋ। ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜਲਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ।

ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: -

ਜ਼ਹਿਰ ਤੋੜ: ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਣ ਵੇਖ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਵਰਤੇ ਗਏ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: 1. ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਧੋਣ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ/ਪੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 2. ਪੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 3. ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: 1. ਜ਼ਿਬਰੈਲਿਕ ਐਸਿਡ 40% ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.ਜੀ. ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਵੱਖ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2. ਜ਼ਿਬਰੈਲਿਕ ਐਸਿਡ 40% ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.ਜੀ. ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮਰਾ ਚੰਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾੜ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨੀ: ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਚੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ।

ਰਸਾਇਣਕ ਸੰਰਚਨਾ:

ਜ਼ਿਬਰੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਏ.ਆਈ.	40.00% ਭ / ਭ
ਪੋਲੀਸੋਰਬੇਟ 20	01.50% ਭ / ਭ
ਪੋਲੀਵਿਨਾਇਲਪਾਏਰੋਲੀਡੋਨ ਅਗ੍ਰੀਮਰ 30	01.00% ਭ / ਭ
ਲੇਕਟੋਸ	ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ %
ਕੁੱਲ	**100%** ਭ / ਭ

''ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।''

ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ : **ਘਰਡਾ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ,**
ਰਜਿ. ਆਫ਼ਿਸ : 48 ਹਿੱਲ ਰੋਡ, ਬਾਂਦਰਾ (ਪੱ.), ਮੁੰਬਈ - 400050, ਭਾਰਤ।
ਫੈਕਟਰੀ : ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਗ੍ਰੋਥ ਸੈਂਟਰ, ਫੇਜ਼ II, ਸਾਂਬਾ, (ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ) . 184121

DIRECTION FOR USE

FOR AGRICULTURAL USE
कृषि उपयोग के लिए

Read Leaflet Before Use
इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

GBR 40™

Gibberellic Acid 40% WSG
(Plant Growth Regulator)

जीबीआर ४०

जिबरेलिक ऐसिड ४०% डब्लू.एस.जी.
(पौध विकास नियन्त्रक)

Manufactured & Marketed by:
GHARDA CHEMICALS LIMITED
Reg. Office: 48 Hill Road,
Bandra (W), Mumbai - 400 050.

For any complaints, contact Customer Care Executive at Gharda Chemicals Limited, 48, Hill Road, Bandra (W), Mumbai-400050,
Tel.: 022 66265998/66265999,
Email: consumercare@gharda.com
Website: www.gharda.com

TM - Trademark of Gharda Chemicals Limited

J.02.25-01

ஜிபிஆர் 40

ஜிபெரெலிக் அமிலம் 40% டபுள்யு எஸ் ஜி
(தாவர வளர்ச்சி சீரணி)

பரிந்துரை:

பயிர்(கள்)	பூச்சியின் பொது பெயர்	மருந்தளவு /ஹெக்டேர்		தண்ணீரின் அளவு (லிட்டர்)	கடைசி தெளிப்புக்கும் அறுவடைக்கும் இடையேயான காலம் (நாட்களில்)	ஒவ்வொரு தெளித்தலுக்குப் பிறகு மறுநுழைவு (மணிநேரத்தில்)
		எ ஐ (பிபிஎம்)	மருந்து (கிராம்)			
திராட்சை	பூ - பூக்கும் முன்	40	50	500	-	-
	பழம் வரும் போது	40	50	500	-	-
	பழத்தின் அளவு 6-7 மி.மீ இருக்கும்	40	50	500	-	-
நெற்பயிர்	நடவு செய்து 20-25 நாட்களுக்குப் பிறகு	20-25	50-62.5	500	-	-
	கதிர் வெளிப்படும் நேரத்தில்	20-25	50-62.5	500	-	-

வைக்கப்பட வேண்டும். 2. ஜிப்பெரெலிக் அமிலம் 40% டபுள்யு எஸ் ஜி சேமிப்பதற்கான அறைகள் அல்லது வளாகங்கள் நல்ல வெளிச்சம் உள்ள, நன்கு கட்டப்பட்ட, குளிர் மற்றும் காற்றோட்டம் மற்றும் நீராவியால் மாசுபடுவதைத் தவிர்க்க போதுமான அளவுடன் இருக்க வேண்டும்.

எச்சரிக்கை: இந்த லேபில் மற்றும் துண்டுபிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்களைத் தவிர மற்ற பயிர்களில் பயன்படுத்தக்கூடாது. துண்டுப்பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு கொள்கலனை அழிக்கவும்.

வேதியியல் கலவை:

ஜிபெரெலிக் அமிலம் எ ஐ .	40.00 % எ/எ
பாலிசார்பேட் 20	01.50 % எ/எ
பாலிவினைல்பைரோலிடோன் அக்ரிமர் 30	01.00 % எ/எ
லாக்டோஸ்	Q.S. %
மொத்தம்	**100.00% எ/எ**

''வெற்று கொள்கலனை பயன்படுத்துவது அபாயகரமனாது''

உற்பத்தி மற்றும் சந்தைப்படுத்துபவர்: கர்டா கெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட்
பதிவு அலுவலகம்: 48, ஹில் ரோடு, பாந்த்ரா (மே), மும்பை 400050, இந்தியா.
ஃபேக்டரி: இண்டஸ்ட்ரியல் குரோத் சென்டர், பேஸ் ஐஐ,
சம்பா, (ஜே அண்ட் கே) - 184121.

GBR 40

జిబ్బరెల్లిక్ యాసిడ్ 40% డబ్ల్యూఎస్‌జి
(మొక్క పెరుగుదల సహకారి)

సిఫారసు:

పంట(లు)	పిచికారి దశ	మోతాదు/హెక్టేరుకు		కలపవలసిన నీళ్ళు (లీటర్లు)	ఆఖరి పిచికారి నుంచి పంట కోతేంత వరకు వేచి ఉండవలసిన సమయం (రోజులు)	ప్రతివినియోగం తరువాత పునఃప్రవేశం (గంటల్లో)
		ఏ.ఐ (పిపిఎం)	సూత్రీకరణ (గ్రాము)			
ద్రాక్ష	పూత వికసించే దశ	40	50	500	-	-
	కాయ ఏర్పడే దశ	40	50	500	-	-
	6-7 మి.మీ. కాయ పెరుగుదల పరిమాణం ఉన్నప్పుడు	40	50	500	-	-
వరి	నాటిన 20-25 రోజుల తరువాత	20-25	50-62.5	500	-	-
	కంకి/వెన్ను ఆవిర్భావం సమయములో	20-25	50-62.5	500	-	-

ఉపయోగించేందుకు నిర్దేశనం: అవసరమైన పరిమాణములో జిబ్బరెల్లిక్ యాసిడ్ 40%

కాకుండా తగినంత వైశాల్యం కలిగి ఉండాలి.

హెచ్చరిక: లేబుల్ మరియు కరపత్రాలపై సూచించబడిన పంటలపై మాత్రమే ఉపయోగించాలి, వేరే పంటలపై ఉపయోగించకూడదు. కరపత్రములో సూచించిన విధంగా వినియోగము తరువాత డబ్బాను నాశనం చేయండి.

రసాయనిక సమ్మేళనము:

జిబ్బరెల్లిక్ యాసిడ్ ఏ.ఐ.	40.00 % బ/బ
పాలిసార్బేట్ 20	01.50 % బ/బ
పాలివినైల్పైర్రోలిడోన్అగ్రిమర్ 30	01.00 % బ/బ
లాక్టోస్	Q.S. %
మొత్తము	**100.00% బ/బ**

''ఖాళీ డబ్బాలని తిరిగి ఉపయోగించడం ప్రమాదం''

తయారీ మరియు మార్కెటింగ్ చేయువారు: ఘర్డా కెమికల్స్ లిమిటెడ్
రిజిస్టర్డు కార్యాలయం: 48, హిల్ రోడ్డు, బాంద్రా (వెస్ట్), ముంబయి– 400 050, ఇండియా.
కర్మాగారం: ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ సెంటర్, ఫేజ్ ఐఐ, సాంబ, (జమ్మూ-కాశ్మీర్) – 184 121.

ಜಿಬಿಆರ್ 40

ಗಿಬ್ಬರೆಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ 40% ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಜಿ
(ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ)

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ(ಗಳು)	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಮಾಣ/ಹೆಚ್ಎ		ತೆಳುಗೊಳಿಸಲು ನೀರು (ಲೀಟರ್)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲಿನ ದಿನಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)	ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಂಪಡಣೆಯ ನಂತರದ ಮರು-ಪ್ರವೇಶ (ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)
		ಸ.ಘ. (ಪಿಪಿಎಂ)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಲೀಟರ್)			
ದ್ರಾಕ್ಷಿ	ಹೂವು-ಹಿಗ್ಗುವ-ಮುನ್ನ	40	50	500	-	-
	ಹಣ್ಣಿನ ರಚನೆ - ತೆಳುವಾಗುವುದು	40	50	500	-	-
	6-7 ಮಿಮೀ ಬೆರ್ರಿ ಗಾತ್ರದ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ	40	50	500	-	-
ಭತ್ತ	ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 20-25 ದಿನಗಳ ನಂತರ	20-25	50-62.5	500	-	-
	ಪ್ಯಾನಿಕಲ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ	20-25	50-62.5	500	-	-

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ: ಗಿಬ್ಬರೆಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ 40% ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಜಿ ಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಮರದ ಕೋಲನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಕುತ್ತಾ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ

ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಳಕನ್ನು, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ, ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಮತ್ತು ಆವಿಯಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಾರದು. ಕರಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಧಾರಕವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಗಿಬ್ಬರೆಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸ.ಘ.	40.00 % ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಪಾಲಿಸೋರ್ಬೇಟ್ 20	01.50 % ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ಪಿರೋಲಿಡೋನ್ ಅಗ್ರಿಮರ್ 30	01.00 % ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್	Q.S. %
ಒಟ್ಟು	**100.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ**

''ಬರಿದಾದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳನ್ನು ಪುನ: ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.''

ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರು: ಘರ್ಡಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿ: 48 ಹಿಲ್ ರೋಡ್, ಬಾಂದ್ರಾ (ಪ), ಮುಂಬಯಿ – 400 050.
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ: ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಗ್ರೋಥ್ ಸೆಂಟರ್, ಫೆಜ್ 2, ಸಾಂಬಾ, ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ್ – 184121

ജിബിആർ 40

ജിബ്ബറെല്ലിക് ആസിഡ് 40% ഡബ്ല്യൂ എസ് ജി
(പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റർ)

ശുപാർശ:

വിള(കൾ)	കീടങ്ങളുടെ പൊതുനാമം	ഡോസേജ് / എച്ച് എ		വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കാൻ (ലിറ്റർ)	വിളവെടുപ്പിനുള്ള അവസാന സ്പ്രേയിലുള്ള കാത്തിരിപ്പ് കാലയളവ് (ദിവസങ്ങളിൽ)	ഓരോ പ്രയോഗത്തിനും ശേഷം വീണ്ടും എൻട്രി (മണിക്കൂറിൽ)
		എഐ (പിപിഎം)	ഫോർമുലേഷൻ (ഗ്രാം)			
മുന്തിരി	പൂവിടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നീളം	40	50	500	-	-
	പഴങ്ങളുടെ സെറ്റിംഗ് - കനംകുറഞ്ഞത്	40	50	500	-	-
	6-7 മില്ലീമീറ്റർ കായ വലിപ്പം വലുതാക്കൽ	40	50	500	-	-
നെല്ല്	നട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ് 20-25 ദിവസം	20-25	50-62.5	500	-	-
	പരിഭ്രാന്തിയുടെ ആവിർഭാവം	20-25	50-62.5	500	-	-

ഉപയോഗത്തിന്റെ ദിശ: ജിബ്ബെറെല്ലിക് ആസിഡിന്റെ ആവശ്യമായ അളവ് 40% ഡബ്ല്യൂ എസ് ജി അളക്കുക, ഒരു തടി വടി ഉപയോഗിച്ച് ശരിയായ

പരിസരങ്ങളോ നന്നായി പ്രകാശമുള്ളതും നന്നായി നിർമ്മിച്ചതും തണുത്തതും വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും നീരാവി മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ മതിയായ അളവുള്ളതുമായിരിക്കണം.

ജാഗ്രത: ലേബലിലും ലഘുലേഖകളിലും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നവ ഒഴികെയുള്ള വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. ലഘുലേഖയിൽ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം ഉപയോഗിച്ച ശേഷം പാത്രം നശിപ്പിക്കുക.

രാസവസ്തു കോമ്പോസിഷൻ:

ജിബ്ബറെലിക് ആസിഡ് എ.ഐ.	40.00 % ഡബ്ല്യൂ/ഡബ്ല്യൂ
പോളിസോർബേറ്റ് 20	01.50 % ഡബ്ല്യൂ/ഡബ്ല്യൂ
പോളി വിനൈൽ പൈറോളിഡോൺ അഗ്രിമർ 30	01.00 % ഡബ്ല്യൂ/ഡബ്ല്യൂ
ലാക്ടോസ്	ക്യൂ.എസ് %
ആകെ	**100.00% ഡബ്ല്യൂ/ഡബ്ല്യൂ**

"ଖାଲି କଣ୍ଟେନର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ"

ഉൽപാദനവും വിപണനവും: ഗർഡ കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ്,
രജി. ഓഫീസ്: 48, ഹിൽ റോഡ്, ബാന്ദ്ര (വെ) മുംബൈ 400050, ഇന്ത്യ
ഫാക്ടറി: ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് സെന്റർ, ഫേസ് 2,
സാംബ, (ജെ ആൻഡ് കെ)-184121

জিবিআর 40

জিবারেলিক অ্যাসিড 40% WSG
(উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক)

ব্যবহারের পূর্বে লিফলেট পড়ে নিন।

সুপারিশ:

ফসল	পোকার সাধারণ নাম	মাত্রা/হেক্টর		তরলীকরণ (লিটার)	শেষবার স্প্রে করার পর থেকে ফসল কাটার সময়ের মধ্যে অপেক্ষার ব্যবধান (দিন)	প্রতিবার প্রয়োগের পরে পুনরায় প্রবেশ (ঘন্টায়)
		এআই (পিপিএম)	ফর্মুলেশন (লিটার)			
আঙুর	ফোটার আগে প্রসারণ	৪০	৫০	৫০০	-	-
	ফল সেটিং - পাতলা হওয়া	৪০	৫০	৫০০	-	-
	৬-৭ মিমি বেরি আকারের বৃদ্ধি	৪০	৫০	৫০০	-	-
ধান	রোপণের ২০-২৫ দিন পর	২০-২৫	৫০-৬২.৫	৫০০	-	-
	প্যানিকেল বা যৌগ পুষ্পস্তবক উত্থানে	২০-২৫	৫০-৬২.৫	৫০০	-	-

ব্যবহারের নির্দেশ: প্রয়োজনীয় পরিমাণে জিবারেলিক অ্যাসিড ৪০% WSG নিয়ে একটি কাঠের লাঠি ব্যবহার করে সেটি সঠিকভাবে নাড়তে নাড়তে অল্প পরিমাণে জলের সাথে

জিবারেলিক অ্যাসিড ৪০% WSG সংরক্ষণের জন্য ঘর বা প্রাঙ্গণগুলি ভালভাবে আলোকিত, ভালভাবে নির্মিত, শীতল এবং বায়ুচলাচল যুক্ত এবং যথেষ্ট বড় হতে হবে।

সতর্কতা: লেবেল এবং লিফলেটে নির্দেশিত ফসল ব্যতীত অন্য কোনো ফসলে ব্যবহার করা যাবে না। লিফলেটে নির্দেশিত হিসাবে ব্যবহারের পরে পাত্রটি নষ্ট করে ফেলুন।

রসায়নিক সংমিশ্রণ:

জিবারেলিক অ্যাসিড a.i.	৪০.০০ % w/w
পলিসরবেট ২০	০১.৫০ % w/w
পলিভিনাইলপাইরোলিডোন এগ্রিমার ৩০	০১.০০ % w/w
ল্যাকটোস	Q.S. %
মোট	**১০০ % w/w**

"খালি পাত্র ব্যবহার করা বিপজ্জনক"

নির্মাতা ও বিপণনকারী : ঘরডা কেমিক্যাল্স লিমিটেড
পঞ্জীকৃত কার্য্যালয় : ৪৮, হিল রোড, বান্দ্রা (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০৫০, ভারত
ফ্যাক্টরি : ইণ্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, ফেজ ২, সম্বা, জম্মু কাশ্মীর ১৮৪১২১.

جی بی آر ۴۰

جبریلک ایسڈ ۴۰٪ ڈبلیوایس جی
(پودوں کی نشوونما کا ریگولیٹر)

استعمال کرنے سے قبل کتابچہ پڑھ لیں۔

اس دوا کے فارمیولیشن میں جبریلک ایسڈ ہوتا ہے جو انگور اور دھان کی فصل میں استعمال ہونے والے پودوں کی نشوونما کے ریگولیٹر کے طور پر موثر ہے۔

ہدایات :

فصل	حشرات کا عام نام	مقدار فی ہیکٹر		پانی میں محلول (لیٹر)	آخری مرتبہ دوا کا چھڑکاؤ اور فصل کی کٹائی کے درمیان انتظار کا وقفہ (دنوں میں)	ہر مرتبہ چھڑکاؤ کے بعد دوبارہ چھڑکاؤ (گھنٹوں میں)
		اے آئی (پی پی ایم)	فارمولیشن (گرام)			
انگور	پھول کھلنے سے پہلے کی لمبائی	۴۰	۵۰	۵۰۰	-	-
	پھلوں کی ترتیب - پتلا ہونا	۴۰	۵۰	۵۰۰	-	-
	۶ سے ۷ ملی میٹر بیری کے سائز میں اضافہ	۴۰	۵۰	۵۰۰	-	-
دھان	پودوں کی منتقلی ۲۰ سے ۲۵ دن بعد	۲۰_۲۵	۵۰_۶۲.۵	۵۰۰	-	-
	پینکل کے ابھرنے پر	۲۰_۲۵	۵۰_۶۲.۵	۵۰۰	-	-

ہدایت برائے استعمال :

لگاکر رکھا جائے۔

۲۔ جبریلک ایسڈ ۴۰٪ ڈبلیو ایس جی کو ہوا کی مرطوبیت اور آلودگی سے بچانے کے لئے ذخیرہ کرنے کے لئے بنائے گئے کمرے یا احاطے اچھی طرح سے روشن، عمدہ تعمیر کردہ، ٹھنڈے اور ہوادار اور کافی جہت والے ہونے چاہئیں۔

کیمیائی اجزاء:

جبریلک ایسڈ اے آئی.	۴۰.۰۰٪ وزن وزن
پولی سوربیٹ ۲۰	۰۱.۵۰٪ وزن/وزن
پولی وینائل پائرولیڈون ایگریمر ۳۰	۰۱.۰۰٪ وزن/وزن
لیکٹوس	حسبِ ضرورت ٪
کل	**۱۰۰٪ وزن/وزن**

خالی کنٹینر کو دوبارہ استعمال کرنا خطرناک ہے۔

تیار کردہ اور تجارت کردہ بہ ذریعہ: **گھرڈہ کیمیکلس لمیٹیڈ**
جسٹرڈ آفس: 48، ہل روڈ، باندرہ (مغرب)، ممبئی ـ 400 050۔ انڈیا۔
یکٹری: انڈسٹرئیل گروتھ سینٹر، فیز II، سامبا، (جے اینڈ کے) ـ 184121۔