KING DOXA®

Indoxacarb 14.5% SC
(Insecticide)

Indoxacarb 14.5% Suspension Concentrate is a broad spectrum contact and stomach insecticide effective as a foliar spray for the control of insect pests of Cotton, Tomato, Chilli, Cabbage, Pigeonpea, Rice, Soybean & Chickpea.

Recommendation:

Crop	Common Name of the Pest	Dosage/ha		Dilution in water (liter)	Pre harvest interval (Days)	Re-entry (Days)
		a.i. (g)	Formulation (ml)			
Cotton	Bollworm (Helicoverpa armigera)	75	500	600-1000	16	
Cabbage	Diamond back moth (Plutella xylostella)	30-40	200-266	400-750	7	
Tomato	Fruit borer (H. armigera)	60-75	400-500	300-600	5	
Chilli	Fruit borer (H. armigera & Spodoptera exigua)	50-60	333-400	300-600	5	24
Pigeon pea	Pod borer complex (H. armigera, pod fly)	50-60	333-400	500-1000	15	
Rice	Yellow stem borer (Scirpophaga incertulas), Leaf folder (Cnaphalocrosis medinalis)	30-50	200-333	500	37	
Soybean	Tobacco caterpillar (Spodoptera litura)	50	333	500	36	
Chickpea	Pod Borer (H. armigera)	60-75	400-500	500	19	

Good Practices relating to pesticide application techniques Direction of use: Direct spray towards the crop and ensure uniform and proper coverage. It is recommended to use High volume sprayer such as knapsack sprayer, rocking sprayer, foot sprayer etc. fitted with hollow cone nozzle against the target insect pests in different crops as indicated in the above table.

Weather condition (In general): Spray preferably during morning and evening hours. Do not apply on a windy day or before a rain.

Soil and water (where ever applicable): No specific soil & water conditions are prescribed.

Crop stage for Application: May be applied in the recommended crop at any stage of crop growth when the incidence of insect pest is observed to cause economic loss.

Application Techniques: It is recommended to use high volume sprayers fitted with hollow cone nozzle. Shake the bottle well before use. Take the measured quantity of product and add to it a small quantity of water, mix thoroughly and then add remaining quantity of water, stir well before the use. Spray uniformly and insure proper coverage of the spray on the plant.

Equipment Type: It is recommended to use High volume sprayer such as knapsack sprayer, rocking sprayer, foot sprayer etc. fitted with hollow cone nozzle.

Nozzle Type: Hollow cone nozzle

Dosage: Please refer above table for dosage details.

Instruction for Mixing: Take the measured quantity of product and add to it a small quantity of water, mix thoroughly and then add remaining quantity of water, stir well before the use.

Re-entry Period: 24 hours.

Manner & Time of application: May be applied to the above mentioned crops at the interval of 7-10 days when the incidence of insect pests is observed in the field.

Application Timings: Spray preferably during morning and evening hours. Do not apply on a windy day or during rain.

Frequency including max number of sprays: One to two spray at 7-10 days' interval may be applied, when the incidence of insect pests is observed at the dose mentioned in the above table.

Stages during which pesticides should not be applied on any crop: Apply only on stage as instructed in crop stage for application, Do not applied any other stage.

Symptoms of Poisoning: Mild eye irritation with tearing, pain or blurred vision, itching, burning, redness, swelling or rashes on the skin Vapour inhalation may cause irritation of the upper respiratory passages with coughing and discomfort. Based on animal tests, massive overdose might lead to signs of neurotoxicity. Prolonged overexposure would be expected to result in loss of body weight and mild, reversible anemia.

First Aid Measures: If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. If inhaled: Take the person to fresh air and take care of body temperature. If person is not breathing or breathing with difficulty, administer artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists, consult eye specialist.

Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Phytotoxicity: Non-phytotoxic at recommended dose

Storage Conditions: 1. Storage and transportation of the plant growth regulator should be done in such a way that no foodstuff and animal feed are contaminated. 2. Store in a cool, dry, well-ventilated, well-built room of sufficient dimensions and in its original containers, away from foodstuff and animal feeds. 3. If leakage or spillage occurs during transportation or storage, necessary measure should be taken to prevent poisoning and pollution of soil and water. Keep out of reach of children.

Safety Precautions: 1. Do not eat, drink, smoke or chew betel leaves while spraying. 2. Wear long sleeves shirt, long pants, chemical resistant gloves, mask, goggles and covered shoes while handling the product. 3. Avoid spray drift onto the spraying person by spraying with the direction of the wind. 4. Do not blow the spray nozzle with mouth, clean the blocked nozzle with a thin stem or brush. 5. In case of any spillage on the body, wash exposed parts with soap and plenty of water 6. Wash hands and unprotected parts of the body properly. Remove and wash contaminated clothing separately after use.

Cautionary Statement: 1. Not to be used for any purpose other than those specified on label and leaflets. 2. Destroy the container after use as directed on leaflet. 3. The product is toxic to honey bees so do not spray during active foraging period of the day. **4. The product is very toxic to aquatic plants, fish and invertebrates and as such may not be used in and around aquaculture.**

Disposal of used containers, washing from equipment and surplus material: 1. It shall be the duty of manufactures, formulators of insecticides and operators to dispose packages or surplus material and washings in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Chemical Composition:

Content		% w/w
Indoxacarb a.i.	active ingredient	14.50
Inactive enantiomer	other ingredient	6.00
Amorphous silicon dioxide	other ingredient	7.00
Polyethoxylated polyaryl phenol	other ingredient	9.00
Polyethoxylated polyaryl phenol phosphate	other ingredient	6.00
Distilled methyl soyate	other ingredient	57.50
Total		**100.00% w/w**

Manufactured & Marketed by : **GHARDA CHEMICALS LIMITED**
Regd. Office: 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai- 400 050, INDIA.
Factory : Plot No. C-4/1, Kherdi M.I.D.C., Village : Kherdi, Taluka: Chiplun, District : Ratnagiri, State : Maharashtra, Pincode - 415604.

किंग डोक्सा

इन्डोक्साका १४.५ प्रतिशत
(कीटनाशक)

इन्डोक्साका १४.५ प्रतिशत सान्द्र घोल एक सम्पर्क व पेट में असर करने वाला कीटनाशक है जो कपास, पत्तागोभी, टमाटर, मिर्च, तूर, धान, सोयाबीन और चना पर लगने वाले निम्नलिखित कीट पर पर्णीय छिड़काव पर प्रभावकारी है।

सिफारिश :

फसल	कीड के सामान्य नाम	खुराक प्रति हैक्टर		पानी की मात्रा (ली.)	फसल कटाई से पूर्व का अंतराल (दिन)	पुन: प्रवेश की अवधि (घंटे)
		सकीय तत्व (ग्रा.)	संरचना (मिली)			
कपास	डोडे की सुंडी	७५	५००	६०० १०००	१६	
पत्तागोभी	हीरा पीठ पतंग	३०–४०	२००–२६६	४००–७५०	७	
टमाटर	फल छेदक	६०–७५	४००–५००	३००–६००	५	
मिर्च	फल छेदक	५०–६०	३३३–४००	३००–६००	५	२४
तूर	फली छेदक समूह	५० ६०	३३३–४००	५००–१०००	१५	
धान	पीला तना छेदक, पत्ता लपेट	३०–५०	२००–३३३	५००	३७	
सोयाबीन	तंबाखू इल्ली	५०	३३३	५००	३६	
चना	फल छेदक कीडे	६०–७५	४००–५००	५००	१९	

कीटनाशक अनुप्रयोग तकनीक से संबंधित अच्छे अभ्यास, उपयोग के लिए निर्देश: फसल की ओर सीधा, एकसमान और उचित कवरेज से छिड़काव करें। तालिका में दिए गए संकेत के अनुसार विभिन्न फसल में लक्ष्य कीट के खिलाफ होलो कोन नोजल के साथ फिट किए गए उच्च मात्रा वाले स्प्रेयर जैसे कि नैप्सैक स्प्रेयर, रॉकिंग या फूट स्प्रेयर का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

मौसम की स्थिति: विशेषत: सुबह और शाम के घंटे के दौरान छिड़काव करें। बारिश या तेज हवा हो तब छिड़काव न करें।

मिट्टी और पानी : मिट्टी और पानी की कोई विशिष्ट स्थिति निर्धारित नहीं है।

फसल अवस्था : फसल की वृद्धि की किसी भी चरण में छिड़काव किया जा सकता है, जब कीट का प्रकोप होने पर आर्थिक नुकसान होने की संभावना है।

आवेदन तकनीक: होलो कोन नोजल के साथ फिट किए गए उच्च मात्रा वाले स्प्रेयर की सिफारिश की जाती है। उत्पाद की मापित मात्रा लें और उसमें थोड़ी मात्रा में पानी डालें फिर शेष मात्रा में पानी डालें। उपयोग करने से पहले अच्छी तरह से हिलाएं। फसल की ओर सीधा, एकसमान और उचित कवरेज से छिड़काव करें।

उपकरण प्रकार : होलो कोन नोजल के साथ फिट किए गए उच्च मात्रा वाले स्प्रेयर जैसे कि नैप्सैक स्प्रेयर, रॉकिंग स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

नोजल प्रकार : होलो कोन नोजल

खुराक : खुराक वितरण के लिए कृपया उपरो तालिका देखें।

मिश्रण के लिए निर्देश: उत्पाद की मापित मात्रा लें और उसमें थोड़ी मात्रा में पानी डाले फिर शेष मात्रा में पानी डालें। उपयोग करने से पहले अच्छी तरह से हिलाएं।

पुन: प्रवेश अवधि : २४ घंटे

आवेदन का समय और तरीका: उपरोक्त फसल में कीट का प्रकोप होने पर ७–१० दिन के अंतराल पर निर्देशित फसल पर छिड़काव किया जा सकता है।

आवेदन का समय: विशेषत: सुबह और शाम के घंटे के दौरान छिड़काव करें। बारिश या तेज हवा हो तब छिड़काव न करें।

अधिक से अधिक अंक सहित आवृति: उपरो तालिका में बताई गई खुराक खेत में कीट का प्रकोप होने पर ७–१० दिन के अंतराल में एक या दो छिड़काव किए जा सकते हैं।

चरण जिसके दौरान किसी भी फसल पर कीटनाशक नहीं लगाया जाना चाहिये: फसल अवस्था में दिए गए निर्देशानुसार ही छिड़काव करें, किसी अन्य चरण में छिड़काव न करें।

विष के लक्षण: आँख में जलन, पानी आना व धुंधला दिखना त्वचा पर खुजली, जलन व परेशानी हो सकती है। सूंघने पर खांसी और परेशानी हो सकती है जानवर पर किए गए प्रयोग के आधार पर आवश्यकता से काफी अधिक मात्रा से तंत्रिकाओं विषाक्त प्रभावित हो सकती है। लंबे समय तक संपर्क के प्रभाव में आने से शरीर के भार में कमी तथा अल्पकालिक अनीमिया हो सकता है।

पादपआविषालुता: कीटनाशक की सिफारिश के अनुसार इस्तेमाल करने पर कोई पौधो के लिए विषाता नहीं।

प्राथमिक उपचार: अगर मुंह में निगल लिया है: यदि व्यक्ति सचेत और सतर्क है, तो पानी में मुंह कुल्ला करायें और पीने के लिए १ या २ गिलास पानी दें। एक बेहोश व्यक्ति के मुंह से कुछ भी कभी नहीं दें डॉक्टर को बुलाएं। बिना उपस्थित चिकित्सक की सलाह उल्टी न कराये यदि शरीर में लिए जाने पर: रोगी को ताजी हवा में ले जाए और शरीर के तापमान का ख्याल रखें। यदि रोगी साँस नहीं ले रहा है या कठिनाई से साँस ले रहा है, तो कृत्रिम आस्वासों, एक चिकित्सक से परामर्श करें। त्वचा के संपर्क के मामले में शरीर के प्रभावित हिस्सो को अच्छी तरह से साबुन से धोए और बाल और नाखून सहित पानी का खूब इस्तेमाल करें। यदि दर्द, लालिमा या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श करें। सभी दूषित कपड़े को अलग किया जाना चाहिये और उपयोग से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। आँख के संपर्क के मामले में: कम से कम १५ मिनिट के लिए बहुत सारे पानी से धीरे – धीरे धोए। यदि दर्द, जलन, लालिमा या फोटोफोबिया बनी रहती है तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लो।

विष नाशक: कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

संग्रहण की शर्ते: १. इसका संग्रह तथा परिवहन इस तरह से किया जाए जिससे बच्चे, पालतू जानवर खाने-पीने को सामान तथा पशुआहार दूषित न हो। २. कीटनाशक को इसके असली डिब्बे में खाद्य पदार्थ और पशुआहार से दूर रखें। सामान की जगह सूखी ठंडी हो जिसका निर्माण सही ढंग से किया गया हो जगह लम्बी चौड़ी हवादार और रोशनीदार हो ३. इसके संग्रह या परिवहन के समय यदि पौध वृद्धि नियंत्रक गिर या फैल रहा हो तो जमीन और पानी को जहरीला या प्रदूषित होने से रोकने के लिए जरूरी उपाय शीघ्र करें। बच्चे के पहुंच से दूर रखें।

सुरक्षा के लिए सावधानियाँ: १. प्रोडक्ट का प्रयोग करते समय न कुछ खाएं, न पियें, धूम्रपान करें, न ही पान चबाएं। २. प्रोडक्ट का प्रयोग करते समय पुरे बांह की शर्ट, लंबी पैंट, रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताने, मास्क, चश्मा और ढके हुए जूते पहने। ३. हवा की दिशा के साथ छिड़काव करते हुए छिड़काव करने वाले व्यक्ति पर स्प्रे के बहाव से बचें ४. स्प्रे नोजल को मुंह से न खोलें अब नोजल को पतली सिंक या ब्रश से साफ करें। ५. शरीर पर किसी भी रिसाव की स्थिति में, खुले हिस्सा को साबुन और काफी सारे पानी से धोएं। ६. हाथ और शरीर के खुले हिस्सा को अच्छी तरह से धोएं। प्रयोग के बाद दूषित कपड़े को उतारकर धोएं।

सावधानी कथन: १. लेबल और पत्रक पर जो निर्दिष्ट है उसके अलावा अन्य किसी प्रयोजन से प्रयोग न किया जाए। २. पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात कंटेनर को नष्ट करें। ३. उत्पाद मधु मक्खिया के लिए विषा है इसलिए दिन में सक्रिय फोर्जिंग अवधि के दौरान छिड़काव न करें। **४. यह उत्पाद जलीय पौध, मछलिय और अकशेकीय जीव के लिए बहुत विषैला होता है इसलिए इसका उपयोग जलीय कृषि में और उसके आसपास नहीं किया जाना चाहियें।**

कीटनाशक के प्रयोग किये गए डिब्बे बचे हुही कीटनाशको तथा पात्र के धोवन का निपटारा : १. यह कीटनाशक के निर्माताओं, ऑपरेटर फॉर्मूलेटर का कर्तव्य होगा की पर्यावरणीय या जल प्रदूषण को रोकने की लिए एक सुरक्षित तरीके से पंकज या अधिशेष सामग्री और धोवन का निपटारा न करें। २. उपयोग किए हुए पंकज को खुले में न छोड़े ताकि उनका पुनप्रयोग ना किया जा सके। ३. पैकेज को तोड़कर आबादी से दूर जमीन के नीचे गाड़ दें।

रासायनिक संरचना:

घटक		%भा/भा
ईन्डाक्सार्व ए.आई.	सक्रिय घटक	१४.५०
निष्क्रिय इनैनटिआमेर	अन्य घटक	६.००
अमोरफस सिलिकॉन डाइऑक्साइड	अन्य घटक	७.००
पॉलीएथोक्सिलेटेड पॉलीएरिल फिनोल	अन्य घटक	९.००
पॉलीएथोक्सिलेटेड पॉलीएरिल फिनोल फॉस्फेट	अन्य घटक	६.००
डिस्टिल्ड मिथाइल सोयाएट	अन्य घटक	५७.५०
कुल		१००.००% भा/भा

निर्माता और विक्रेता : **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**
पंजी. कार्यालय : ४८ हिल रोड, बांद्रा (प), मुंबई-४०० ०५० भारत.
फॅक्टरी: प्लॉट नं: सी–४/१, खेरडी एम.आय.डी.सी., गाँव: खेरडी, तालुका: चिपळुन,
जिला: रत्नागिरी, राज्य: महाराष्ट्र, पिनकोड: ४१५६०४.

किंग डॉक्सा

इंडॉक्साकार्ब १४.५% एससी
(कीटकनाशक)

इंडॉक्साकार्ब १४.५% सस्पेन्शन कॉन्स्ट्रेट हे एक बहुविध क्रियाशील असणारे स्पर्शजन्य आणि पोटविष कीटकनाशक आहे जे कपाशी, टोमॅटो, मिरची, कोबी, तूर, तांदूळ, सोयाबीन आणि हरभरा ह्यांवरील कीटकांच्या नियंत्रणासाठी पानांवरील फवारणी स्वरूपात प्रभावी ठरते.

शिफारस :

पीक	किडीचे सामान्य नाव	मात्रा / हे		पाण्यामधील विरलन	कापणीपूर्वीचे कालांतर (दिवस)	पुन:प्रवेश कालावधी (दिवस)
		क्रि.घ. (ग्रॅ).	सूत्रीकरण (मिली)			
कपाशी	बोंडअळी (हेलिकोव्हेर्पा आर्मिगेरा)	७५	५००	६००–१०००	१६	
कोबी	पाकोळी (DBM) (प्लुटेला झायलोस्टेला)	३० ४०	२००–२६६	४००–७५०	७	
टोमॅटो	फळ पोखरणारी अळी (एच. आर्मिगेरा)	६०–७५	४००–५००	३००–६००	५	
मिरची	फळ पोखरणारी व लष्करी अळी	५०–६०	३३३–४००	३००–६००	५	२४
तूर	शेंगा पोखरणारी अळी वर्गीय (एच. आर्मिगेरा, शेंडे माशी)	५०–६०	३३३–४००	५००–१०००	१५	
तांदूळ	पिवळा खोड कीड (स्किर्पोफागा इन्सर्च्युलास), पाने गुंडाळणारी अळी (नाफालोक्रोसिस मेडिनालिस)	३०–५०	२०० ३३३	५००	३७	
सोयाबीन	लष्करी अळी (स्पोडोप्टेरा लिटुरा)	५०	३३३	५००	३६	
हरभरा	घाटे अळी (एच. आर्मिगेरा)	६०–७५	४००–५००	५००	१९	

कीटनाशक वापरण्याच्या तंत्राशी निगडित चांगल्या प्रथा, वापरासाठीचे निर्देश : पिकावर थेट फवारणी करा आणि पीक एकसमानपणे व व्यवस्थित व्यापले जाईल ह्याची खात्री करा. पोकळ कोनाचे नोझल बसवलेले नॅपसॅक स्प्रेयर, रॉकिंग स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, इ. सारखे जास्त आकारमानाचे स्प्रेयर वरील तक्त्यामध्ये दाखवल्यानुसार विविध पिकांवरील कीटकांना लक्ष्य करण्यासाठी वापरावेत.

हवामानाच्या परिस्थिती (सर्वसाधारण): शक्यतो सकाळी आणि संध्याकाळी फवारणी करा. सोसाट्याचा वारा असताना किंवा पावसापूर्वी फवारू नका.

माती आणि पाणी (जिथे लागू असेल तिथे): माती आणि पाण्याच्या कोणत्याही विशिष्ट परिस्थिती विहित केलेल्या नाहीत.

वापरासाठी पिकावस्था : किडीचा प्रादुर्भाव आर्थिक नुकसान करण्याएवढा दिसून आल्यावर सुचवलेल्या पिकावर पिकाच्या कोणत्याही अवस्थेत वापरता येईल.

वापराचे तंत्र : पोकळ कोनाचे नोझल बसवलेले जास्त आकारमानाचे स्प्रेयर वापरावेत. वापरापूर्वी बाटली नीट हलवून घ्या. उत्पादन मोजून घ्या आणि त्यात थोडे पाणी घालून व्यवस्थित मिसळून घ्या आणि मग उरलेले पाणी घाला. वापरापूर्वी व्यवस्थित ढवळून घ्या. एकसमानपणे फवारणी करा आणि झाडाला फवारणीने पूर्ण व्यापले जाईल ह्याची खात्री करा.

उपकरणाचा प्रकार : पोकळ कोनाचे नोझल बसवलेले नॅपसॅक स्प्रेयर, रॉकिंग स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, इ. सारखे जास्त आकारमानाचे स्प्रेयर वापरावेत.

नोझलचा प्रकार : पोकळ कोनाचे नोझल (पोटी)

मात्रा : कृपया मात्रेच्या तपशिलासाठी वरील तक्त्याचा संदर्भ घ्या.

मिश्रणासाठी सूचना :

उत्पादन मोजून घ्या आणि त्यात थोडे पाणी घालून व्यवस्थित मिसळून घ्या आणि मग उरलेले पाणी घाला. वापरापूर्वी व्यवस्थित ढवळून घ्या.

पुन: प्रवेश कालावधी : २४ तास

वापराची पद्धत आणि वेळ : उपरोक्त पिकांवर शेतात कीटकांचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यावर ७ ते १० दिवसांच्या कालांतराने फवारता येईल.

वापराच्या वेळा : शक्यतो सकाळी आणि संध्याकाळी फवारणी करा. सोसाट्याचा वारा असताना किंवा पावसापूर्वी फवारू नका.

वारंवारता आणि फवारण्यांची कमाल संख्या : किडीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यावर उपरोक्त तक्त्यामध्ये उल्लेखित मात्रेने ७ ते १० दिवसांच्या कालांतराने एक–दोन फवारण्या करता येतील.

कोणत्या अवस्थेमध्ये कोणत्याही पिकावर कीटनाशके फवारू नयेत : वापरासाठीच्या पीकावस्थेमध्ये दिलेल्या सूचनेनुसारच फवारणी करा. इतर कोणत्याही अवस्थेत करू नका.

विषबाधेची लक्षणे : डोळ्यात सौम्य जळजळ आणि अश्रू येणे, वेदना किंवा धूसर दृष्टी, त्वचेवर खाज, दाह, लालसरपणा, सूज किंवा पुरळ. बाष्प हुंगल्यास वरील श्वसनमार्गाची जळजळ होऊ शकते आणि खोकला व त्रास होऊ शकतो. पशुंवरील चाचण्यांनुसार, मोठ्या मात्रेमुळे चेताविषजन्यता उद्भवू शकते. दीर्घकाळ संपर्कात राहिल्याने शरीराचे वजन घटणे आणि सौम्य, न परतवता येणारा पंडुरोग होणे अपेक्षित आहे.

प्रथमोपचार : पोटात गेल्यास : जर व्यक्ती शुद्धीत आणि सावध असेल, तर पाण्याने चूळ भरा किंवा १–२ पेले पाणी प्यायला द्या. बेशुद्ध व्यक्तीला तोंडावाटे काहीही कधीही देऊ नका. डॉक्टरांना बोलवा. उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी सांगितल्याशिवाय उलटी काढू नका. हुंगल्यास : रुग्णाला मोकळ्या हवेत न्या आणि शरीर तापमान जपा. जर माणूस श्वास घेत नसेल किंवा श्वास घेण्यास त्रास होत असेल, तर कृत्रिम श्वसन द्या, शक्यतो तोंडाने तोंडावर. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. त्वचेशी संपर्क झाल्यास : शरीराचे बाधित भाग साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवून काढा, अगदी केस आणि नखांसुद्धा. जर वेदना, लालसरपणा किंवा जळजळ कायम राहिली, तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सर्व दूषित कपडे पुन्हा वापरापूर्वी वेगळे करून व्यवस्थित साबणानेव पाण्याने धुवावेत. डोळ्यांत गेल्यास : भरपूर पाण्याने १५ मिनिटे धूत रहा. जर वेदना, जळजळ, लालसरपणा किंवा प्रकाशसंवेदनशीलता कायम राहिली, तर नेत्रचिकित्सकाकडे न्या.

उतारा : कोणताही विशिष्ट उतारा नाही. लक्षणानुसार उपचार करा.

वनस्पती विषजन्यता : सुचविलेल्या मात्रेमध्ये वनस्पतीसाठी विषारी नाही.

साठवणीच्या परिस्थिती : १. वनस्पती वृद्धी नियामकाची साठवण आणि वाहतूक अशा रीतीने करावी ज्यायोगे कोणतेही अन्नपदार्थ आणि पशुखाद्य दूषित होऊ नये. २. थंड, कोरड्या, सुप्रकाशित, सुबद्ध, पुरेशा गोज्यापाच्या खोलीमध्ये आणि मूळ कंटेनरमध्ये, अन्नपदार्थांपासून आणि पशुखाद्यापासून दूर साठवण करा. ३. जर वाहतुकीदरम्यान किंवा साठवणीदरम्यान गळती झाली किंवा उत्पादन सांडले, तर मातीचे व पाण्याचे प्रदूषण व विषबाधा टाळण्यासाठी आवश्यक ते उपाय करावे. मुलांच्या हाती लागू देऊ नका.

सुरक्षेसाठी खबरदाऱ्या : १. फवारणी करताना काहीही खाऊ नका, पिऊ नका, धूम्रपान करू नका किंवा पान चघळू नका. २. उत्पादन हाताळताना लांब हाताचा सदरा, लांब विजार (पँट), रसायनविरोधी हातमोजे, मास्क, गॉगल आणि पाय झाकणारे शूज घाला. ३. फवारणाऱ्या व्यक्तीच्या अंगावर फवारा उडू नये म्हणून वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. ४. फवारणीचे नोझल तोंडाने फुंकू नका. चोंदलेले नोझल बारीक काडीने किंवा ब्रशने साफ करा. ५. अंगावर सांडल्यास उघडे भाग साबणाने व पाण्याने धुवून काढा. ६. हात आणि शरीराचे असुरक्षित भाग स्वच्छ धुवा. दूषित कपडे वापरानंतर वेगळे काढा आणि धुवा.

सावधानतेचा इशारा : १. पत्रकात आणि पुस्तिकेत दिलेल्या पिकांखेरीज इतर कशावरही वापरू नये. २. वापरानंतर पुस्तिकेत निर्देश दिल्याप्रमाणे कंटेनर नष्ट करा. ३. हे उत्पादन मधमाश्यांसाठी विषारी आहे म्हणून दिवसा त्या सक्रिय असताना फवारणी करू नका. **४. उत्पादन जलवनस्पतींसाठी, माशांसाठी आणि अपृष्ठवंशीय प्राण्यांसाठी अतिशय विषारी आहे आणि म्हणून जल परिसंस्थेमध्ये आणि त्या सभोवताली त्याचा वापर करू नये.**

वापरलेल्या कंटेनरची, उपकरणातील धुवणाची आणि उर्वरित पदार्थांची विल्हेवाट : १. पॅकेजेस, उर्वरित पदार्थ आणि धुवणे ह्यांची सुरक्षित पद्धतीने, पर्यावरणाचे किंवा पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही अशा रीतीने विल्हेवाट लावणे हे उत्पादकांचे, कीटकनाशकांच्या सूत्रीकर्त्यांचे आणि वापरकर्त्यांचे कर्तव्य असेल. २. वापरलेली पॅकेजेस पुन्हा वापरली जाऊ नयेत म्हणून ती बाहेर सोडून देऊ नये. ३. वापरलेली पॅकेजेस मोडून मानवी वस्तीपासून दूर नेऊन पुरावीत.

रासायनिक संघटन :

पदार्थ		%भार / भार
इंडॉक्साकार्ब क्रि.घ.	क्रियाशील घटक	१४.५०
निष्क्रिय एनॅन्शिओमर	इतर घटक	६.००
अनाकार सिलिकॉन डायऑक्साइड	इतर घटक	७.००
पॉलीइथॉक्झायलेटेड पॉलीॲरिल फेनोल	इतर घटक	९.००
पॉलीइथॉक्झायलेटेड पॉलीॲरिल फेनोल फॉस्फेट	इतर घटक	६.००
ऊर्ध्वपतित मिथाइल सोयेट	इतर घटक	५७.५०
एकूण :		१००.०० % भार / भार

उत्पादन कर्ता व विक्रेता : घरडा केमिकल्स लिमिटेड
रजी. कार्यालय : ४८ हिल रोड, वांद्रे (प.), मुंबई– ४०००५०. भारत.
फॅक्टरी : प्लॉट नं: सी–४/१, खेरडी एम.आय.डी.सी., गाव : खेरडी, तालुका: चिपळुण,
जिल्हा : रत्नागिरी, राज्य : महाराष्ट्र, पिनकोड: ४१५६०४. भारत.

કિંગ ડોક્સા

ઈન્ડોક્સાકાર્બ ૧૪.૫% એસસી
(કીટકનાશક)

ઈન્ડોક્સાકાર્બ ૧૪.૫% સસ્પેન્શન કૉન્સન્ટ્રેટ એ એક વ્યાપક સ્પેક્ટ્રમ સંપર્ક અને પેટની જંતુનાશક છે જે કપાસ, ટામેટા, મરચાં, કોબી, તુવેર, ચોખા, સોયાબીન અને ચણાના નિયંત્રણ માટે પર્ણસમૂહના છંટકાવ તરીકે અસરકારક છે.

ભલામણ:

પાક	જંતુનાં સામાન્ય નામ	માત્રા /હેક્ટર		મંદન માટે પાણી (લિટર)	લણણીપૂર્વ સમયાંતર (દિવસો)	પુનઃપ્રવેશ સમયગાળો (દિવસો)
		સ.ઘ. (ગ્રા)	ફોર્મ્યુલેશન (મિલિ)			
કપાસ	બોલવોર્મ (હેલિકોવર્પા આર્મિજેરા)	75	500	600-1000	16	
કોબી	ડાયમંડ બેક મોથ (પ્લુટેલા ઝાયલોસ્ટેલા)	30-40	200-266	400-750	7	
ટમેટાં	ફ્રુટ બોરર (એચ. આર્મિજેરા)	60-75	400-500	300-600	5	
મરચાં	ફ્રુટ બોરર (એચ. આર્મિજેરા) અને (સ્પોડોપ્ટેરા એક્ઝિગુઆ)	50-60	333-400	300-600	5	24
તુવેર	પોડ બોરર કોમ્પ્લેક્સ (એચ. આર્મિજેરા, પોડ ફ્લાય)	50-60	333-400	500-1000	15	
ડાંગર	યલો સ્ટેમ બોરર (સ્કિર્પોફેગા ઈન્સર્ટ્યુલારા), લીફ ફોલ્ડર (ક્નાફાલોક્રોસિસ મેડિનાલિસ)	30-50	200-333	500	37	
સોયાબીન	પોડ બોરર (એચ.આર્મિજેરા)	50	333	500	36	
ચણા	બોલવોર્મ (હેલિકોવર્પા આર્મિજેરા)	60-75	400-500	500	19	

જંતુનાશક ઉપયોગની રીતો અંગે ઉત્તમ કાર્યપદ્ધતિઓ, ઉપયોગ અંગે નિર્દેશ: પાક તરફ સીધો છંટકાવ કરો અને એકરામાન અને યોગ્ય રીતે આવરી લેવાનું સુનિશ્ચિત કરો. ઉપરોક્ત કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા મુજબ વિવિધ પાકોમાં લક્ષિત જંતુનાશકો સામે હોલો કોન નોઝલ ફીટ કરેલા નેપસેક સ્પ્રેયર, ફૂટ સ્પ્રેયર વગેરે જેવા હાઇ વૉલ્યૂમ સ્પ્રેયરોનો ઉપયોગ ભલામણ કરવામાં આવે છે.

હવામાન સ્થિતિ (સામાન્ય રીતે): મુખ્યત્વે સવારના કલાકો દરમિયાન છંટકાવ કરો. પવનવાળા દિવસે અથવા વરસાદ પહેલાં છંટકાવ કરવો નહીં.

માટી અને પાણી (જ્યાં પણ લાગુ હોય): માટી અને પાણી અંગે કોઈ ચોક્કસ શરતો સૂચવવામાં આવી નથી.

વપરાશ માટે પાકનો તબક્કો: જ્યારે કીટકોના ઉપદ્રવ આર્થિક નુકસાની પહોંચાડતો જોવા મળે ત્યારે પાકની વૃદ્ધિના કોઈપણ તબક્કે ભલામણ કરેલા પાકમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે.

ઉપયોગની પદ્ધતિઓ: હોલો કોન નોઝલ લગાડેલા હાઇ વૉલ્યૂમ સ્પ્રેયરનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. ઉપયોગ કરતાં પહેલાં બાટલીને સારી રીતે હલાવો. ઉત્પાદનની માપેલી માત્રા લો અને તેમાં થોડા પ્રમાણમાં પાણી ઉમેરો, સારી રીતે મિક્સ કરો અને પછી બાકીનું પાણી ઉમેરો, ઉપયોગ કરતાં પહેલાં સારી રીતે હલાવો. એકસરખી રીતે છંટકાવ કરો અને સારી રીતે આવરી લેવાનું સુનિશ્ચિત કરો.

સાધનોનો પ્રકાર: હોલો કોન નોઝલ લગાડેલા હાઇ વૉલ્યૂમ સ્પ્રેયરનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

નોઝલનો પ્રકાર: હોલો કોન નોઝલ

માત્રા: માત્રાની વિગતો માટે કૃપા કરીને ઉપરનું કોષ્ટક જૂઓ.

મિશ્રણ માટેની સૂચનાઓ: માપેલી માત્રામાં ઉત્પાદન લો અને તેમાં થોડી માત્રામાં પાણી ઉમેરો, સારી રીતે મિક્સ કરો અને પછી બાકીનું પાણી ઉમેરો, ઉપયોગ કરતાં પહેલા સારી રીતે હલાવો.

પુનઃપ્રવેશ અવધિ: ૨૪ કલાક

વપરાશનો સમય: મુખ્યત્વે સવારના કલાકો દરમિયાન છંટકાવ કરો. પવનવાળા દિવસે અથવા વરસાદ પહેલાં છંટકાવ કરવો નહીં.

છંટકાવની મહત્તમ સંખ્યા સહિત આવર્તન: જ્યારે કીટકોનો ઉપદ્રવ જોવા મળે ત્યારે, ઉપરોક્ત કોષ્ટકમાં દર્શાવેલી માત્રામાં ૭–૧૦ દિવસના અંતરે એક અથવા બે છંટકાવ કરી શકાય છે.

એ તબક્કાઓ જ્યારે કોઈપણ પાક પર જંતુનાશકો વાપરવા ન જોઈએ: પાકના તબક્કામાં માત્ર સૂચના મુજબ જ ઉપયોગ કરો. અન્ય કોઈ તબક્કામાં વાપરશો નહીં.

ઝેરની અસરનાં લક્ષણો: આંખમાં અશ્રુઓ સહિત, હળવી બળતરા, દુખાવો અથવા દૃષ્ટિમાં ઝાંખપ, ખંજવાળ, બળતરા, લાલાશ, સોજો અથવા ત્વચા પર ફોલ્લીઓ થઈ શકે છે. બાષ્પ શ્વાસમાં લેવાથી ઉધરસ અને અસ્વસ્થતા સાથે ઉપલા શ્વસન માર્ગોમાં બળતરા થઈ શકે છે. પ્રાણીઓ પરનાં પરીક્ષણોના આધારે, મોટા પ્રમાણમાં ઓવરડોઝને લઈને ન્યુરોટોક્સિસિટીનાં ચિહ્નો ઉદ્ભવી શકે છે. લાંબા સમય સુધી વધુ પડતા પ્રભાવની અસરથી શરીરના વજનમાં ઘટાડો અને હળવી, ઉલટાવી શકાય એવી રક્તક્ષીણતા થવાની સંભાવના રહે છે.

પ્રાથમિક ઉપચારના ઉપાયો : જો પેટમાં લેવામાં આવે તો: જો વ્યક્તિ સભાન અને સચેત હોય, તો પાણીથી મોં ધોઈ નાખો અને પીવા માટે ૧ કે ૨ ગ્લાસ પાણી આપો. બેભાન વ્યક્તિને ક્યારેય મોંઢેથી કંઈ ન આપવું. ડોક્ટરને બોલાવો. હાજરી આપનાર ચિકિત્સક દ્વારા જણાવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ઉલ્ટી કરાવવા પ્રયાસ ન કરશો. જો શ્વાસ લેવામાં આવે તો: દર્દીને તાજી હવામાં લઈ જાઓ અને શરીરના તાપમાનનું ધ્યાન રાખો. જો વ્યક્તિને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતી હોય અથવા શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થતી હોય તો, બની શકે તો, મોંથી મોં શ્વાસ આપીને કૃત્રિમ શ્વાસોચ્છ્વાસ આપો. ચિકિત્સકની સલાહ લો. ત્વચાના સંપર્કના કિસ્સામાં: વાળ અને નખની નીચે સહિત, શરીરના પ્રભાવિત ભાગને સાબુ અને પુષ્કળ પાણીથી સારી રીતે ધોઈ લો. જો દુખાવો, લાલાશ અથવા બળતરા ચાલુ રહે, તો ડોક્ટરની સલાહ લો. બધાં દૂષિત કપડાંને અલગ–અલગ રાખવાં જોઈએ અને ઉપયોગ કરતાં પહેલાં સાબુ અને પાણીથી અલગથી સારી રીતે ધોવાં જોઈએ. આંખના સંપર્કના કિસ્સામાં: ઓછામાં ઓછી ૧૫ મિનિટ સુધી પુષ્કળ પાણીથી હળવા હાથે પાણીની છાલકો મારીને ધૂઓ. જો પીડા, બળતરા, લાલાશ અથવા ફોટોફોબિયા ચાલુ રહે તો, નેત્ર–વિશેષજ્ઞની સલાહ લો.

વિષમારણ : કોઈ ચોક્કસ વિષમારણ જાણીતું નથી. લક્ષણો અનુસાર ઉપચાર લાગુ કરો.

ફાયટોટોક્સિસિટી : ભલામણ કરેલી માત્રા પર બિન–ફાઈટોટોક્સિક.

સંગ્રહ સ્થિતિઓ : ૧. છોડના વિકાસ નિયંત્રકનો સંગ્રહ અને પરિવહન એવી રીતે થવાં જોઈએ કે, કોઈપણ ખાદ્ય પદાર્થો અને પશુ આહાર દૂષિત ન થાય. ૨. શીતળ, સૂકા, સારી રીતે વેન્ટિલેટેડ, પર્યાપ્ત પરિમાણો ધરાવતી સારી રીતે બંધાયેલી રૂમમાં અને તેના મૂળ કન્ટેનરમાં, ખાદ્ય પદાર્થો અને પ્રાણીઓના ખોરાકથી દૂર સંગ્રહિત કરો. ૩. જો પરિવહન અથવા સંગ્રહ દરમિયાન લીકેજ અથવા છલકાવાનું થાય છે, ઝેરની અસર ન ફેલાય અને જમીન તથા પાણીમાં વિષાક્તતા અને પ્રદૂષણને રોકવા માટે જરૂરી પગલાં લેવાં જોઈએ. બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો.

સુરક્ષા સાવચેતીઓ: ૧. છંટકાવ કરતી વખતે ખાવું, પીવું, ધૂમ્રપાન કરવું અથવા પાન ચાવવાં નહીં. ૨. ઉત્પાદનનો ઉપયોગ કરતી વખતે આખી બાંયનું શર્ટ, લાંબું પેન્ટ, રાસાયણિક પ્રતિરોધક હાથમોજાં, માસ્ક, ગોગલ્સ અને પગ ઢંકાય એવા શૂઝ પહેરવાં. ૩. પવનની દિશામાં છંટકાવ કરીને, છંટકાવ કરનાર વ્યક્તિ પર છંટકાવના પ્રવાહીની વાછંટ ટાળો. ૪. સ્પ્રેયરના નોઝલને મોં વડે ફૂંકશો નહીં, અવરોધિત નોઝલને પાતળી ડાંખળી અથવા બ્રશથી સાફ કરો. ૫. શરીર પર રસાયણની છાલક ઊડી હોય તો, ખુલ્લા ભાગોને સાબુ અને પુષ્કળ પાણીથી ધોવા. ૬. હાથ અને શરીરના અસુરક્ષિત ભાગોને યોગ્ય રીતે ધોવા. ઉપયોગ કર્યા પછી દૂષિત કપડાંને અલગથી દૂર કરો અને ધોવા.

સાવધાની નિવેદન: ૧. લેબલ અને પત્રિકાઓ પર નિર્દિષ્ટ કરેલા હેતુઓ સિવાય અન્ય કોઈપણ હેતુ માટે ઉપયોગ કરવો નહીં. ૨. પત્રિકા પરના નિર્દેશ મુજબ ઉપયોગ કર્યા પછી કન્ટેનરનો નાશ કરો. ૩. મધ એકઠું કરી રહેલી મધમાખીઓ માટે આ પદાર્થ ઝેરી છે, તેથી દિવસના સમયે સક્રિય ચારો સમયગાળા દરમિયાન છંટકાવ કરશો નહીં. **૪. આ ઉત્પાદન જળચર છોડ, માછલી અને અપૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ માટે ખૂબ જ ઝેરી છે અને આ કારણસર આ પદાર્થનો ઉપયોગ જળચર ઉછેરના સ્થાનમાં અને તેની આસપાસ થઈ શકતો નથી.**

વપરાયેલ કન્ટેનરનો નિકાલ, સાધનો અને વધારાની સામગ્રીમાંથી ધોવા: ૧. પર્યાવરણીય અને જળ પ્રદૂષણ નિવારવા માટે પેકેજો અથવા વધારાની સામગ્રી અને ધોવાનો સલામત રીતે નિકાલ કરવો તે ઉત્પાદકો, જંતુનાશકોના ફોર્મ્યુલેટર અને ઓપરેટરની ફરજ રહેશે. ૨. વપરાયેલ પેકેજો તેમના પુનઃઉપયોગને રોકવા માટે બહાર છોડવામાં આવશે નહીં. ૩. પેકેજને તોડીને વસવાટથી દૂર દાટી દેવાના રહેશે.

રાસાયણિક રચના :

સામગ્રી		% વ/વ
ઈન્ડોક્સાકાર્બ સ.ઘ.	સક્રિય ઘટક	14.50
નિષ્ક્રિય એનાન્શિઓમર	સક્રિય ઘટક	6.00
આકારહીન સિલિકોન ડાયોક્સાઈડ	સક્રિય ઘટક	7.00
પોલિએથોક્સિલેટેડ પોલિઅરિલ ફિનોલ	સક્રિય ઘટક	9.00
પોલિએથોક્સિલેટેડ પોલિઅરિલ ફિનોલ ફોસ્ફેટ	સક્રિય ઘટક	6.00
નિસ્યંદિત મિથાઈલ સોયેટ	સક્રિય ઘટક	57.50
કુલ:		100.00 % વ/વ

ઉત્પાદક અને વિપણનકર્તા : **ઘરડા કેમિકલ્સ લિમિટેડ**
રજી. ઑફિસ : ૪૮ હીલ રોડ, બાંદ્રા (પશ્ચિમ), મુંબઈ – ૪૦૦ ૦૫૦. ભારત.
ફેક્ટરી : પ્લૉટ નં. સી – ૪/૧, ખેરડી એમ.આય.ડી.સી., ગામ : ખેરડી, તા.: ચિપળુણ,
જિલ્લો : રત્નાગિરી, રાજ્ય : મહારાષ્ટ્ર, પિનકોડ : ૪૧૫૬૦૪. ભારત.

ਕਿੰਗਡੋਕਸਾ

ਇੰਡੋਕਸਾਕਾਰਬ 14.5% ਐਸ.ਸੀ.
(ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

ਇੰਡੋਕਸਾਕਾਰਬ 14.5% ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਘੋਲ ਇਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਕਪਾਹ, ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ, ਟਮਾਟਰ, ਮਿਰਚ, ਅਰਹਰ, ਝੋਨਾ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫਲ ਛੇਦਕ ਸੁੰਡੀ ਉਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਹੈ।

ਸਿਫਾਰਸ਼ :

ਫਸਲ	ਕੀਟ ਦਾ ਆਮ ਨਾਂ	ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ		ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲਿ.)	ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)	ਪੁਨਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਵਧੀ (ਘੰਟੇ)
		ਏ. ਆਈ. (ਗ੍ਰਾ.)	ਸੂਤਰੀਕਰਣ (ਮਿ.ਲਿ.)			
ਕਪਾਹ	ਟਿੰਡੇ ਦੀ ਸੁੰਡੀ	75	500	600-1000	16	
ਪੱਤ ਗੋਭੀ	ਚਮਕੀਲੀ ਪਿੱਠ ਵਾਲਾ ਪਤੰਗਾ	30-40	200-266	400-750	7	
ਟਮਾਟਰ	ਫਲ ਛੇਦਕ	60-75	400-500	300-600	5	
ਮਿਰਚ	ਫਲ ਛੇਦਕ	50 60	333 400	300 600	5	24
ਅਰਹਰ	ਫਲ ਛੇਦਕ ਸਮੂਹ	50-60	333-400	500-1000	15	
ਝੋਨਾ	ਪੀਲਾ ਤਣਾ ਛੇਦਕ, ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ	30-50	200-333	500	37	
ਸੋਇਆਬੀਨ	ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਸੁੰਡੀ	50	333	500	36	
ਛੋਲੇ	ਫਲ ਛੇਦਕ	60-75	400-500	500	19	

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ : ਫਸਲ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ, ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਲੋ ਕੋਨ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਜਿਵੇਂ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਰੌਕਿੰਗ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਫੁੱਟ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ : ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ : ਸਵੇਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ।

ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ : ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫਸਲ ਅਵਸਥਾ : ਫਸਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀਟ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ।

ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ : ਹੋਲੋ ਕੋਨ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਾਪੀ ਮਾਤਰਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ। ਫਸਲ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ, ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ

ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਕਿਸਮ : ਹੋਲੋ ਕੋਨ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਜਿਵੇਂ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਰੌਕਿੰਗ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਫੁੱਟ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨੋਜ਼ਲ ਕਿਸਮ : ਹੋਲੋ ਕੋਨ ਨੋਜ਼ਲ

ਮਿਕਦਾਰ : ਖੁਰਾਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਣੀ ਵੇਖੋ

ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ : ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਾਪੀ ਮਾਤਰਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ

ਪੁਨਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਵਧੀ : 24 ਘੰਟੇ

ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ : ਉਪਰੋਕਤ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀਟ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੇ 7-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫਸਲ ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ : ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ : ਸਵੇਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ।

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ : ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਖੁਰਾਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੀਟ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੇ 7-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੜਾਅ ਜਿਸਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ :
ਫਸਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ।

ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਨ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਣਾ, ਚਮੜੀ ਤੇ ਖਾਰਸ਼, ਜਲਣ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਘਣ ਤੇ ਖੰਘ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਨਾੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਹਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲੇ ਉਪਚਾਰ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ : ਜੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੋ : ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਚੁਕੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ 1 ਜਾਂ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਵੋ। ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੇ : ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਦਿਓ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ : ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਵਾਲ ਅਤੇ ਨਹੁੰਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਜਲਣ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ : ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੌਲੀ–ਹੌਲੀ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਦਰਦ, ਜਲਣ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।

ਜ਼ਹਿਰ ਤੋੜ: ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਭੰਡਾਰਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ : 1.ਇਸਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ, ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਖਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਆਹਾਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। 2. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਆਹਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਕੀ, ਠੰਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵੱਡੀ, ਹੌੜੀ ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 3. ਇਸਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਪੌਦ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਡਿੱਗ ਜਾਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ : 1. ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਪੀਓ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰੋ ਨਾ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚਬਾਓ 2. ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਲੰਮੀ ਬਾਜੂ ਦੀ ਸ਼ਰਟ, ਲੰਮੀ ਪੈਂਟ, ਰਸਾਇਣ ਰੋਧੀ ਦਸਤਾਨੇ, ਮਾਸਕ, ਚਸ਼ਮੇ ਅਤੇ ਢਕੇ ਹੋਏ ਬੂਟ ਪਾਓ 3. ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ, ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਵਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚੋ 4. ਸਪਰੇਅ ਨੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਫੂਕ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਬੰਦ ਹੋਈ ਨੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਪਤਲੇ ਤਣੇ ਜਾਂ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ 5. ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। 6. ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਵੋ। ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਧੋ ਲਵੋ।

ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਿਆਨ : 1. ਇਸ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। 2. ਪਰਚੇ ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ। 3. ਉਤਪਾਦ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਪਰਾਗਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ। **4. ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਜਲ ਜੀਵਾਂ, ਮੱਛੀਆ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।**

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੱਬੇ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਧੋਣ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ : 1. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਡੱਬੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਧੋਣ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ 2. ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਤਾਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। 3. ਡੱਬੇ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੱਬਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ :

ਘਟਕ		% ਭਾ/ਭਾ
ਇੰਡੋਕਸਾਕਾਰਬ (ਏ. ਆਈ.)	ਸਰਗਰਮ ਘਟਕ	14.50
ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਏਨੈਂਟੀਓਮਰ	ਹੋਰ ਘਟਕ	6.00
ਐਮੋਰਫਸ ਸਿਲਿਕੌਨ ਡਾਇਆਕਸਾਇਡ	ਹੋਰ ਘਟਕ	7.00
ਪੋਲੀਇਥੋਕਸੀਲੇਟੇਡ ਪੋਲੀ ਏਰਾਇਲ ਫਿਨੋਲ	ਹੋਰ ਘਟਕ	9.00
ਪੋਲੀਇਥੋਕਸੀਲੇਟੇਡ ਪੋਲੀ ਏਰਾਇਲ ਫਿਨੋਲ ਫੌਸਫੇਟ	ਹੋਰ ਘਟਕ	6.00
ਡਿਸਟੌਲਡ ਮਿਥਾਇਲ ਸੋਏਟ	ਹੋਰ ਘਟਕ	57.50
ਕੁੱਲ :		100.000 % ਭਾ/ਭਾ

ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ: **ਘਰਡਾ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ**
ਰਜਿ. ਦਫ਼ਤਰ : 48, ਹਿੱਲ ਰੋਡ, ਬਾਂਦਰਾ (ਪੱਛਮ) ਮੁੰਬਈ – 400050.
ਫੈਕਟਰੀ : ਪਲਾਟ ਨੰ. ਸੀ – 4/1, ਖੇਰਡੀ ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ., ਪਿੰਡ : ਖੇਰਡੀ, ਤਾਲੁਕਾ : ਚਿਪਲੂਨ,
ਜ਼ਿਲਾ : ਰਤਨਾਗਿਰੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪਿਨਕੋਡ : 415604. ਭਾਰਤ.

DIRECTION FOR USE

FOR AGRICULTURAL USE
कृषि उपयोग के लिए

Read Leaflet Before Use
इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।



किंग डोक्सा

इन्डोक्साकार्ब १४.५% एस.सी.
(कीटनाशक)

Manufactured & Marketed by :
GHARDA CHEMICALS LIMITED
Regd. Office: 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai- 400 050.

For any complaints, contact Customer Care Executive at Gharda Chemicals Limited, 48, Hill Road, Bandra (W), Mumbai-400050,
Tel.: 022 26551988/66265999,
Email: consumercare@gharda.com
Website: www.gharda.com

® - Registered Trademark of Gharda Chemicals Limited.

K.06.23.01

DIRECTION FOR USE

FOR AGRICULTURAL USE
कृषि उपयोग के लिए

Read Leaflet Before Use
इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।



किंग डोक्सा

इन्डोक्साकार्ब १४.५% एस.सी.

(कीटनाशक)

Manufactured & Marketed by :
GHARDA CHEMICALS LIMITED
Regd. Office: 48 Hill Road,
Bandra (W), Mumbai- 400 050.

For any complaints, contact Customer Care
Executive at Gharda Chemicals Limited,
48, Hill Road, Bandra (W), Mumbai-400050,
Tel.: 022 26551988/66265999,
Email: consumercare@gharda.com
Website: www.gharda.com

® - Registered Trademark of Gharda Chemicals Limited.



K.06.23.01

কিং ডক্সা
ইন্ডোক্সাকার্ব ১৪.৫% এসসি
(কীটনাশক)

ইন্ডোক্সাকার্ব ১৪.৫% সাসপেনশন কনসেন্ট্রেট হল তুলো, টমেটো, লঙ্কা, বাঁধাকপি, কাবলি ছোলা, ধান, সয়াবিন এবং ছোলার ফসলে কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের জন্য ফোলিয়ার স্প্রে হিসাবে কার্যকরী অন্তর্বাহী একটি স্পর্শজনিত এবং পাকস্থলীজনিত কীটনাশক।

সুপারিশ:

ফসল	কীটের সাধারণ নাম	মাত্রা / হেক্টর		জলে দ্রবণীয় (লিটার)	ফসল তোলার পূর্বে বিরতি (দিন)	পুনঃ প্রবেশের সময়কাল (দিন)
		স.উ. (গ্রা.)	ফর্মুলেশন (মিলি)			
তুলো	বোলওয়ার্ম (হেলিকোভার্পা আর্মিগেরা)	75	500	600-1000	16	
বাঁধাকপি	ডায়মন্ড ব্যাক মথ হীরক পৃষ্ঠ মথ (প্লুটেল্লা জাইলোস্টেল্লা)	30-40	200-266	400-750	7	
টমেটো	ফল ছিদ্রকারী পোকা (এইচ. আর্মিগেরা)	60-75	400-500	300-600	5	
লঙ্কা	ফল ছিদ্রকারী পোকা (এইচ. আর্মিগেরা ও স্পোডোপ্টেরা এক্সিগুয়া)	50-60	333-400	300-600	5	24
কাবলি ছোলা	শুঁটি ছিদ্রকারী কমপ্লেক্স (এইচ. আর্মিগেরা, শুঁটি মাছি)	50-60	333-400	500-1000	15	
ধান	মাজরা পোকা (স্কির্পোফাগা ইনসার্টুলাস), পাতা মোড়া (সেনাফালোক্রোসিস মেডিনালিস)	30-50	200-333	500	37	
সয়াবীন	টোব্যাকো ক্যাটারপিলার (স্পোডোপ্টেরা লিটুরা)	50	333	500	36	
ছোলা	শুঁটি ছিদ্রকারী পোকা (এইচ. আর্মিগেরা)	60-75	400-500	500	19	

কীটনাশক প্রয়োগ কৌশল সম্পর্কিত উত্তম অনুশীলন, ব্যবহারবিধি: সরাসরি ফসলের দিকে স্প্রে করুন এবং অভিন্ন ও সঠিক কভারেজ নিশ্চিত করুন। উপরোক্ত তালিকাতে নির্দেশিত বিভিন্ন ফসলে লক্ষ্যকৃত কীট-পতঙ্গের মোকাবিলা করার জন্য হলো কোন নজল লাগানো উচ্চ ভল্যুম-এর স্প্রেয়ার যেমন ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, রকিং স্প্রেয়ার, ফুট স্প্রেয়ার ইত্যাদি ব্যবহার করার পরামর্শ প্রদান করা হয়

আবহাওয়ার পরিস্থিতি (সাধারণভাবে): বিশেষভাবে সকালে এবং সন্ধ্যার সময় স্প্রে করুন। ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে বা বৃষ্টি হওয়ার পূর্বে প্রয়োগ করবেন না।

মাটি এবং জল (যেখানে প্রযোজ্য): নির্দিষ্ট কোনো মাটি এবং জলের জন্য কোনো শর্ত নির্ধারিত নয়।

প্রয়োগ করার জন্য ফসলের পর্যায়: ফসল বৃদ্ধির যে কোনো পর্যায়ে সুপারিশকৃত ফসলে প্রয়োগ করা যেতে পারে যখন কীট-পতঙ্গের আক্রমণ অর্থনৈতিক ক্ষতির জন্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রয়োগ পদ্ধতি: হলো কোন নজল লাগানো উচ্চ মাত্রার স্প্রেয়ার ব্যবহার করার পরামর্শ প্রদান করা হয়। ব্যবহার করার পূর্বে বোতলটিকে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিন। পরিমাপ মত পরিমাণে পণ্যটি নিন এবং তাতে অল্প পরিমাণে জল যোগ করুন, ভালোভাবে মেশান এবং তারপরে অবশিষ্ট পরিমাণ জল যোগ করুন, ব্যবহার করার পূর্বে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিন। সমানভাবে স্প্রে করুন এবং সমস্ত উদ্ভিদে স্প্রেটির যথাযথ কভারেজ সুনিশ্চিত করুন।

সরঞ্জামের ধরন: হলো কোন নজল লাগানো উচ্চ মাত্রার স্প্রেয়ার যেমন ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, রকিং স্প্রেয়ার, ফুট স্প্রেয়ার ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিৎ।

নজল-এর ধরন: হলো কোন নজল

মাত্রা: মাত্রার বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে উপরোক্ত তালিকাটি পড়ুন।

মিশ্রণ প্রস্তুত করার নির্দেশ: পরিমাপ মত পরিমাণে পণ্যটি নিন এবং তাতে অল্প পরিমাণে জল যোগ করুন, ভালোভাবে মেশান এবং তারপরে অবশিষ্ট পরিমাণ জল যোগ করুন, ব্যবহার করার পূর্বে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিন

পুনঃপ্রবেশের সময়কাল: ২৪ ঘন্টা

প্রয়োগের পদ্ধতি এবং সময়কাল: ক্ষেতে কীট-পতঙ্গের উপদ্রব লক্ষ্য করলে ৭-১০ দিনের ব্যবধানে উল্লিখিত ফসলগুলিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে

প্রয়োগের সময়: বিশেষ করে সকালে এবং সন্ধ্যার সময় স্প্রে করুন। ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে বা বৃষ্টি হওয়ার পূর্বে প্রয়োগ করবেন না।

সর্বাধিক সংখ্যক স্প্রে পুনরাবৃত্তি: উপরোক্ত তালিকাতে উল্লিখিত মাত্রায় কীট-পতঙ্গের উপদ্রব লক্ষ্য করলে ৭-১০ দিনের ব্যবধানে একবার থেকে দুইবার স্প্রে করে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ফসলের যে পর্যায়ে কোনো ফসলে কীটনাশক প্রয়োগ করা উচিত নয়: ফসলের যে পর্যায়গুলি নির্দেশিত কেবলমাত্র সেই পর্যায়েই প্রয়োগ করুন। অন্য কোনো পর্যায়ে প্রয়োগ করবেন না।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ: জল পড়া সহ চোখে হালকা জ্বালা করা, ব্যথা হওয়া বা ঝাপসা দৃষ্টি, ত্বকে চুলকানি, জ্বালা করা, লালচে ভাব, ফোলাভাব বা র‍্যাশ, বমির শ্বাস নেওয়ার কারণে কাশি এবং অস্বস্তি সহ শ্বাসনালীর উপরিভাগে জ্বালা করতে পারে। পশুদের উপরে পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে, ব্যাপক মাত্রায় নিউরোটক্সিসিটি-এর লক্ষণ লক্ষ্য করা যেতে পারে। দীর্ঘসময় ধরে বেশিমাত্রার সংস্পর্শে থাকার ফলে শারীরিক ওজন হ্রাস এবং হাল্কা, বিপরীতমুখী অ্যানিমিয়া হতে পারে বলে মনে করা হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা: যদি গিলে ফেলে: ব্যক্তিটি সচেতন এবং সজাগ থাকলে, জল দিয়ে ভালোভাবে কুলকুচি করে মুখ ধোয়ান এবং পান করার জন্য ১ বা ২ গ্লাস জল দিন। অচেতন ব্যক্তির মুখে কিছু দেবেন না। চিকিৎসককে ডাকুন। উপস্থিত চিকিৎসক নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বমি করাবেন না। যদি শ্বাস নিয়ে নেয়: ব্যক্তিটিকে বিশুদ্ধ বাতাসে নিয়ে যান এবং শরীরের তাপমাত্রার দিকে খেয়াল রাখুন। যদি ব্যক্তিটি শ্বাস নিতে না পারে বা শ্বাস নিতে অসুবিধা হয় তাহলে কৃত্রিমভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস দেওয়ার ব্যবস্থা করুন, বিশেষ করে মাউথ টু মাউথ শ্বাস দেওয়ার মাধ্যমে। একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। যদি ত্বকের সংস্পর্শে আসে: চুল এবং নখ সহ শরীরের দূষিত অংশগুলিকে সাবান এবং জল দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। যদি তারপরেও ব্যথা, লালচেভাব বা অস্বস্তি অনুভূত হয়, তাহলে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। সমস্ত দূষিত পোশাক আলাদা করে রাখা উচিত এবং ব্যবহার করার পূর্বে আলাদাভাবে সাবান এবং জল দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া উচিত। যদি চোখে চলে যায়: কম করে ১৫ মিনিট সময় ধরে প্রচুর পরিমাণে জল দিয়ে ভালোভাবে চোখ ধুয়ে নিন। যদি তারপরেও ব্যথা, অস্বস্তি, লালচেভাব বা ফটোফোবিয়া অব্যাহত থাকে, তাহলে একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

প্রতিষেধক: নির্দিষ্ট কোনো প্রতিষেধক জানা নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।

ফাইটোটক্সিসিটি: নির্দেশিত মাত্রায় ব্যবহার করলে ফাইটোটক্সিক নয়।

সংরক্ষণের শর্তাবলী: ১. কীটনাশকটিকে এইরকমভাবে সংরক্ষণ এবং পরিবহন করা উচিত যাতে এটির দ্বারা কোনো খাদ্যদ্রব্য এবং পশুখাদ্য দূষিত না হয়। ২. একটি শীতল, শুষ্ক, উত্তমরূপে বাতায়িত, পর্যাপ্ত মাত্রার সুনির্মিত ঘরে এবং এটির আসল প্যাকেজে খাদ্যসামগ্রী এবং পশুখাদ্য থেকে দূরে সংরক্ষণ করুন। ৩. পরিবহন বা সংরক্ষণ করার সময় যদি লিকেজ হয় বা পড়ে যায় তাহলে মাটি এবং জলের বিক্রিয়া এবং দূষণ রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। শিশুদের থেকে দূরে রাখুন

সুরক্ষা সংক্রান্ত সতর্কতা: ১. স্প্রে করার সময় কোনো কিছু খাবেন না, পান করবেন না বা চিবাবেন না। ২. পণ্যটি ব্যবহার করার সময় ফুলহাতা জামা, ফুলপ্যান্ট, রাসায়নিক প্রতিরোধক দস্তানা বা গ্লাভস, মাস্ক, গগলস এবং বুট জুতো পরুন। ৩. স্প্রেকারী ব্যক্তি উপর একটি তরঙ্গকর স্প্রে করে বাতাসের অভিমুখ দেখে নিন। ৪. নজলে মুখ দিয়ে ফুঁ দেবেন না, সরু একটি লাঠি বা ব্রাশ দিয়ে নজলের অবরুদ্ধ সামনের অংশটি পরিষ্কার করে নিন। ৫. শরীরের কোনো অংশে ছিটে লাগার ক্ষেত্রে, উন্মুক্ত অংশগুলি সাবান এবং প্রচুর পরিমাণে জল দিয়ে ধুয়ে নিন। ৬. হাত এবং শরীরের উন্মুক্ত অংশগুলিকে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। ব্যবহার করার পরে দূষিত পোশাক খুলে ফেলুন এবং আলাদা করে রাখুন।

সতর্কতামূলক বিবৃতি: ১. লেবেল এবং লিফলেটগুলিতে নির্দেশ ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত নয়। ২. ব্যবহারের পরে লিফলেটে নির্দেশ অনুযায়ী কৌটোটিকে বিনষ্ট করে ফেলুন। ৩. পণ্যটি মৌমাছির পক্ষে বিষাক্ত, তাই দিনের যে সময়টিতে মৌমাছিরা সক্রিয় থাকে সেই সময় স্প্রে করবেন না। ৪. পণ্যটি জলজ উদ্ভিদ, মাছ এবং অমেরুদণ্ডী প্রাণীর পক্ষে অত্যন্ত বিষাক্ত, সুতরাং জলজ চাষের ক্ষেত্র এবং তার আশেপাশে ব্যবহার করবেন না।

ব্যবহৃত পাত্র, সরঞ্জাম ধোয়ানি জল এবং উদ্বৃত্ত উপাদান বিনষ্টকরণ: ১. পরিবেশ বা জল দূষণ রোধ করার জন্য প্যাকেজ বা উদ্বৃত্ত উপাদান এবং ধোয়ানি জল নিরাপদে নিষ্পত্তি করা কীটনাশক প্রস্তুতকারক এবং ব্যবহারকারীর দায়িত্ব হবে। ২. পুনর্ব্যবহার প্রতিরোধ করার জন্য ব্যবহৃত প্যাকেজগুলিকে বাইরে যত্রতত্র ফেলে রাখবেন না। ৩. প্যাকেজগুলিকে লোকালয় থেকে দূরে ভেঙ্গে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

রাসায়নিক গঠন:

উপাদান		% ও/ও
ইন্ডোক্সাকার্ব স.উ.	সক্রিয় উপাদান	১৪.৫০
নিষ্ক্রিয় এন্টিফোমার	অন্যান্য উপাদান	৬.০০
অ্যামোরফাস সিলিকন ডাইঅক্সাইড	অন্যান্য উপাদান	৭.০০
পলিইথোক্সিলেটেড পলিঅ্যারাইল ফেনল	অন্যান্য উপাদান	৯.০০
পলিইথোক্সিলেটেড পলিঅ্যারাইল ফেনল ফসফেট	অন্যান্য উপাদান	৬.০০
ডিস্টিল্ড মিথাইল সোয়েট	অন্যান্য উপাদান	৫৭.৫০
মোট:		১০০.০০% ও/ও

নির্মাতা এবং বিপণনকারী : ঘরডা কেমিক্যালস লিমিটেড
পঞ্জীকৃত কার্যালয় : ৪৮, হিল রোড, বান্দ্রা (পশ্চিম), মুম্বই ৪০০ ০৫০. ভারত।
ফ্যাক্টরি : প্লট নম্বর: সি-৪/১, খেরদি এম.আই.ডি.সি., শহর: খেরদি, তালুকা: চিপলুন,
জিলা: রত্নগিরি, রাজ্য: মহারাষ্ট্র, পিনকোড: ৪১৫৬০৪. ভারত

Bengali

ಕಿಂಗ್ ಡೊಕ್ಸಾ
ಇಂಡಾಕ್ಸಕಾರ್ಬ್ 14.5% ಎಸ್‌ಸಿ
(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಇಂಡಾಕ್ಸಕಾರ್ಬ್ 14.5% ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವು ಒಂದು ವಿಶಾಲ ರೋಹಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕೋಸು, ತೊಗರಿಕಾಳು, ಭತ್ತ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಿಂಪಡಣೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಉದರ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆ		ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವಿಕೆ (ಲೀಟರ್)	ಕೊಯ್ಲು ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯಂತರ (ದಿನಗಳು)	ಮರುಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
		ಎ.ಐ (ಗ್ರಾಂ)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಮಿಲೀ)			
ಹತ್ತಿ	ಕಾಯಿಕೊರಕ (ಹೆಲಿಕೋವರ್ಪ ಅರ್ಮಿಗೆರಾ)	75	500	600-1000	16	
ಕೋಸು	ಡೈಮಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೊಥ್ (ಪ್ಲುಟೆಲಾ ಕ್ಸೈಲೊಸ್ಟೆಲಾ)	30-40	200-266	400-750	7	
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ	ಹಣ್ಣುಕೊರಕ (ಹೆಚ್.ಆರ್ಮಿಗೆರಾ)	60-75	4005-00	300-600	5	
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ	ಹಣ್ಣುಕೊರಕ (ಹೆಚ್.ಆರ್ಮಿಗೆರಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೊಡೊಪ್ಟೆರಾ ಎಕ್ಸಿಗುವಾ)	50-60	333-400	300-600	5	24
ತೊಗರಿಕಾಳು	ಪಾಡ್ ಬೋರರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ (ಹೆಚ್.ಆರ್ಮಿಗೆರಾ, ಪಾಡ್ ಫ್ಲೈ)	50-60	333-400	500-1000	15	
ಭತ್ತ	ಹಳದಿ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ (ಸ್ಕಿರ್ಪೋಫೆಗಾ ಇನ್‌ಸೆರ್ಟುಲಾಸ್) ಎಲೆಸುತ್ತುವ ಹುಳು (ನ್ಯಾಫಾಲೊಕ್ರೊಸಿಸ್ ಮೆಡಿನಾಲಿಸ್)	30-50	200-333	500	37	
ಸೋಯಾಬೀನ್	ತಂಬಾಕು ಕಂಬಳಿಹುಳು (ಸ್ಪೊಡೊಪ್ಟೆರಾ ಲಿಟ್ಯೂರಾ)	50	333	500	36	
ಕಡಲೆಕಾಳು	ಕಾಯಿಕೊರಕ (ಹೆಚ್.ಆರ್ಮಿಗೆರಾ)	60-75	400-500	500	19	

ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತಮ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ: ಬೆಳೆಗೆ ನೇರವಾದ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೀಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಲೋಕೋನ್ ನಾಝಲ್‌ನಿಂದ ಫಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫೂಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನಂತಹ ಹೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ): ಬೆಳಗಿನ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಳೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು (ಅನ್ವಯವಾಗುವಲ್ಲಿ): ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಬೆಳೆಯ ಹಂತ: ಕೀಟದ ಪ್ರಸಂಗವು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದೆಂದು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಬೆಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು.

ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು: ಹಾಲೋ ಕೋನ್ ನಾಝಲ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಹೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲುಗಾಡಿಸಿ. ಅಳತೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಉಳಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಬಳಕೆಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ. ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಣೆಯು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕವರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಸಲಕರಣೆಯ ವಿಧ: ಹಾಲೋ ಕೋನ್ ನಾಝಲ್ ಅಳವಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫೂಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನಂತಹ ಹೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನಾಝಲ್ ವಿಧ: ಹಾಲೋ ಕೋನ್ ನಾಝಲ್

ಡೋಸೇಜ್: ಡೋಸೇಜ್ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ.

ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಚನೆ: ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಬಳಕೆಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುವಿರಿ.

ಮರುಪ್ರವೇಶದ ಅವಧಿ: 24 ಗಂಟೆಗಳು

ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಮಯ: ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳ ಪ್ರಸಂಗವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ 7-10 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಮಯ: ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುವ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬರುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಆವರ್ತನ: ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಡೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳ ಮುತ್ತಿಗೆಯ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ 7-10 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬಾರದಿರುವ ಹಂತಗಳು: ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ.

ವಿಷಕಾರಿತ್ವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಣ್ಣೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮೃದುವಾದ ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ, ನೋವು ಮತ್ತು ಮಂಜಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿ, ತುರಿಕೆ, ಸುಟ್ಟಂತಹ ಅನುಭವ, ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಊತ ಅಥವಾ ದದ್ದುಗಳು, ಇದರ ಆವಿಯ ಉಸಿರಾಟವು ಕೆಮ್ಮುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಸೌಖ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಉಸಿರಾಟದ ನಾಳಗಳ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅತಿಯಾದ ಡೋಸ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನ್ಯೂರೋಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ದೇಹದ ತೂಕದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ, ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅನಿಮಿಯಾಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕ್ರಮಗಳು: ನುಂಗಲಾಗಿದ್ದರೆ: ಬಾಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯಲು 1 ಅಥವಾ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಕೊಡಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವರೆಗೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ. ಇದರ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರೆ: ಬಾಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿರಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ತಾಪಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆದ್ಯತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ: ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ದೇಹದ ಬಾಧಿತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಹೇರಳವಾದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು, ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿಯು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಹೇರಳವಾದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ: ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹೇರಳವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಬೆಳಕಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಸಂವೇದನೆಯು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ನೇತ್ರ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ, ರೋಗಲಕ್ಷಣಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಸಸ್ಯವಿಷಕಾರಿತ್ವ: ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಡೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧವಿಲ್ಲ.

ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1. ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರವು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. 2. ತಂಪಾದ, ಶುಷ್ಕ, ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಇರುವ, ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು. 3. ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆ ಅಥವಾ ಚೆಲ್ಲಿಹೋದರೆ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವಿಷಕಾರಿತ್ವ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವಶ್ಯಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಸಿಗದಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು.

ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: 1. ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಗಿಯಬೇಡಿ. 2. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಉದ್ದ ತೋಳಿನ ಶರ್ಟ್, ಉದ್ದವಾದ ಪ್ಯಾಂಟ್, ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿರೋಧಕ ಕೈಗವುಸುಗಳು, ಕನ್ನಡಕ ಮತ್ತು ಕವರ್ ಆಗಿರುವ ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. 3. ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಣೆಯು ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 4. ಸ್ಪ್ರೇ ನಾಝಲ್ ಅನ್ನು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಊದಬೇಡಿ, ಕಟ್ಟಿರುವ ನಾಝಲ್ ಅನ್ನು ಸಪೂರ ಕಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. 5. ಉತ್ಪನ್ನವು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಹೇರಳವಾದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 6. ದೇಹದ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆ: 1. ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಬಳಸಬಾರದು. 2. ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದಂತೆ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ. 3. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಜೇನುಹುಳುಗಳಿಗೆ, ಮೀನುಗಳು ಮತ್ತು ಅಕಶೇರುಕಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಜಲಚರಗಳ ಸಾಕಣೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.

ಬಳಸಿದ ಡಬ್ಬಿಗಳು, ಯಂತ್ರದಿಂದ ತೊಳೆದ ನೀರು ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಪರಿಸರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು, ಅಥವಾ ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಮತ್ತು ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ಉತ್ಪಾದಕರ, ಫಾರ್ಮುಲೇಟರ್‌ಗಳ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2.ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎಸೆದುಬಿಡಬಾರದು. 3.ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನವಸತಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಘಟಕ		%ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಇಂಡಾಕ್ಸಕಾರ್ಬ್ ಎ.ಐ	ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ	14.50
ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾದ ಎಂಟಿಫೋಮರ್	ಇತರ ಪದಾರ್ಥ	6.00
ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್	ಇತರ ಪದಾರ್ಥ	7.00
ಪಾಲಿಈಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾಲಿಆರೈಲ್ ಫೆನಾಲ್	ಇತರ ಪದಾರ್ಥ	9.00
ಪಾಲಿಈಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾಲಿಆರೈಲ್ ಫೆನಾಲ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್	ಇತರ ಪದಾರ್ಥ	6.00
ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ಮಿಥೈಲ್ ಸೋಯೇಟ್	ಇತರ ಪದಾರ್ಥ	57.50
ಒಟ್ಟು		100.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು

ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು ವಿವರ: **ಗಾರ್ಡ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್**
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್: 48 ಹಿಲ್ ರೋಡ್, ಬಾಂದ್ರಾ (ಪ), ಮುಂಬಯಿ-400 050, ಇಂಡಿಯಾ.
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. ಸಿ-4/1, ಖೇರಡಿ ಎಮ್ ಐಡಿಸಿ, ಟೌನ್: ಖೇರಡಿ,
ತಾಲ್ಲೂಕು: ಚಿಪ್ಲುನ್, ಜಿಲ್ಲೆ: ರತ್ನಾಗಿರಿ, ರಾಜ್ಯ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ,
ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 415604. ಇಂಡಿಯಾ.

Kannada

కింగ్ డోక్సా
ఇండోక్సాకార్బ్ 14.5% ఎస్‌సి
(కీటకనాశిని)

ఇండోక్సాకార్బ్ 14.5% సస్పెన్షన్ కాన్సన్‌ట్రేట్ అనేది విస్తృత సంధి గల కాంటాక్టు మరియు ఉదర చర్యకు ఆధారపడిన కీటకనాశిని. ప్రత్తి, టమాటా, మిరప, క్యాబేజి, కంది, వరి, సోయాబీన్ మరియు శనగ పంటల్లో కీటకాలను నియంత్రించేందుకు ఆకులపై పిచికారిగా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది.

ఉపయోగించుట:

పంట	కీటకం మామూలు పేరు	మోతాదు/హె		కలపవలసిన నీళ్ళు (లీటర్లు)	పంట కోత ముందరి విరామం (రోజులు)	పునఃప్రవేశ వ్యవధి (రోజులు)
		ఎ.ఐ. (గ్రా)	ఫార్ములేషన్ (మి.లీ)			
ప్రత్తి	కాయతొలుచు పురుగు (హెలికోవర్పా అర్మిజెరా)	75	500	600-1000	16	
క్యాబేజి	డైమండ్ బ్యాక్ మోత్ (ప్లుటెల్లా జైలోస్టెల్లా)	30-40	200-266	400-750	7	
టమాటా	కాయ తొలుచు పురుగు (హెచ్. అర్మిజెరా)	60-75	400-500	300-600	5	
మిరప	కాయ తొలుచు పురుగు (హెచ్. అర్మిజెరా మరియు స్పోడోప్టెరా ఎక్సిగువా)	50-60	333-400	300-600	5	24
కంది	కాయ తొలుచు పురుగు (హెచ్. అర్మిజెరా, కాయతొలుచు ఈగ)	50-60	333-400	500-1000	15	
వరి	పసుపుపచ్చని కాండం తొలుచు పురుగు (సిర్పోఫాగా ఇన్సర్టులస్), ఆకుముడత (నెపాలోక్రోసిస్ మెడినాలిస్)	30-50	200-333	500	37	
సోయాబీన్	పొగాకు లద్దె పురుగు (స్పోడోప్టెరా లిటురా)	50	333	500	36	
శనగ	కాయ తొలుచు పురుగు (హెచ్. అర్మిజెరా)	60-75	400-500	500	19	

పురుగుమందుల వినియోగ టెక్నిక్‌లకు సంబంధించిన మంచి పద్ధతులు, ఉపయోగించేందుకు నిర్దేశనం: పంటపై నేరుగా పిచికారి చేయాలి మరియు కవరేజ్ సమంగా మరియు తగువిధంగా ఉండేలా చూడండి. పైన పట్టికలో సూచించినట్లుగా వివిధ పంటల్లో లక్షిత కీటకాలపై, హాలో కోన్ నాజిల్ బిగించబడిన న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, రాకింగ్ స్ప్రేయర్, ఫుట్ స్ప్రేయర్ లాంటి హై వాల్యూమ్ స్ప్రేయర్‌ని ఉపయోగించవలసిందిగా సిఫారసు చేయడమైనది.

వాతావరణ పరిస్థితి (సాధారణంగా): ఉదయం మరియు సాయంత్రం వేళల్లో పిచికారి చేసేందుకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి. గాలి వీచే రోజున లేదా వర్షం కురవడానికి ముందు పిచికారి చేయకండి.

నేల మరియు నీరు (వర్తించిన చోట): నిర్దిష్ట నేల మరియు నీటి పరిస్థితులు సిఫారసు చేయటం లేదు.

వినియోగించేందుకు పంట దశ: సిఫారసు చేయబడిన పంటలో పంట యొక్క ఎదుగుదలలో కీటకాలు ఆర్థిక నష్టం కలిగించడం కనిపించినప్పుడు ఏ దశలోనైనా దీనిని వినియోగించవచ్చు.

వినియోగించే టెక్నిక్‌లు: హాలో కోన్ నాజిల్ బిగించిన హై వాల్యూమ్ స్ప్రేయర్‌లను ఉపయోగించవలసిందిగా సిఫారసు చేయబడుతోంది. ఉపయోగించడానికి ముందు బాటిల్‌ని బాగా కుదిపివేయండి. ఉత్పాదనను కొలత ప్రకారం తీసుకొని దానికి కొద్ది మొత్తంలో నీరు కలిపి బాగా మిశ్రమం చేయండి మరియు అనంతరం మిగిలిన నీటిని కలిపి, ఉపయోగించడానికి ముందు బాగా కలియబెట్టండి. ముఖ్యంగా సమంగా పిచికారి చేయండి మరియు తగిన కవరేజి ఉండేలా చూడండి.

పరికరాల రకం: హాలో కోన్ నాజిల్ బిగించిన న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, రాకింగ్ స్ప్రేయర్, ఫుట్ స్ప్రేయర్ మొదలైనటువంటి అధిక వాల్యూమ్ స్ప్రేయర్‌ను ఉపయోగించవలసిందిగా సిఫారసు చేయబడింది.

నాజిల్ రకం: హాలో కోన్ నాజిల్

మోతాదు: మోతాదు వివరాల కొరకు దయచేసి పై పట్టిక చూడండి.

మిశ్రమం చేసేందుకు సూచన: ఉత్పాదనను కొలత ప్రకారం తీసుకొని దానికి కొద్ది మొత్తంలో నీరు కలిపి బాగా మిశ్రమం చేయండి. అనంతరం మిగిలిన నీటిని కలిపి ఉపయోగించడానికి ముందు బాగా కలియబెట్టండి.

పునఃప్రవేశ వ్యవధి: 24 గంటలు

వినియోగించవలసిన విధానం మరియు సమయం: పైన పేర్కొన్న పంటలకు పొలంలో కీటకాలు కనిపించినప్పుడు 7-10 రోజుల విరామంలో వినియోగించవచ్చు.

వినియోగించవలసిన సమయాలు: ఉదయం మరియు సాయంత్రం వేళల్లో పిచికారి చేయడానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి. గాలి వీచే రోజున లేదా వర్షం కురిసేప్పుడు వినియోగించకండి.

గరిష్ఠ పిచికారీల సంఖ్యతో సహా తరచుదనం: 7-10 రోజుల విరామంలో ఒకటి నుండి రెండు పిచికారీలు చేయవచ్చు. పంటపై కీటకాలు కనిపించినప్పుడు, పైన పట్టికలో పేర్కొన్న మోతాదులో వినియోగించవచ్చు.

పురుగుమందును వినియోగించకూడని దశలు: వినియోగించేందుకు పంట లో సూచించిన దశలో మాత్రమే వినియోగించండి. ఇతర దశ లేనిలో వినియోగించకండి.

విషపు లక్షణాలు: కన్నీరు కారుతూ స్వల్పంగా కళ్ళు మంటపుట్టడం, నొప్పి, లేదా కంటిచూపు మసకబారడం, కంటి దురద, మంటపడం, ఎర్రబడడం, వాపు లేదా దద్దుర్లు కలగవచ్చు. ఆవిరిని పీల్చడం వల్ల దగ్గు మరియు అసౌకర్యంతో ఎగువ శ్వాస మార్గాలు మంట లాంటి కలిగించవచ్చు. జంతువులపై చేసిన పరీక్షల ఆధారంగా, అధిక మోతాదు న్యూరోటాక్సిసిటీ చిహ్నాలు దారితీయొచ్చు. ఎక్కువ కాలం గురికావడంతో శరీరం బరువు కోల్పోవడం మరియు స్వల్ప, రివర్సిబుల్ రక్తహీనతకు దారితీస్తుందని అనుకోవచ్చు.

ప్రాథమిక చికిత్స చర్యలు: మింగితే: రోగి స్పృహలో మరియు అప్రమత్తంగా ఉంటే, నీటితో నోరు కడిగి తాగడానికి 1 లేదా 2 గ్లాసుల మంచినీళ్ళు ఇవ్వండి. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి నోటి గుండా ఎప్పుడూ ఏదీ ఇవ్వరాదు. డాక్టరును పిలిచండి. చికిత్స చేస్తున్న ఫిజీషియన్ కోరితే తప్ప వాంతి చేసేలా ప్రేరేపించకండి. పీల్చితే: బాధితుడిని తాజా గాలి వీచే చోటుకు తీసుకెళ్ళి, శరీర ఉష్ణోగ్రత విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. బాధితుడు శ్వాస తీసుకోకపోతుంటే లేదా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉంటే, కృత్రిమ శ్వాస ఇవ్వండి, నోటితో నోరు పెట్టి శ్వాస ఇవ్వడానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి. ఫిజీషియన్‌ని సంప్రదించండి. చర్మంతో తగిలితే: జుట్టు మరియు గోళ్ల కింద సహా ప్రభావిత శరీర భాగాన్ని సబ్బు మరియు సమృద్ధిగా నీటితో బాగా కడగండి. నొప్పి, ఎర్రబడటం లేదా చికాకు ఉంటే, డాక్టరును సంప్రదించండి. మలినమైన దుస్తులన్నింటినీ వేరుచేసి మళ్ళీ ధరించే ముందు సబ్బు మరియు నీటితో బాగా ఉతకాలి. కళ్ళలో పడితే: కనీసం 15 నిమిషాల సేపు ఎక్కువ నీటితో నెమ్మదిగా చల్లుకోండి. నొప్పి, మంటపుట్టడం, ఎర్రబడటం లేదా ఫోటోఫోబియా ఉంటే, కంటి నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

విరుగుడు: నిర్దిష్ట విరుగుడు తెలియదు. లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయాలి.

మొక్కకు విషతుల్యత: సిఫారసు చేసిన మోతాదులో మొక్కకు విషతుల్యం కలగదు.

నిల్వచేయుట: 1. ఆహార పదార్థాలు మరియు జంతువుల దాణా కలుషితం కాని విధంగా నిల్వ మరియు రవాణా చేయాలి. 2. ఆహార పదార్థాలకు మరియు జంతువుల దాణాకు దూరంగా చల్లని పొడి మరియు గాలి వెలుతురు ఉన్న చోటు సముచితమైన గదిలో అసలు డబ్బాల్లో నిల్వ చేయాలి. 3. రవాణా చేసేటప్పుడు లేదా నిల్వ చేసేటప్పుడు లీకేజీ లేదా చిందిపోవడం కలిగితే, విషపూరితం కావడాన్ని మరియు నేల మరియు నీరు కలుషితమవ్వడాన్ని నిరోధించేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలి. పిల్లలకు దూరంగా ఉంచాలి.

సురక్షిత ముందుజాగ్రత్తలు: 1. పిచికారి చేసేప్పుడు తినకూడదు, తాగకూడదు, పొగతాగడం చేయకూడదు లేదా తమలపాకులు నమలకూడదు. 2. ఉత్పాదనను సంభాళించేటప్పుడు పొడుగు చేతుల చొక్కా, పొడవాటి ప్యాంటు, రసాయన నిరోధక గ్లౌజులు, మాస్క్, కళ్ళజోడు మరియు ఆచ్ఛాదన గల బూట్లు ధరించాలి. 3. గాలి వాటం దిశలో పిచికారి చేయడం ద్వారా పిచికారి చేసే వ్యక్తిపై పిచికారి పడకుండా నివారించండి. 4. నోటితో పిచికారి నాజిల్‌ని ఊదకూడదు, పూడుకుపోయిన నాజిల్‌ని సన్నని స్ప్రే లేదా బ్రష్‌తో శుభ్రం చేయాలి. 5. ఒకవేళ ఉత్పాదన శరీరంపై ఒలికి పడితే, ముందు పడిన భాగాలను సబ్బు మరియు ఎక్కువ నీటితో కడగాలి. 6. చేతులు మరియు మందు పడిన శరీర భాగాలను సరిగ్గా శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఉపయోగించిన తరువాత మలినపడిన దుస్తులను విప్పి వేరేగా ఉతకండి.

హెచ్చరిక: 1. లేబుల్ మరియు కరపత్రంలో తెలియజేసిన వాటికి కాకుండా ఇతర పనులకు వీటిని ఉపయోగించకూడదు. 2. ఉపయోగించిన తరువాత కరపత్రంలో నిర్దేశించినట్లుగా డబ్బాను నిర్వీర్యం చేయండి. 3. ఈ ఉత్పాదన తేనెటీగలకు విషపూరితం కాబట్టి తగు అవి సంచరించే సమయంలో పిచికారి చేయకండి. **4. ఈ ఉత్పాదన చేపలకు మరియు రొయ్యలకు అత్యంత విషపూరితమైనది కాబట్టి ఆక్వాకల్చర్ కి దగ్గరలో ఉపయోగించకూడదు.**

ఉపయోగించిన డబ్బాలను, పరికరాలను కడిగిన నీటిని మరియు మిగులు ఉత్పాదనని నిర్వీర్యం చేయుటం: 1. ప్యాకేజీలను లేదా మిగులు ఉత్పాదనని మరియు డబ్బాలను కడిగిన నీటిని పర్యావరణం లేదా నీటి కాలుష్యం నివారించే విధంగా సురక్షితమైన పద్ధతిలో విసర్జించవలసిన బాధ్యత కీటకనాశిని తయారీదారుది, రూపకర్తది మరియు ఆపరేటర్‌ది. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను మళ్ళీ ఉపయోగించకుండా నిరోధించేందుకు ఆరుబయట వదలివేయకూడదు. 3. ప్యాకేజీలను నిర్మూలించి నివాస ప్రాంతాలకు దూరంగా నేలలో పూడ్చిపెట్టాలి.

రసాయనిక మిశ్రమం:

పదార్థం		% బ/బ
ఇండోక్సాకార్బ్ ఎ.ఐ.	క్రియాశీల పదార్థం	14.50
నిష్క్రియాత్మక ఎనాంటిఫోమర్	వేరొక పదార్థం	6.00
అమోర్ఫస్ సిలికాన్ డయాక్సైడ్	వేరొక పదార్థం	7.00
పాలిఎథోక్సిలేటెడ్ పాలిఆర్యల్ ఫినాల్	వేరొక పదార్థం	9.00
పాలిఎథోక్సిలేటెడ్ పాలిఆర్యల్ ఫినాల్ ఫాస్ఫేట్	వేరొక పదార్థం	6.00
డిస్టిల్డ్ మిథైల్ సోయేట్	వేరొక పదార్థం	57.50
మొత్తం:		100.00% బ/బ

వీరి ద్వారా తయారుచేయబడినది మరియు మార్కెట్ చేయబడుతున్నది : ఘర్డ కెమికల్స్ లిమిటెడ్
రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ : 48 హిల్ రోడ్, బాంద్రా (వెస్ట్), ముంబయి 400050. ఇండియా.
ఫ్యాక్టరీ : ప్లాట్ నం.సి 4/1, ఎమ్ఐడిసి ఖర్డి, టౌన్: ఖర్డి, తాలూక : చిప్లున్,
జిల్లా: రత్నగిరి, రాష్ట్రం: మహారాష్ట్ర, పిన్‌కోడ్: 415604. ఇండియా

Telugu

கிங் டோக்ஸா
இண்டோக்ஸாகார்ப் 14.5% எஸ்சி
(பூச்சிக்கொல்லி)

இண்டோக்ஸாகார்ப் 14.5% சஸ்பென்ஷன் கான்சென்ட்ரேட் என்பது பருத்தி, தக்காளி, மிளகாய், முட்டைக்கோஸ், துவரை, அரிசி, சோயாபீன் மற்றும் கொண்டைக்கடலை ஆகியவற்றில் உள்ள பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த இலைவழித் தெளிப்பாகப் பயன்படும் ஒரு பரந்த அளவிலான தொடர்பு மற்றும் வயிற்றுப் பூச்சிக்கொல்லி ஆகும்.

பரிந்துரைப்பு:

பயிர்	பூச்சியின் பொதுவான பெயர்	மருந்தளவு/ஹெக்		தண்ணீரில் நீர்க்கச் செய்வது (லிட்டர்)	அறுவடைக்கு முந்தைய இடைவெளி (நாட்கள்)	மீண்டும்-செல்வதற்கான காலம் (நாட்கள்)
		ஏ.ஐ. (கி)	ஃபார்முலேஷன் (மிலி)			
பருத்தி	பருத்திக் காய்ப்புழு (ஹெலிகோவர்பா ஆர்மிகெரா)	75	500	600-1000	16	
முட்டைகோஸ்	வைர முதுகு அந்துப்பூச்சி (புளூடெல்லா சைலோஸ்டெல்லா)	30-40	200-266	400-750	7	
தக்காளி	பழ துளைப்பான் புழு (ஹெச். ஆர்மிகெரா)	60-75	400-500	300-600	5	
மிளகாய்	பழ துளைப்பான் புழு (ஹெச். ஆர்மிகெரா மற்றும் ஸ்போடோப்டெரா எக்சிகுவா)	50-60	333-400	300-600	5	24
துவரை பயிறு	காய் துளைப்பான் காம்ப்ளக்ஸ் (ஹெச். ஆர்மிகெரா, போட் ஃப்ளை)	50-60	333-400	500-1000	15	
அரிசி	மஞ்சள் தண்டு துளைப்பான் (ஸ்கிர்போபேகா இன்சர்டுலாஸ்), இலை சுருட்டுப்புழு (நாபலோக்ரோசிஸ் மெடினாலிஸ்)	30-50	200-333	500	37	
சோயாபீன்	வெட்டுப்புழு (ஸ்போடோப்டெரா லிட்டூரா)	50	333	500	36	
கொண்டைக்கடலை	புள்ளி காய் துளைப்பான் (ஹெச். ஆர்மிகெரா)	60-75	400-500	500	19	

பூச்சிக்கொல்லி பயன்பாட்டு நுட்பங்கள் தொடர்பான நல்ல நடைமுறைகள் பயன்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள்: பயிரை நோக்கி நேரடியாக தெளிக்கவும், சீரான மற்றும் சரியான பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும். மேலே உள்ள அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி வெவ்வேறு பயிர்களின் இலக்கு பூச்சிகளுக்கு எதிராக ஆழமான குழி உள்ள முனை பொருத்தப்பட்ட நாப்சாக் ஸ்ப்ரேயர், ராக்கிங் ஸ்ப்ரேயர், ஃபுட் ஸ்ப்ரேயர் போன்ற அதிக அளவு ஸ்ப்ரேயரை பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

தட்பவெப்பநிலை (பொதுவாக): காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் தெளிப்பது நல்லது. காற்று வீசும் நாளில் அல்லது மழைக்கு முன்பு பயன்படுத்தக் கூடாது.

மண் மற்றும் தண்ணீர் (பொருந்தக்கூடிய இடங்களில்): குறிப்பிட்ட மண் மற்றும் தண்ணீர் நிலைகள் எதுவும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.

பயன்படுத்துவதற்கான பயிர் நிலை: பொருளாதார இழப்பை ஏற்படுத்தும் பூச்சிகளின் தாக்கம் காணப்பட்டால், பயிர் வளர்ச்சியின் எந்த நிலையிலும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட பயிரில் பயன்படுத்தப்படலாம்.

பயன்பாட்டு நுட்பங்கள்: ஆழமான குழி உள்ள முனை பொருத்தப்பட்ட அதிக அளவு ஸ்ப்ரேயர்களைப் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு பாட்டிலை நன்றாக குலுக்கவும். உற்பத்தியின் அளவிடப்பட்ட அளவை எடுத்து, அதனுடன் ஒரு சிறிய அளவு தண்ணீரை சேர்த்து, நன்கு கலந்து, மற்றும் அதன்பிறகு மீதமுள்ள அளவு தண்ணீரைச் சேர்த்து, பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு நன்கு கலக்கவும். ஒரே சீரான முறையில் தெளித்து, செடியின் மீது தெளிப்பு சரியான முறையில் படுவதை உறுதி செய்யவும்.

உபகரண வகை: ஆழமான குழி உள்ள முனை பொருத்தப்பட்ட நாப்சாக் ஸ்ப்ரேயர், ராக்கிங் ஸ்ப்ரேயர், ஃபுட் ஸ்ப்ரேயர் போன்ற அதிக அளவு ஸ்ப்ரேயரை பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

முனை வகை: ஆழமான குழி முனை

மருந்தளவு: மருந்தளவு விவரங்களுக்கு மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையைப் பார்க்கவும்.

கலக்குவதற்கான வழிமுறைகள்: உற்பத்தியின் அளவிடப்பட்ட அளவை எடுத்து, அதனுடன் ஒரு சிறிய அளவு தண்ணீரைச் சேர்த்து, நன்கு கலந்து, மற்றும் அதன்பிறகு மீதமுள்ள அளவு தண்ணீரைச் சேர்த்து, பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு நன்கு கலக்கவும்.

மீண்டும்-செய்வதற்கான காலம்: 24 மணிநேரம்

பயன்படுத்தும் முறை மற்றும் நேரம்: வயலில் பூச்சிகளின் தாக்கம் காணப்பட்டால் 7-10 நாட்கள் இடைவெளியில் மேலே குறிப்பிட்ட பயிர்களுக்குப் பயன்படுத்தலாம்.

பயன்படுத்துவதற்கான நேரங்கள்: காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் தெளிப்பது நல்லது. காற்று வீசும் நாளில் அல்லது மழைக்கு முன்பு பயன்படுத்தக் கூடாது.

அதிகபட்ச எண்ணிக்கையிலான ஸ்ப்ரேக்கள் உட்பட அடுக்குநிகழ்வு: மேலே குறிப்பிட்டுள்ள அட்டவணையில் பூச்சிகளின் தாக்கம் காணப்பட்டால், 7-10 நாட்கள் இடைவெளியில் ஒன்று முதல் இரண்டு முறை தெளிக்க வேண்டும்.

எந்தவொரு பயிரிலும் பூச்சிக்கொல்லிகளை பயன்படுத்தக் கூடாத நிலைகள் இருக்க வேண்டும்: பயன்பாட்டிற்காக பயிர் கட்டத்தில் அறிவுறுத்தப்பட்ட கட்டத்தில் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும், வேறு எந்த நிலையிலும் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

விஷத்தின் அறிகுறிகள்: லேசான கண் எரிச்சல், பிளவு, வலி அல்லது மங்கலான பார்வை, அரிப்பு, எரிவு, சிவத்தல், வீக்கம் அல்லது சரும தடிப்புகள் ஆகியவை உள்ளிழுப்பது மேல் சுவாசக் குழாய்களில் எரிச்சல் மற்றும் இருமல் மற்றும் அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தலாம். விலங்கு சோதனைகளின் அடிப்படையில், அதிக அளவு அதிகமாக உட்கொள்வது நியூரோடாக்சிசிட்டி அறிகுறிகளுக்கு வழிவகுக்கும். நீடித்த அதிகப்படியான வெளிப்பாடு உடல் எடை இழப்பு மற்றும் லேசான, மீண்டும் வரக்கூடிய இரத்த சோகையை விளைவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

முதலுதவி நடவடிக்கைகள்: விழுங்கி விட்டால்: நபர் உணர்வுடன் மற்றும் விழிப்புடன் இருந்தால், தண்ணீரால் வாயை கொப்பளிக்கச் செய்யவும் மற்றும் குடிக்க 1 அல்லது 2 கிளாஸ் தண்ணீர் குடிக்கவும். சுயநினைவு இல்லாத ஒரு நபருக்கு வாய்வழியே எதுவும் கொடுக்கக் கூடாது. மருத்துவரை அழைக்கவும். கவனிக்கும் மருத்துவர் கருதும் வரை மற்றும் கருதினால் ஒழிய வாந்தி எடுக்க தூண்டாதீர்கள். உட்சுவாசித்தால்: நோயாளியை காற்றோட்டமாக பகுதிக்கு கொண்டு செல்லவும் மற்றும் உடல் வெப்பநிலையை கவனத்தில் கொள்ளவும். நோயாளி சுவாசிக்கவில்லை அல்லது சிரமத்துடன் சுவாசிக்கிறார் என்றால், செயற்கை சுவாசம் கொடுக்கவும், வாயில் வைத்து காற்றை ஊதுவது உசிதமானது. ஒரு மருத்துவரை ஆலோசிக்கவும். சருமத்தில் பட்டு விட்டால்: உடல் பாகங்களை முடி மற்றும் விரல் நகங்களுக்கு கீழே உள்பட பாதிக்கப்பட்ட பாகங்களை சோப்பு போட்டு நிறைய தண்ணீரால் நன்றாக கழுவவும். வலி, சிவத்தல், அல்லது எரிச்சல் நீடித்தால் ஒரு மருத்துவரை ஆலோசிக்கவும். மருந்து கறை படிந்த ஆடைகளை தனியாக வைக்கவும் மற்றும் சோப்பு போட்டு முழுமையாக கழுவவும் மற்றும் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு தனியாக கழுவவும். **தண்ணீரில் பட்டு விட்டால்:** நிறைய தண்ணீரால் குறைந்தது 15 நிமிடங்களுக்கு இதமாக கழுவவும். வலி, எரிச்சல், சிவத்தல் அல்லது ஒளிக்கு கூசுதல் நீடித்தால் கண் நிபுணருடன் ஆலோசிக்கவும்.

நச்சுமுறிவு: பிரத்யேக நச்சுமுறிவு எதுவும் அறியப்படவில்லை. அறிகுறிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கவும்.

பைட்டோடாக்சிசிட்டி: பரிந்துரைக்கப்பட்ட மருந்தளவில் பைட்டோ டாக்ஸிக் அல்லாதது

சேமிக்கும் நிலைகள்: 1. உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் கால்நடை தீவனம் மாசுபடாத வகையில் தாவர வளர்ச்சி சீராக்கியின் சேமிப்பு மற்றும் போக்குவரத்து செய்யப்பட வேண்டும். 2.குளிர்ந்த, உலர்ந்த, நன்கு காற்றோட்டமான, நன்கு கட்டப்பட்ட அறைகளில் போதுமான அசல் பெட்டிகளில் மற்றும் அதன் அசல் பேக்குகளில், உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் விலங்குகளின் தீவனங்களுக்கு அப்பால் சேமிக்கவும். 3. போக்குவரத்து அல்லது சேமிப்பின் போது கொட்டுதல் அல்லது கசிவு ஏற்பட்டால், மண் மற்றும் தண்ணீர் நச்சுத்தன்மை மற்றும் மாசுபடுவதைத் தடுக்க தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். குழந்தைகளுக்கு கிடைக்காதபடி வைக்கவும்.

பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. தெளிக்கும் போது வெற்றிலையை உண்ணவோ, குடிக்கவோ, புகைபிடிக்கவோ அல்லது மெல்லவோ கூடாது. 2. மருந்தை கையாளும் போது நீண்ட சட்டை, நீண்ட கால்சட்டை, இரசாயன எதிர்ப்பு கையுறைகள், முகக்கவசம், கண்ணாடி மற்றும் மூடப்பட்ட காலணிகளை அணியுங்கள். 3. காற்றின் திசைப்படி தெளிப்பதன் மூலம் தெளிக்கும் நபர் மீது தெளிப்பு படுவதை தவிர்க்கவும். 4. ஸ்ப்ரே முனையை வாயால் ஊதாதீர்கள். தடுக்கப்பட்ட முனையை மெல்லிய தண்டு அல்லது பிரஷ் மூலம் சுத்தம் செய்யுங்கள். 5. உடலில் ஏதேனும் பட்டுவிட்டால், பாகங்களை சோப்பு மற்றும் நிறைய தண்ணீர் கொண்டு கழுவவும். 6. கைகள் மற்றும் உடலின் பாதுகாப்பற்ற பாகங்களை முறையாக கழுவவும். பயன்படுத்திய பிறகு அசுத்தமான ஆடைகளை தனித்தனியாக அகற்றி துவைக்கவும்.

எச்சரிக்கை அறிக்கை: 1. லேபிள் மற்றும் துண்டுப்பிரசுரங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளவை தவிர வேறு எந்த நோக்கத்திற்காகவும் பயன்படுத்தக்கூடாது. 2. துண்டுப்பிரசுரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி பயன்படுத்திய பிறகு பாட்டிலை உடைத்து விடவும். 3. இந்த மருந்து தேனீக்களுக்கு நச்சுத்தன்மை கொண்டது, ஆகவே தேன் முழுமையாக தேடும் காலத்தில் தெளிக்க வேண்டாம். **4. மருந்து நீர்வாழ் தாவரங்கள், மீன் மற்றும் முதுகெலும்பில்லாத உயிரினங்களுக்கு மிகவும் நச்சுத்தன்மையுடையது மற்றும் மீன் வளர்ப்பிலும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது.**

பயன்படுத்திய டப்பாவை அப்புறப்படுத்தல், உபகரணங்கள் மற்றும் உபரிப் பொருட்களை கழுவுதல்: 1. சுற்றுச்சூழல் மற்றும் தண்ணீர் மாசுபடுவதை தடுக்க ஒரு பாதுகாப்பான முறையில் பேக்கேஜ்கள் அல்லது உபரி பொருட்கள் மற்றும் கழுவிய நீரை அப்புறப்படுத்துவது தயாரிப்பாளர்கள், உற்பத்தியின் பூச்சிக்கொல்லியின் ஃபார்முலேட்டர்கள் மற்றும் இயக்குபவர்களின் கடமையாகும். 2. பயன்படுத்திய பேக்கேஜ்களை மீண்டும் பயன்படுத்தும் வகையில் வெளியே விட்டு வைக்கக் கூடாது. 3. பேக்கேஜ்களை உடைத்து குடியிருப்புப் பகுதியிலிருந்து தொலைவில் புதைக்க வேண்டும்.

வேதியியல் உருவாக்கம்:

உட்பொருள்		% டபிள்யூ/டபிள்யூ
இண்டோக்ஸாகார்ப் ஏ.ஐ.	செயலாற்றல் உள்ள உட்பொருள்	14.50
செயலற்ற எண்டிஃபோமர்	இதர உட்பொருள்	6.00
அமார்ஃபஸ் சிலிக்கான் டை ஆக்சைடு	இதர உட்பொருள்	7.00
பாலிஈத்தாக்சிலேட்டட் பாலிஏரில் பீனால்	இதர உட்பொருள்	9.00
பாலிஈத்தாக்சிலேட்டட் பாலிஏரில் பீனால் பாஸ்பேட்	இதர உட்பொருள்	6.00
டிஸ்டில்டு மெத்தில் சோயேட்	இதர உட்பொருள்	57.50
மொத்தம்		100.00% டபிள்யூ/டபிள்யூ

தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் சந்தைப்படுத்துவோர்: **கர்டா கெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட்**
பதிவு அலுவலகம்: 48, ஹில் ரோடு, பாந்திரா (மே), மும்பை - 400050, இந்தியா.
தொழிற்சாலை : பிளாட் என். சி-4/1, கேர்டி எம்.ஐ.டி.சி., டவுன்: கேர்டி, தாலுகா: சிப்லூன்,
மாவட்டம்: ரத்னகிரி, மாநிலம்: மகாராஷ்டிரா, பின்கோட்: 415604. இந்தியா.

Tamil

കിംഗ് ഡോക്സ
ഇൻഡോക്സാകാർബ് 14.5 % എസ്‌സി
(കീടനാശിനി)

ഇൻഡോക്സാകാർബ് 14.5 % സസ്പെൻഷൻ കോൺസൻട്രേറ്റ് വിശാല പ്രവർത്തന മണ്ഡലമുള്ള സമ്പർക്കത്താലും ഉദരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കീടനാശിനിയാണ്. പരുത്തി, തക്കാളി, മുളക്, ക്യാബേജ്, കടല, നെല്ല്, സോയാബീൻ, തുവര പയർ എന്നിവയിലെ കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഇലകളിൽ തളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ശുപാർശകൾ:

വിളകൾ	കീടങ്ങളുടെ സാധാരണ പേര്	ഡോസേജ്/ ഹെക്ടർ		വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിക്കൽ (ലിറ്റർ)	വിളവെടുപ്പിനു മുമ്പുള്ള ഇടവേള (ദിവസം)	പുനപ്രവേശ കാലയളവ് (ദിവസം)
		എ.ഐ (ഗ്രാം)	ഫോർമുലേഷൻ (മില്ലി)			
പരുത്തി	ബോൾ വേം (ഹെലികോവെർപ ആർമിഗേര)	75	500	600-1000	16	
ക്യാബേജ്	ഡയമണ്ട് ബാക്ക് മോത്ത് (പ്ലൂട്ടെല്ല സൈലോസ്റ്റെല്ല)	30-40	200-266	400-750	7	
തക്കാളി	കായ തുരപ്പൻ (എച്ച്. ആർമിഗേര)	60-75	400-500	300-600	5	
മുളക്	കായ തുരപ്പൻ (എച്ച്. ആർമിഗേര, സ്പോഡോപ്റ്റെര എക്സിഗ്വ)	50-60	333-400	300-600	5	24
തുവരപ്പരിപ്പ്	കോ തുരപ്പൻ (എച്ച്. ആർമിഗേര, കായ ഈച്ച)	50-60	333-400	500-1000	15	
നെല്ല്	മഞ്ഞ തണ്ടു തുരപ്പൻ (സ്കിർപോഫേഗ ഇൻസെർട്ടുലസ്), ഇലചുരുട്ടി, ക്നാഫലോക്രോസിസ് മെഡിനാലിസ്	30-50	200-333	500	37	
സോയാബീൻ	പുകയില പുഴു (സ്പോഡോപ്റ്റെര ലിറ്റൂര)	50	333	500	36	
കടല	പുള്ളി തുരപ്പൻ (എച്ച്. ആർമിഗേര)	60-75	400-500	500	19	

കീടനാശിനി പ്രയോഗ രീതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല രീതികൾ, ഉപയോഗ നിർദ്ദേശം: വിളകൾക്ക് നേരെ നേരിട്ട് തളിക്കുകയും ഏകീകൃതവും ശരിയായതുമായ കവറേജ് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക. മേൽപ്പറഞ്ഞ പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ വിവിധ വിളകളിൽ ലക്ഷ്യ കീടനാശിനികൾക്കെതിരെ ഹോളോ കോൺ നോസിൽ ഘടിപ്പിച്ച നാപ്സാക്ക് സ്പ്രേയർ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടറൈസ്ഡ് നാപ്സാക്ക് സ്പ്രേയർ ഉപയോഗിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

കാലാവസ്ഥ (പൊതുവിൽ): രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും തളിക്കുക. കാറ്റുള്ള ദിവസത്തിലോ മഴയ്ക്ക് മുമ്പോ പ്രയോഗിക്കരുത്.

മണ്ണും വെള്ളവും (ബാധകമാകുന്നിടത്ത്): പ്രത്യേക മണ്ണ് ജല സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല.

പ്രയോഗത്തിനുള്ള വിള ഘട്ടം: പ്രാണികളുടെ ആക്രമണം സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഘട്ടമായി നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ വിള വളർച്ചയുടെ ഏത് ഘട്ടത്തിലും ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന വിളകളിൽ പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

പ്രയോഗ വിദ്യകൾ: ഹോളോ കോൺ നോസിൽ ഘടിപ്പിച്ച നാപ്സാക്ക് സ്പ്രേയർ ഉപയോഗിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നന്നായി ഇളക്കുക. ആവശ്യമായ അളവിൽ ഉൽപന്നം എടുത്ത് അല്പം വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിച്ച് നന്നായി ഇളക്കുക. അതിനുശേഷം സ്പ്രേയുടെ അളവ് അനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായി ഇളക്കുക. ഒരേ അളവിൽ സസ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ശരിയായ കവറേജ് കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ തളിക്കുക.

ഉപകരണ തരം: ഹോളോ കോൺ നോസിൽ ഘടിപ്പിച്ച നാപ്സാക്ക് സ്പ്രേയർ റോക്കിംഗ് സ്പ്രേയർ, ഫുട്ട് സ്പ്രേയർ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

നോസിൽ ടൈപ്പ്: ഹോളോ കോൺ നോസിൽ

ഡോസ്: ഡോസ് വിശദാംശങ്ങൾക്ക് മുകളിലുള്ള പട്ടിക കാണുക.

മിക്സിംഗിനുള്ള നിർദ്ദേശം: ആവശ്യമായ അളവിൽ ഉൽപന്നം എടുത്ത് അൽപം വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. അതിനുശേഷം സ്പ്രേയുടെ അളവ് അനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായി ഇളക്കുക.

പ്രയോഗിക്കുന്ന രീതിയും സമയവും: മേൽപ്പറഞ്ഞ വിളകൾക്ക് കൃഷിയിടത്തിൽ കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം കാണുമ്പോൾ 7-10 ദിവസത്തെ ഇടവേളയിൽ പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

പ്രയോഗ സമയം: രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. കാറ്റുള്ള ദിവസത്തിലോ മഴയിലോ പ്രയോഗിക്കരുത്.

പരമാവധി എണ്ണം സ്പ്രേകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവൃത്തി: 7-10 ദിവസത്തെ ഇടവേളയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പ്രേകൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന അളവിൽ പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ഒരു വിളയിലും കീടനാശിനി പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഘട്ടങ്ങൾ: പ്രയോഗത്തിന്റെ വിള ഘട്ടത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം മാത്രം പ്രയോഗിക്കുക. മറ്റ് ഘട്ടങ്ങളിലൊന്നും പ്രയോഗിക്കരുത്.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ: കണ്ണിൽ ചെറിയ ചൊറിച്ചിലും കണ്ണ് തൊലിപ്പും വേദനയും മങ്ങിയ കാഴ്ചയും ചൊറിച്ചിലും ചുവപ്പും ചർമ്മത്തിൽ വീക്കവും തിണർപ്പും ഉണ്ടായേക്കാം. ബാഷ്പം ശ്വസിക്കുന്നത് ശ്വാസനാളിയുടെ ഉപരിഭാഗത്ത് അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് കാരണമാകാം, ഒപ്പം ചുമയും അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകാം. മൃഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ , അമിതമായ ഡോസ് ന്യൂറോ ടോക്സിസിറ്റിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. ദീർഘകാലം ഈ ഉൽപന്നത്തിന്റെ വെളിപ്പെടൽ ഉണ്ടായാൽ ശരീരഭാരം കുറയുകയും മാറ്റാവുന്ന വിളർച്ചക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യാം.

പ്രഥമശുശ്രൂഷ: 1. വിഴുങ്ങിയാൽ രോഗിക്ക് ബോധവും ജാഗ്രതയുമുണ്ടെങ്കിൽ, വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വായ കഴുകുക, ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ നൽകുക, ബോധ രഹിതനായ വ്യക്തിയുടെ വായിലൂടെ ഒരിക്കലും ഒന്നും നൽകരുത്. പരിശോധിക്കുന്ന ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചാലല്ലാതെ രോഗിയെ ഛർദ്ദിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. . ശ്വസിച്ചതാണെങ്കിൽ, രോഗിയെ ശുദ്ധ വായുസഞ്ചാരമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുക. ശരീര താപനില ശ്രദ്ധിക്കുക. വ്യക്തിയുടെ ശ്വസനം നിലയ്ക്കുകയോ ബുദ്ധിമുട്ടോടെ ശ്വസിക്കുകയോ ആണെങ്കിൽ, കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നൽകുക, വായോട് വായ ചേർത്ത് ശ്വാസം നൽകുക, ഉടൻ വൈദ്യോപദേശം തേടുക. ഉടൻ വൈദ്യസഹായം തേടുക. ചർമ്മവും മലിനമാണെങ്കിൽ, മലിനമായ ചർമ്മം ധാരാളം സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക, നഖത്തിന്റെ അടിയിലും രോമങ്ങളും അടക്കം ഭാഗങ്ങൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകണം. പ്രകോപനം, ചുവപ്പ്, വേദന എന്നിവ തുടരുകയാണെങ്കിൽ, വൈദ്യോപദേശം തേടുക. മലിനമായ എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളും കൂട്ടിയിട്ട് ധാരാളം വെള്ളവും സോപ്പും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം മാത്രം വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക. . കണ്ണുകൾ മലിനമായാൽ, കുറഞ്ഞത് 15 മിനിറ്റെങ്കിലും ധാരാളം ശുദ്ധജലം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക. ചൊറിച്ചിൽ, വേദന, പ്രകോപനം എന്നിവ തുടരുകയാണെങ്കിൽ, നേത്ര സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം തേടുക.

മറുമരുന്ന്: പ്രത്യേക മറുമരുന്ന് അറിവില്ല. ലക്ഷണമനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കുക

സസ്യവിഷബാധ: ശുപാർശിതമായ ഡോസിൽ ഉൽപ്പന്നം സസ്യവിഷബാധ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല.

സംഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ: 1.സസ്യവളർച്ച നിയന്ത്രകത്തിന്റെ സംഭരണവും ഗതാഗതവും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും കാലിത്തീറ്റയും മലിനമാകാത്ത വിധത്തിൽ ചെയ്യണം. 2. തണുത്തതും വരണ്ടതും നന്നായി വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും ആവശ്യത്തിന് വലുപ്പവും ഉറപ്പും ഉള്ള മുറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക, കൂടാതെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ കണ്ടെയ്നറുകളിൽ, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ നിന്നും കാലിത്തീറ്റകളിൽ നിന്നും അകലെ സൂക്ഷിക്കുക. 3. ഗതാഗതത്തിലോ സംഭരണ സമയത്തോ ചോർച്ചയോ തുളുമ്പലോ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മണ്ണിന്റെയും വെള്ളത്തിന്റെയും വിഷബാധയും മലിനീകരണവും തടയുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണം. കുട്ടികളിൽനിന്നും നിന്നും ദൂരെ വയ്ക്കുക.

സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ: 1. സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ പുകവലിക്കുകയോ, കുടിക്കുകയോ തിന്നുകയോ മുറുക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. 2. കലക്കുമ്പോഴും തളിക്കുമ്പോഴും മുഴുവൻ പരിരക്ഷ നൽകുന്ന മുഴുക്കയ്യൻ ഷർട്ട്, നീളൻ പാന്റ്സ്, രാസ പ്രതിരോധമുള്ള ഗ്ലൗസ്, മാസ്ക്, ഗോഗിൾസ്, കവേർഡ് ഷൂസ്, എന്നിവ ധരിക്കുക. 3. . സ്പ്രേ യുടെ ധൂളികൾ ശരീരത്തിൽ പതിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. കാറ്റിന്റെ ദിശയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുക. 4. നോസിൽ വായ കൊണ്ട് ഊതരുത്. അടഞ്ഞ നോസിൽ കനം കുറഞ്ഞ കമ്പി കൊണ്ടോ ബ്രഷ് കൊണ്ടോ മാത്രം വൃത്തിയാക്കുക. 5. സ്പ്രേ ലായനി ശരീരത്തിൽ ആയാൽ ധാരാളം വെള്ളവും സോപ്പും ഉപയോഗിച്ച് ശരീര ഭാഗങ്ങൾ നന്നായി കഴുകുക. 6. കൈകളും ശരീരത്തിലെ സംരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളും നന്നായി കഴുകുക. ഉപയോഗ ശേഷം മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങൾ പ്രത്യേകം കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക.

മുൻകരുതൽ പ്രസ്താവന: 1. ലേബലിലും ലഘുലേഖകളിലും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നവയ്ക്ക് അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കരുത്. 2. ലഘുലേഖയിൽ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം കണ്ടെയ്നർ നശിപ്പിക്കുക. 3. ഉൽപന്നം തേനീച്ചകൾക്ക് വിഷാംശം ഉള്ളതിനാൽ തേനീച്ചകൾ സജീവമായി തേൻ തേടുന്ന സമയങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കരുത്. **4. ഉൽപ്പന്നം മത്സ്യത്തിനും ജലജീവികൾക്കും വളരെ വിഷാംശം ഉള്ളതിനാൽ, മത്സ്യകൃഷിക്ക് സമീപം അതിന്റെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കാം.**

ഉപയോഗിച്ച കണ്ടെയ്നർ , ഉപകരണം കഴുകി വരുന്ന വെള്ളം , അധിക പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യൽ: 1. പാരിസ്ഥിതിക, ജല മലിനീകരണം തടയുന്നതിനായി കഴുകി വരുന്ന വെള്ളവും മിച്ചമുള്ള വസ്തുക്കളും സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടത് കീടനാശിനിയുടെ നിർമ്മാതാവിന്റെയും ഫോർമുലേറ്റർമാരുടെയും ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെയും കടമയാണ്. 2. ഉപയോഗിച്ച പാക്കേജുകൾ അവയുടെ പുനരുപയോഗം തടയുന്നതിന് പുറത്ത് ഉപേക്ഷിക്കരുത്. 3. പാക്കേജ് തകർത്ത് ജനവാസമേഖലയിൽ നിന്ന് അകലെ കുഴിച്ചിടേണ്ടതാണ്.

രാസഘടന:

ഉള്ളടക്കം		% ഡബ്ല്യു/ഡബ്ല്യു
ഇൻഡോക്സാകാർബ് എ.ഐ	സജീവ ഘടകങ്ങൾ	14.50
സജീവമല്ലാത്ത ആന്റിഫോമർ	മറ്റു ഘടകങ്ങൾ	6.00
അമോർഫസ് സിലിക്കോൺ ഡയോക്സൈഡ്	മറ്റു ഘടകങ്ങൾ	7.00
പോളി എതോക്സിലേറ്റഡ് പോളിആരിൽ ഫിനോൾ	മറ്റു ഘടകങ്ങൾ	9.00
പോളി എതോക്സിലേറ്റഡ് പോളിആരിൽ ഫിനോൾ ഫോസ്ഫേറ്റ്	മറ്റു ഘടകങ്ങൾ	6.00
ഡിസ്റ്റിൽഡ് മീഥൈൽ സോയേറ്റ്	മറ്റു ഘടകങ്ങൾ	57.50
മൊത്തം:		100.00% ഡബ്ല്യു/ഡബ്ല്യു

നിർമ്മാണവും വിതരണവും: **ഗാർഡ കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ്**
രജി ഓഫീസ്: 48, ഹിൽ റോഡ്, ബാന്ദ്ര (വെ), മുംബൈ-400 050, ഇന്ത്യ.
ഫാക്ടറി: പ്ലോട്ട് നം. സി-4/1, എംഐഡിസി, ഖേർഡി, ടൗൺ: ഖേർഡി,
താലൂക്ക്: ചിപ്ലൂൺ, ജില്ല: രത്നഗിരി, സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര, പിൻകോഡ്: 415 604.

Malayalam