

Mahaveer GR[®]

Fipronil 0.3% G.R.
Insecticide

Read Leaflet Before Use.

Fipronil 0.3% GR is a granule insecticide containing Fipronil 0.3% active ingredient. It is recommended for control of Stem borer, Brown plant hopper, Green leaf hopper, Rice leaf folder, Rice Gall Midge, White backed plant hopper & Whorl maggot pests in rice and early shoot borer, root borer and termites pests in Sugar cane..

Recommendation for use :

Crops	Common Name of the Pest	Dosage/Hectare		Waiting Period between last application & harvest (in day)
		A.I	Formulation	
Rice	Stem borer	50-75	16.67-25.00	32 days
	Brown plant hopper			
	Green leaf hopper			
	Rice Leaf Folder			
	Rice Gall Midge			
	White backed Plant hopper			
Sugar-cane	Early shoot-borer	75-100	25.0-33.3	9 months
	Root borer			
	Termites	75	25.0	9 months

Method of application and Equipment for use :

Rice : Recommended dosage for granule should be broadcasted using hand operated granule applicator or mechanical dispenser. Standing water of 2-3 cm depth should be available in the field. Keep water impounded for 2-3 day after application.

Sugarcane : Recommended dose should be applied in the furrows at planting time or 40-45 days after planting along with the furrows.

Precautions : Do not eat, drink, smoke or chew pan or tobacco while handling this product. Wash exposed body parts thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking and smoking. Do not inhale. Avoid contact with skin and eyes. Do not mix with bare hands. Use protective clothing like gloves, goggles, long coat or apron and mask while handling. Destroy empty containers after use. Keep away from animal feed and foodstuff.

Symptoms Of Poisoning : Mainly consist of irritability, lethargy, muscle tremors and in extreme cases possibly convulsions may occur. Fipronil is a reversible GABA receptor inhibitor and these symptoms are reversible after termination of exposure.

First aid measures : If the insecticide is inhaled, get the victim into fresh air immediately. If breathing is stopped apply artificial respiration. If swallowed, induce vomiting by tickling back of the throat with finger. Flush the eyes with plenty of clean & cold water. Wash the skin with plenty of soap and water. Get medical attention.

Antidote : No specific antidote is known. Give symptomatic treatment.

Conditions to be specified for storage of insecticide :

- The package containing insecticides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticides.
- The rooms or premises meant for storing the insecticides shall be well built, dry, well-lit and well-ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with water vapour of insecticide

Disposal of used packages, surplus materials and washing of insecticide :

- It shall be the duty of manufacturers, formulators of insecticides and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.
- The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
- The packages shall be broken and buried away from habitation.

Chemical Composition :

Fipronil a.i.	0.3% w/w
Rhodamine dye	0.2% w/w
Binder (Sodium ligno sulphonate)	5.0% w/w
Carrier (Sand)	Q.S.
Total	100.0% w/w

Caution: Not to be used on crops other than those prescribed on label and leaflets. Destroy the container after use as directed on leaflet.

“ DANGEROUS TO RE USE EMPTY CONTAINER ”

महावीर जीआर

फिप्रोनिल ०.३% जी.आर.
(कीटनाशक)

इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

फिप्रोनिल ०.३% जीआर एक दानेदार कीटनाशक है जिसमें फिप्रोनिल ०.३% सक्रिय तत्व है। इसकी सिफारिश धान में लगाने वाले कीटों तथा छेदक, मूरा पीध फुदका, धरा पत्ती का तेला, धान का पत्ता मोड़क, धान गाल भिज, सफेद पीठ का पीध फुदका व मीग की नक्की और मन्ने में पुरे बना छेदक, जड़ छेदक और दीनक कीटों के नियंत्रण के लिए की गई है।

उपयोग के लिए सिफारिश :

फसल कीटों के सामान्य नाम	मात्रा/हेक्टेयर		आखिरी छिड़काव तथा फसल काटने के बीच में अंतर (दिनों में)
	रा.त.	सं.घन.	
धान	50-75	16.67-25	32 दिन
धान तना छेदक			
धारा पीध फुदका			
धरा पत्ती का तेला			
धान का पत्ता मोड़क			
धान गाल भिज			
सफेद पीठ का पीध फुदका			
मीग की नक्की			
मन्ना	75-100	25.0-33.3	9 महीने
पुरे बना छेदक			
जड़ छेदक			

प्रयोग की विधि और उपयोग के लिये सावधानी :

धान : सिफारिश की गई दानेदार की मात्रा को हाथों से चलाने वाले दानेदार ऐप्लीकेटर या यंत्रिक डिस्पेंसर से बिखेरना चाहिए। धान की फसल में इसका प्रयोग करते समय 2 से 3 सेंटीमीटर पानी खड़ा रहने दीजिए। उपयोग के बाद पानी को 2 से 3 दिन तक रहने दीजिये।

मन्ना : सिफारिश की गयी दानेदार की मात्रा मन्ने को बीजते समय नालियों (फ्यारियों) में डाले या बीजाई के 8-10 दिन के बाद नालियों (फ्यारियों) के साथ डालें।

सावधानियाँ : इस्तेमाल करते समय न तो खाएं-पीएं, न ही धूम्रपान करें तथा न ही पान या तम्बाकू आदि चबायें। इस्तेमाल के बाद और खाने-पीने या धूम्रपान के पहले शरीर के दूषित भागों को साबुन और पानी से अच्छी से धो लें। स्वसन द्वारा अन्दर न लें। त्वचा एवं आंखों को सम्यक से बचाएं। वस्त्र नो हाथों से न मिलाएं। उपयोग के समय शरीर की सुरक्षा करने वाले वस्त्र पहनिये जैसे हाथों के दस्ताने, चश्मा, पूरे शरीर को ढकने वाला लंबा कोट या एप्रेन और मास्क। उपयोग के बाद खाली डिब्बों को नष्ट करें। इसे प्यु आहार और खाद्य पदार्थों से दूर रखें।

विष बाधा के लक्षण : मुख्यतः चिड़चिड़ापन, उदासी, मांसपेशियों में ऐंठन। अत्यधिक प्रकोप की अवस्था में दौरे पड़ने की संभावनाएं हो सकती हैं। फिप्रोनिल गावा रिसेप्टर अवरोधक है एवं कीटनाशक से सम्बंध हटाते ही उपरोक्त लक्षण समाप्त हो जाते हैं और प्रभावित व्यक्ति पूर्ववस्था में आ जाता है।

प्राथमिक चिकित्सा : यदि कीटनाशक सांस द्वारा अंदर गयी हो तो मरीज को तुरंत खुली हवा में ले जाएं। श्वास रुकने लगे तो कृत्रिम श्वासोच्छ्वास अमल में लाएं। कीटनाशक निगले जाने पर रोगी के गले के पिछले हिस्से में चंगली डालकर उल्टी करवाएं। आंखों को भरपूर एवं ठंडे पानी से धो लें। त्वचा को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें। चिकित्सक से सलाह लें।

विषोपचार : इसकी कोई विशिष्ट दवा नहीं है। लक्षणानुसार उपचार कीजिए।

कीटनाशक के संग्रह हेतु निर्धारित शर्तें :

- कीटनाशक रखे हुए डिब्बों/पैकेजस को अलग कमरों या जगहों में उन कमरों या जिममें अन्य वस्तुएं रखी जाती हैं, उनसे दूर रखना चाहिए या सलग अलमारियों में राला-बाथी लगाकर कीटनाशक की प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखें।
- जिस कमरें या अलमारी में कीटनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूजा, प्रकाशमय, हवादार तथा पर्याप्त आकार का होना चाहिए जिससे कीटनाशक के माप से वातावरण प्रदूषित होने का खतरा न रहे।

उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेजस, बचे हुए कीटनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटारा :

- यह कीटनाशक निमतों तथा उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि डिब्बों/पैकेजस या बची हुई कीटनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करें जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो।
- उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेजस को बाहर न फेंके जिससे उनका दुबारा प्रयोग न हो।
- उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेजस को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें।

सामयिक संरचना :

फिप्रोनिल सक्रिय तत्व	०.३% भार/भार
रोडामाईन डाय	०.२% भार/भार
बाइन्डर (सोडियम लिग्नो सल्फोनेट)	५.०% भार/भार
कैरियर (रेत)	मात्रानुसार
योग	१००.०% भार/भार

चेतावनी: इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। पत्रक पर दिए निर्देश अनुसार उपयोग के बाद खाली डिब्बों को नष्ट करें।

“ खाली कंटेनर का दोबारा उपयोग करना खतरनाक है। ”

महावीर छुआर

डिप्रोनिल ०.३% छु.आर.
(जंतुनाशक)

उपयोग पढेवा संलग्न पत्रिका अचुक भान्ये.

डिप्रोनिल ०.३% छुआर अंक दाखादार जंतुनाशक छे जेभो डिप्रोनिल ०.३% सक्रिय तत्व छे. ते अंगरना परत तृष छेडक (विधिवा), मूरा सफेद छेडक, बीवा पॉडगना कीटको, अंगरना पॉडगना कीटा, अंगरना गेठीक बीज, सफेद पीठ बाधा छोडना छेडक अर, अंगरना जेवा भवती सफेद छेडक अरु शेरीधीमां थड भुसिया, मूग भुसिया तेषज छेडक जेवी छवामां नाश करवा माटे सुभवचामां आवे छे.

उपयोग माटे बलामधरा:

माक कीटकोनु सामान्य नाम	प्रमाण/हेक्टेयर	छेडवा छेडकवा अने माक छेडवा वस्त्रो अरुत (दिनसमा)
नाम	रा.त.	अंशघन
अंगर तृष छेडक	50-75	16.67-25
मूरा सफेद छेडक		
बीवा पॉडगना कीटको		
अंगरना पॉडगना कीटा		
अंगरना गेठीक बीज		
सफेद पीठ बाधा छोडना छेडक		
अंगरना जेवा		
शेरीधी भवती सफेद छेडक	75-100	25.0-33.3
थड भुसिया मूग भुसिया	75	25.0
		9 महीना
		9 महीना

उपयोगीनी रीत अने उपयोग माटे जइरी सामग्री:

अंगर: सुभवचामां आवेलां दाखादार जंतुनाशकना जथ्यापो दाथयी वावता दाखादार अट्रिकेटर अथवा यांत्रिक डिस्पेंसरवी छेडकाव करवो जेठोअ. अंगरना पाकमां तेनी उपयोग करती वभते 2 थो 3 से-मी.मीटर पाछी लदेवु छेडु जेठोअ. उपयोग पछी पाछी 2 थो 3 दिनस सुधी रहेवा हेतु जेठोअ.

शेरीधी: सुभवचामां आवेला दाखादार जंतुनाशकना जथ्याने शेरीधी वावती वभते क्षयारमां नामो अथवा वावेतरना 20-25 दिनस पछी क्षयारमां नामो.

सावयेनी: उपयोग करती वभते कोठिण वस्तु पावती के पीवी नही तेमज धूम्रपान करवु नही अथवा पाछी के तमाकुनु सेवन करवु नही. उपयोग क्यो पछी अने कोठिण वस्तु पावती-पीती वभते अथवा धूम्रपान करवा पकेला शरीरना दूषित भागोने साधु अने पाछीवी भुषु सारी रीते साक करो. थयारमां अंदर न जाय तनु ध्यान राखवु. त्वया अने आंभोना संपर्कमां न आवे तनु ध्यान राखवु. भुसिया छोपे उपयोग न करवो. उपयोग करती वभते दाथया मांजा, रथया अने आभु शरीर डंकाठ जाय तवा डोट, अंगन अने माक स्रित शरीरनी सुरक्षा माय तवा वस्त्रो फेडेरवा. उपयोग क्यो पछी पावती क्षयोना नाश करवो. तेने पशुधामना आहार अने भाव्य पदार्थोवी डूर राखो.

जेरी अखरना बलामधरा: भुषुत्वले व्यक्तिये लयनता अने मांसपेशीआंभो भयंसा आवे छे तेमज वधु अखर थठ जाय तो आंखी आवे छे. डिप्रोनिल गावा रिसेप्टर अवरोधक छे अने जंतुनाशकवी संपर्क हटावना ज आ बलामधरा समाप्त थठ जाय अने अखरवस्त व्यक्तिये डरी पूर्ववस्थांमां आवी थके छे.

प्राथमिक सारवार: जो जंतुनाशक थयारमां अंदर जाय तो दर्दने तुरंत भुडवी छवामां लठ जाय. थयार रोकवा लागे तो दूजिय थयारोच्छ्वास अमचवामां वावा. जंतुनाशक गथी गथा दोथ तवा दर्दने गथानी नीबना भागमां आंभोनी नामोने छेडवी करवती. आंभोने विषुप प्रयाशमां डंका पाछीवी साक करवी. त्वयाने साधु अने पाछीवी सारी रीते साक करवी. डॉक्टरनी सलाह लठने आगम्य वसवु.

विष-नाशक: कोठि विशेष दवा नथी. लक्षज अ-मूरादे छेडकाव करवो.

जंतुनाशकना संकेत संकेपित शरतः

- जंतुनाशक राफती वभते उष्मा/पेकेजने अलग अलग रुममां अथवा जथ्यामे ज्यो अन्य कोठि वस्तु राखवामां आवती छेड त्यों दूर राखो अथवा तेने क्षयाठमां लागु छवानीने अलग राखो. जंतुनाशकना प्रमाण अने तेना प्रकारना आधारे संकेत करवो.
- जे रुम अथवा क्षयाठमां जंतुनाशकनी संकेत करवामां आथो छेड त्यों जथ्या सारी रीते बनावेवी, सुडी, पुरत प्रक्षाल वाणी, छवानी अवरक्षकर वाणी अने पुरती जथ्या वाणी छोवी जेठोअे जेथी जंतुनाशकनी भाथ्यवी वाववरक्ष कृतित धयानु जेठोअ न रहे.

उपयोगमां बीधेवा उष्मा/पेकेज, वधेवा जंतुनाशकोना निकाल अने उपयोगमां बीधेवा साधनो धोवा:

- जंतुनाशक उपयाठक अथवा वपराशकानीने इरज छे के उष्मा पेकेज अथवा वधेवा जंतुनाशकना निकाल करवो अने तेना उपयोग माटेना साधनो अरुअर साक करीने तेने सुरक्षित रीते राखवा जेथो वातावरण अथवा पाछी प्रदूषित न थय.
- उपयोगमां बीधेवा उष्मा/पेकेजने अरुअर न डेंको जेथी तेनी डरी उपयोग टापी शकय.
- उपयोगमां बीधेवा उष्मा/पेकेजने तोरीने वसतीवी दूर जमीनमां छोटी देवा.

संसाधनिक भंथारथः

डिप्रोनिल सक्रिय तत्व	०.३% ज/ज
रोडामाईन डाय	०.२% ज/ज
बाइन्डर (सोडियम लिग्नो सल्फोनेट)	५.०% ज/ज
कैरियर (रेती)	प्रमाणसार
कुल	१००.०% ज/ज

सावधानी: लेबल अने पत्रिकाओ पर सुभवचामां आवेला विवायना पाको पर उपयोग न करवो. पत्रिका परना निर्देश भुषुप उपयोग क्यो पछी कंटेनरनी नोश करो.

“ खाली उष्मा छेडवी छेडवावु अतरनाक छे. ”

DIRECTION FOR USE

FOR AGRICULTURAL USE

कृषि उपयोग के लिए

Read Leaflet Before Use

इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

Mahaveer GR[®]

Fipronil 0.3% G.R.

(Insecticide)



महावीर जी आर

फिप्रोनिल ०.३ प्रतिशत जी आर

(कीटनाशक)



Marketed by: GHARDA CHEMICALS LTD.

Regd. Office: Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai-400050, INDIA.

Manufactured by: Saraswati Agro Chemicals

(India) Pvt. Ltd. Regd. Office: Village Dao Majra, Khara Kurail Road, Distt. S.A.S. Nagar (Mohali), Punjab - 140301, Factory: Lane-2, Phase-1, SIDCO Industrial Complex, Bari Brahmna, Distt. Jammu (J&K)

विपणनकर्ता : **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**, पंजी. कार्यालय: घरडा हाउस, ४८, हिल रोड, बान्द्रा (प.), मुंबई - ४०००५०, भारत.

निर्माता: **सरस्वती एग्रो केमिकल्स (इंडिया) प्रा. लि.** रजि. ऑफिस : गाँव दाव माजरा, खरड कुरली रोड, जिला एस.ए.एस. नगर (मोहाली), पंजाब - १४०३०१. फैक्ट्री: लेन-२, फेसा-१, सिडको इण्डस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, बारी ब्राम्हना, जिला जम्मू (जे एण्ड के)

For any complaints, contact Customer Care Executive at Gharda Chemicals Limited, Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400050. INDIA
Tel.: 022 66265998 / 66265999
Email: consumercare@gharda.com
Website: www.gharda.com

® - Registered Trademark of Gharda Chemicals Limited.



