ENGLISH | HINDI | MARATHI | GUJARATI | PUNJABI

OMG™

CHLORANTRANILIPROLE 18.5% W/W SC
(INSECTICIDE)

Read Leaflet Before Use.

Chlorantraniliprole 18.5% w/w SC (20% w/v) is an Anthranilic diamide insecticide. It is a broad spectrum insecticide and is recommended for controlling following pests of Rice, Cabbage, Cotton, Sugarcane, Tomato, Chilli, Soybean, Brinjal, Pigeonpea (Redgram), Bengal gram, Black gram, Bitter gourd, Okra, Maize and Groundnut.

Recommendation:

Shake well before use

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in water (Liters)	Waiting Period between last spray to harvest (in Days)	Re-entry after each Application (in Hours)
		Al (grams)	Formulation (ml)			
Bengal gram	Pin borer (Sporoptera exigua & Helicoverpa)	25	125	500	11	-
Bitter gourd	Fruit borers & Caterpillars (Leptinotarsa & Harrisonia)	20-25	100-125	500	7	-
Black Gram	Pod Borer (Maruca spp. & Adults)	20	100	500	20	-
Brinjal	Fruit and shoot borer (Leucinodes orbonalis)	40	200	500-750	3	-
Cabbage	Diamond Back Moth (Plutella & Adults)	10	50	500	3	-
Chilli	Fruit borer (Helicoverpa armigera, Spodoptera litura, Scoporpha exigua)	30	150	500	3	-
Cotton	American bollworm (=yellow pea armigera) Spotted bollworm (Earias = Nilo) Tobacco caterpillar (Spodoptera lit.)	30	150	500	9	-
Groundnut	Tobacco caterpillar	30	150	500	28	-
Maize	Spotted stem borer; Pink stem borer	30	150	500	10	-
Okra	Fruit borer (=pigeon arm; Earias = Nilo)	25	125	500	5	-
Pigeon pea	Grain pod borer (Helicoverpa armigera) Pod fly (Helicoverpa obtusa)	30	150	500-750	29	-
Rice	Stem borer (Scirpophaga incertulas) Leaf Folder (Cnaphalocrocis medinalis)	30	150	500	47	-
Soybean	Green semilopers (Chrysodeixis acuta) Weevil (Aulo Brachi)	30	150	500-750	22	-
Sugarcane	Top borer (Chilo sacchariphagus indicus)	100-125	500-625	1000	208	-
	Top borer (Scirophaga excerptalis)	75	375	1000	208	-
	Early shoot borer (Chilo infuscatellus)	75	375	1000	208	-
Tomato	Fruit borer (Helicoverpa armigera)	30	150	500	3	-

Note: -

Good Practices relating to pesticide application techniques

Direction of Use: Avoid application during adverse weather conditions. 1. Sugarcane: Sett Dressing / Soil Drenching in Sugarcane crop for control of termites, early shoot borer and Top borer at the time of planting. Application can also be done as soil drench at the base of sugarcane seedlings prior to first/second irrigation for borer management. For the management of later broods of top borer (3rd to 5th) application can be done as soil drench in the month of June. 2. Crops other than sugarcane: Use as foliar spray at ETL of the pest population preferably during vegetative/ at onset of flowering stage.

Weather Condition (in general): Avoid application during adverse weather conditions.

Soil & Water (where ever applicable): Light to heavy soil and clean water.

Crop Stage for application:-

Application Technique: Please see direction of use.

Equipment Type: Knapsack sprayer (Manual/Battery operated)/Foot sprayer

Nozzle Type: Hollow cone nozzle

Dosage: -

Instruction for Mixing: Take the measured quantity of Chlorantraniliprole 18.5% SC, add to it small quantity of water, mix thoroughly and then add the remaining quantity of water while stirring vigorously.

Re-entry Period: 24 hours

Manner and Time of Application:-

Application Timing: Please see direction of use.

Frequency: -

Stages during which pesticides should not be applied on any crop: -

Precautions to be taken to avoid harm to the beneficial insects like honey bees and natural enemies of pests: -

Symptoms Of Poisoning: Mild eye irritant with blurred vision. Vapor inhalation may result in nasal secretions.

First Aid: 1. Ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting unless and unless desired by attending physician. **2. Inhaled:** Take the person to fresh air and take care of body temperature. If person is not breathing or breathing with difficulty, administer artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. **3.** In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. **4.** In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, redness or photophobia persists, consult eye specialist.

Antidote: No specific antidote, symptomatic and supportive therapy.

Phytotoxity: -

Storage Conditions: 1. The packages containing the insecticide shall be stored in original container in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles, away from the reach of children and livestock, animal feed or shall be kept in a separate almirah under lock and key. **2.** The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapor.

Safety Precautions: 1. Do not eat, drink, smoke or chew betel leaves while applying the product. **2.** Wear long sleeves shirt, long pants, chemical resistant gloves, mask, goggles and covered shoes while handling the product. **3.** Avoid spray drift onto the spraying person by spraying with the direction of the wind. **4.** Do not blow the spray nozzle with mouth, clean the blocked nozzle with a thin stem or brush. **5.** In case of any spillage on the body, wash exposed parts with soap and plenty of water. **6.** Wash hands and uncovered parts of the body properly after handling and before eating, drinking or smoking. Remove and wash contaminated clothing separately after use.

Cautionary Statement: 1. Not to be used for any purpose other than specified on label/leaflet. **2.** Destroy the container after use as directed on the leaflet. **3.** This product is toxic to aquaforms. Do not allow drift to nearby Mulberry plantations and silk worm culture facilities. Do not rotate mulberry plantations after crops where chlorantraniliprole based formulation was commonly used in foliar sprays/applications.

Disposal of used containers, washing from equipment and surplus material: 1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of insecticides and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. **2.** The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. **3.** The packages shall be broken and buried away from habitation.

Chemical Composition:

1) Chlorantraniliprole (a.i.)	18.50 % w/w
2) Methyl methacrylate ethoxylated graft copolymer	3.00 % w/w
3) Ethylenoxidedipropylenoxide block copolymer and ethoxylated alcohol	2.00 % w/w
4) Attapulgite clay	1.00 % w/w
5) Xanthan gum	0.25 % w/w
6) 1,2-benzisothiazolin-3-one	0.10 % w/w
7) Silicone emulsion	0.50 % w/w
8) Propylene glycol	6.00 % w/w
9) Water	QS % w/w
Total	**100.00% w/w**

" DANGEROUS TO RE USE EMPTY CONTAINER "

Manufactured & Marketed by: **GHARDA CHEMICALS LIMITED**
Regd. Office: 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400 050.
Factory: Plot No.C-4/1, Kheroli M.I.D.C., Village: Kheroli, Taluka: Chiplun, District: Ratnagiri, State: Maharashtra. Pincode-415604.

ओएमजी

क्लोरेन्ट्रानिलिप्रोल 18.5% भा/भा एससी
(कीटनाशक)

इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़े ।

क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल 18.5% भा/भा एससी (20% w/v) नया सैन्थ्रेटिक डायआइड कीटनाशक है। यह एक व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशक है और चावल, कपास, गन्ना, टमाटर, मिर्च, सोयाबीन, बैंगन, तूर, चना, उड़द, करेला, भिंडी, मक्का और मूँगफली की फसलों पर सिफारिश की जाती है।

सिफारिश:

उपयोग करने से पहले भलीभांति अच्छी तरह से हिलाएँ

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा कटाई करने के बीच अन्तराल (दिनों में)	पुन: खेत में जाने करने के लिए छिड़काव के बाद (घंटे)
		ए. आई (ग्राम)	सूत्रण (मि.ली.)			
चना	फली बेधक (फ्रैंकलिनी या स्पोडोप्टेरा अरिगिया)	२५	१२५	५००	११	-
करेला	फल छेदक (हेलिकोवा, स्पोडोप्टेरा लिटा, स्कोपोरपा एक्सिगुआ)	२०-२५	१००-१२५	५००	७	-
उड़द	फली छेदक (मारुका स्पा. & वयस्क)	२०	१००	५००	२०	-
बैंगन	फल एवं शीर्ष छेदक (लयूकोनोडेस ऑर्बोनालिस)	४०	२००	५०० - ७५०	३	-
गोभी	हीरा पतंगा (प्लूटेला जाइलोस्टेला)	३०	१५०	५००	३	-
टमाटर	फल छेदक (हेलिकोवा आर्मिजेरा, स्पोडोप्टेरा लिटा, स्कोपोरपा एक्सिगुआ)	३०	१५०	५००	३	-
मूँगफली	तम्बाकू इल्ली	३०	१५०	५००	२८	-
मक्का	तनाछेदक तना बेधक, गुलाबी तना बेधक	३०	१५०	५००	१०	-
भिण्डी	फल छेदक (हेलिकोवा आर्मिजेरा, स्पोडोप्टेरा लिटा)	२५	१२५	५००	५	-
अरहर	फली छाती छेदक (हेलिकोवा आर्मिजेरा) फली मक्खी (मारुका ऑब्टूसा)	३०	१५०	५०० - ७५०	२९	-
धान	तना छेदक (स्किरपोफागा इनसर्टुलास) पत्ती लपेटक (क्नेफालोक्रोसिस मेडिनालिस)	३०	१५०	५००	४७	-
सोयाबीन	हरी इल्ली (क्रुसोडेक्सिस एकुटा) वीविल (ऑलो ब्रेची)	३०	१५०	५०० - ७५०	२२	-
गन्ना	टॉप बोरर (चिलो सैकेरिफेगस इण्डिकस)	१००-१२५	५००-६२५	१०००	२०८	-
	टॉप बोरर (स्किरोफागा एक्सेरप्टेलिस)	७५	३७५	१०००	२०८	-
	अर्ली शूट बोरर	७५	३७५	१०००	२०८	-
टमाटर	फल छेदक (हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा)	३०	१५०	५००	३	-

कीटनाशक अनुप्रयोग तकनीकों से संबंधित अच्छे अभ्यास

उपयोग के लिए निर्देश: तेज़ मौसम की प्रतिकूल स्थिति में छिड़काव करने से बचें। 1. गन्ना: दीमक के रक्षक दीमक, आरंभ तना छेदक और शीर्ष छेदक के नियंत्रण के लिए रोपने की बुवाई में सेट ड्रेसिंग/मिट्टी ड्रेंचिंग करें। बोर की संतान के छेद तना दूसरी/पहली सिंचाई से पहले गन्ना के पौधों की जड़ों में मिट्टी ड्रेंचिंग के तौर पर भी बोर के प्रबंधन के लिए लागू किया जा सकता है। शीर्ष छेदक के बाद के ब्रूड (3 से 5) के नियंत्रण के लिए, जून के महीने में मिट्टी ड्रेंचिंग के तौर पर लागू किया जा सकता है। 2. गन्ने के अलावा अन्य फसलें: कीटों की क्षति-स्तर (ETL) के अनुसार और पसंदीदा वनस्पति अवस्था/फूलों के शुरुआत में पत्ती छिड़काव के रूप में लागू करें।

मौसम की स्थिति (सामान्यतः): प्रतिकूल मौसम में छिड़काव न करें।

मिट्टी व पानी (जिस जगह भी लागू हो): हल्की से भारी मिट्टी व स्वच्छ पानी।

छिड़काव की फसल की अवस्था:-

छिड़काव तकनीक: कृपया मार्गदर्शित निर्देश देखें।

उपकरण प्रकार: मानवचालित स्प्रेयर (नैप्सैक/बैटरी संचालित) / फुट स्प्रेयर

नोजल प्रकार: खोखला शंकुआकार

घुलाना:-

मिश्रण के लिए निर्देश: क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल 18.5% एससी की मापी गयी मात्रा ले, इसमें थोड़ा जल में मिला मिश्रण तैयार करें फिर अच्छी तरह हिलाएँ और फिर लगातार हिलाते हुए बाकी के जल में मिलाएँ।

पुनःप्रवेश अवधि: 24 घंटे

छिड़काव का समय और समय:-

छिड़काव का समय: कृपया उपयोग के निर्देश देखें।

आवृत्ति के अधिक अंतर अवधि आवृत्ति:-

फसल जिसमें कीटनाशक किसी भी फसल पर कीटनाशकों नहीं लगाया जाना चाहिए:-

लाभ की परिस्थिति और कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लाभकारी कीड़ों से नुकसान से बचने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए लाभकारियों:-

विष के लक्षण हल्की दृष्टि धुंधली जलन के साथ हल्की चिड़चिड़ा। वाष्प साँस में लेने पर नाक से स्राव हो सकता है।

प्राथमिक उपचार:-

प्राथमिक उपचार: 1. जिस व्यक्ति का होश और आँखें खुली हैं, उसे कुल्ला करने के लिए 1 या 2 गिलास पानी पिलाएँ। कभी भी बेहोश व्यक्ति को मुँह से कुछ भी न दें। डॉक्टर को बुलाएँ। डॉक्टर के कहे बिना उल्टी न कराएँ। 2. साँस से: व्यक्ति को ताजी हवा में लेकर शरीर का तापमान बनाए रखें। यदि व्यक्ति साँस न ले रहा हो या साँस लेने में कठिनाई हो, तो मुँह से कृत्रिम श्वास दें। डॉक्टर की सलाह लें। 3. त्वचा से संपर्क होने पर: क्षतिग्रस्त त्वचा को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएँ। बाल और नाखूनों के नीचे की त्वचा को भी अच्छी तरह धोएँ। यदि दर्द, लालिमा या चुभन बनी रहे, तो डॉक्टर की सलाह लें। सारे दूषित कपड़े अलग-अलग करके साबुन और पानी से धोएँ। 4. आँख में संपर्क होने पर: कम से कम 15 मिनट तक धीमी गति से पानी से धोएँ यदि दर्द, लालिमा, चुभन या फोटोफोबिया बनी रहे, तो नेत्रों के डॉक्टर की सलाह लें।

विष पहचान कोई विशिष्ट विषहर उपचार नहीं है, रोगसिक लक्षण कोई सहायक चिकित्सा करें।

फिटोटॉक्सी की जाँच:-

भण्डारण की शर्तें: कीटनाशक युक्त पैकेज को मूल कंटेनर में अलग कमरे में या स्टोरेज में अन्य वस्तुएँ रखे जाने वाले कमरे या स्टोरेज से दूर, बच्चों और पशुओं की पहुँच से दूर, चारा और खाद्य से अलग रखें या ताले और चाबी लगाकर रखना चाहिये। 2. कीटनाशक के स्टोरेज के लिए बनी कमरे या स्टोरेज अच्छी तरह निर्मित, प्रकाश, हवादार और पर्याप्त आयाम वाला हो ताकि वाष्प से संपर्क से बचाव के लिए पर्याप्त आकार वाले होना चाहिए।

सुरक्षा के लिए सावधानियाँ: 1. लेबल का उपयोग करते समय न कुछ खाएँ, न पिएँ, न धूम्रपान करें या पान चबाएँ। 2. लंबाई वाला शर्ट, लंबी पैंट, रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताने, मास्क, चश्मा और ढके हुए जूते पहनें। 3. हवा की दिशा के साथ छिड़काव करना ताकि छिड़काव करने वाले व्यक्ति पर फिर से वापस न आये। 4. नोजल को मुँह से न फूँकें। अवरुद्ध नोजल को पतली लकड़ी या ब्रश से साफ करें। 5. त्वचा पर किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार का रिसाव होने पर, त्वचा के उजागर भाग को साबुन और पानी से धोएँ। 6. खाने, पीने, धूम्रपान करने से पहले और बाद में हाथ और उजागर त्वचा को अच्छी तरह से धोएँ। दूषित कपड़ों को अलग से धोएँ।

सावधानीपूर्ण विवरण: 1. लेबल / पुस्तिका पर दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा अन्य किसी प्रयोजन से प्रयोग न किया जाए। 2. सूचनानुसार कंटेनर के टुकड़े-टुकड़े कर नष्ट किया जाए। 3. यह जलजन्तु के लिए विषैला है। शहतूत के बागानों और रेशम कीट संवर्धन सुविधाओं पर छिड़काव न करें। इस क्षेत्र या खेत में फसलों के उपरांत जहाँ पर प्रायः क्लोरेंट्रानिलिप्रोल आधारित फॉर्मूलेशन का प्रयोग किया गया हो शहतूत के बागानों को न घुमाएँ।

इस्तेमाल किए गए कंटेनरों, धुलाई से अतिरिक्त सामग्री का निपटान: 1. कीटनाशक निर्माता तथा उपयोगकर्ता को कंटेनर का नष्ट करने की जिम्मेदारी है। 2. खाली कंटेनर को पुनः उपयोग रोकने के लिए पैकेजों को खुला न छोड़ें। 3. पैकेजों को बाड़ा से दूर दफनाएँ।

रासायनिक संघटन:

1) क्लोरेन्ट्रानिलिप्रोल (ए.आई.)	१८.५० % भा/भा
2) मेथाइल मेथाक्रायलेट इथोक्सीलेटेड ग्राफ्ट कोपोलिमर	३.०० % भा/भा
3) इथाइलीन ऑक्साइड/प्रोपाइलीन ऑक्साइड ब्लॉक कोपोलिमर और इथोक्सीलेटेड अल्कोहल	२.०० % भा/भा
4) अटापुलगाइट क्ले	१.०० % भा/भा
5) जेन्थन गम	०.२५ % भा/भा
6) 1,2-बेन्जीसोथियाज़ोलिन-3-एन	०.१० % भा/भा
7) सिलिकॉन इमल्शन	०.५० % भा/भा
8) प्रोपाइलीन ग्लाइकोल	६.०० % भा/भा
9) जल	क्यूएस मात्रा % भा/भा
कुल	**१००.००% भा/भा**

" खाली कंटेनर का दोबारा उपयोग करना खतरनाक है। "

निर्माता एवं विक्रेता: **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**
पंजी. कार्यालय: ४८ हिल रोड, बांद्रा (प.), मुंबई - ४०० ०५०.
फैक्टरी प्लॉट नं. सी-४/१, खेरोली एम.आई.डी.सी., गाव : खेरोली, तालुका : चिपलून, जिला : रत्नागिरी, राज्य : महाराष्ट्र, पिनकोड : ४१५६०४.

ओएमजी

क्लोरेन्ट्रानिलिप्रोल १८.५% भा/भा एस सी
(कीटनाशक)

वापरण्यापूर्वी माहिती पत्रक वाचा.

क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल १८.५% भा/भा एससी (२०% w/v) एक डैंथ्रेनिलिक डायमाइड कीटनाशक आहे. हे व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशक है और चावल, कपास, गन्ना, टमाटर, मिर्च, सोयाबीन, बैंगन, तूर, चना, उड़द, करेला, भिंडी, मक्का और मूँगफली की फसलों पर सिफारिश की जाती है।

शिफारस:

वापरण्यापूर्वी चांगले हलवा

पीक	कीटाचे सामान्य नाव	फवारणी मात्रा		पाण्यातील मात्रा (लिटर)	पीकाची फवारणी आणि तिच्या काढणीचे दरम्यानचा कालावधी (दिवसांत)	प्रत्येक फवारणीनंतर पुन: प्रवेशाचा कालावधी (तास)
		ए. आई (ग्राम)	फॉर्मुलेशन (मि.ली.)			
चना	पिंक बोरर (स्पोडोप्टेरा एक्सिगुआ आणि हेलिकोवर्पा)	२५	१२५	५००	११	-
कारले	फळ छेदक (हेलिकोवा, स्पोडोप्टेरा लिटा, स्कोपोरपा एक्सिगुआ)	२०-२५	१००-१२५	५००	७	-
उड़द	फली छेदक (मारुका स्पा. & वयस्क)	२०	१००	५००	२०	-
वांगे	फळ आणि शेंडा छेदक (लयूकोनोडेस ऑर्बोनालिस)	४०	२००	५०० - ७५०	३	-
कोबी	हीरा पतंग (प्लूटेला जाइलोस्टेला)	३०	१५०	५००	३	-
टोमॅटो	फळ छेदक (हेलिकोवा आर्मिजेरा, स्पोडोप्टेरा लिटा, स्कोपोरपा एक्सिगुआ)	३०	१५०	५००	३	-
भुईमूग	तंबाखू इल्ली (स्पोडोप्टेरा लिटा)	३०	१५०	५००	२८	-
मका	तनाछेदक तना बेधक, गुलाबी तना बेधक	३०	१५०	५००	१०	-
भेंडी	फळ छेदक (=पिजन आर्म; इरेसिया = निलो)	२५	१२५	५००	५	-
तूर	शेंग छेदक (हेलिकोवा आर्मिजेरा) शेंग माशी (मारुका ऑब्टूसा)	३०	१५०	५०० - ७५०	२९	-
भात	तना छेदक (स्किरपोफागा इनसर्टुलास) पान गुंडाळक (क्नेफालोक्रोसिस मेडिनालिस)	३०	१५०	५००	४७	-
सोयाबीन	हरी इल्ली (क्रुसोडेक्सिस एकुटा) वीविल (ऑलो ब्रेची)	३०	१५०	५०० - ७५०	२२	-
ऊस	टॉप बोरर (चिलो सैकेरिफेगस इण्डिकस)	१००-१२५	५००-६२५	१०००	२०८	-
	टॉप बोरर (स्किरोफागा एक्सेरप्टेलिस)	७५	३७५	१०००	२०८	-
	अर्ली शूट बोरर (चिलो इन्फुस्कॅटेलस)	७५	३७५	१०००	२०८	-
टोमॅटो	फळ छेदक (हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा)	३०	१५०	५००	३	-

नोट:-

कीटकनाशक फवारा तंत्रांशी संबंधित चांगल्या पद्धती

फवारणीची दिशा: प्रतिकूल हवामानात फवारा टाळा। 1. ऊसाची लागवड: उसाच किंवा आणि लोक बोरर कीटकांच्या नियंत्रणासाठी लागवडीवर उसाच्या पिकामध्ये सेट ड्रेसिंग / मातीचे ड्रेंचिंग. लवकर अंकुर बोरर आणि शीर्ष बोरर लागवडीच्या वेळी. ऊसाच्या रोपांच्या पायथ्याजवळ मातीचे ड्रेंचिंग म्हणून देखील लागू केले जाऊ शकते. बोरर व्यवस्थापनासाठी पहिल्या/दुसऱ्या सिंचनापूर्वी ऊसाच्या बियाणे. 2. ऊसाव्यतिरिक्त पिके: कीटकांच्या इष्टतम आर्थिक थ्रेशोल्ड (ETL) वर पानांच्या फवारणी म्हणून वापरा. प्राधान्याने वनस्पतिजन्य अवस्था/फुलांच्या सुरुवातीच्या वेळी.

हवामान (सामान्यतः): प्रतिकूल हवामानात फवारणी टाळा.

माती व पाणी (जिथे लागू असेल तेथे): हलकी ते जड माती व स्वच्छ पाणी.

फवारणी पिकाचा टप्पा:-

फवारणीचे तंत्र: कृपया मार्गदर्शित निर्देश पहा.

फवारणीचे प्रकार: नॅपसॅक फवारणी (मॅन्युअल/बॅटरी चालित)/ फूट स्प्रेयर

नोजलचा प्रकार: पोकळ शंकू

घुलाना:-

मिश्रण करण्यासाठी सूचना: क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल १८.५% एससी ची मापलेली रक्कम घेऊन त्यात थोडया प्रमाणात पाणी घालावे, चांगले मिसळावे व नंतर सतत ढवळत राहून उरलेले संपूर्ण पाणी घालावे.

पुन: प्रवेश कालावधी: २४ तास

फवारणी करण्याची पद्धत व वेळ:-

फवारणी करण्याची वेळ: कृपया वापरासंबंधी निर्देश पाहा.

वारंवारता:-

कोणत्याही पिकावर कीटकनाशके लागू नयेत अशी वेळ:-

फायदेशीर कीटकांच्या उदाहरणे मधमाशी व निसर्गातील शत्रू यांचे नुकसान टाळण्यासाठी घ्यावयाची काळजी:-

विषबाधेची लक्षणे: सौम्य डोळ्यांची जळजळ व अंधुक दिसणे. वाष्प श्वसन घेतल्यास नाकातून स्राव होऊ शकतो.

प्राथमिक उपचार:-

प्राथमिक उपचार: 1. जिथे व्यक्ति जागा व सतर्क आहे, तोंड स्वच्छ पाण्याने धुवावे व व्यक्तिला 1 ग्लास पाणी पाजावा. कधीही बेशुद्ध व्यक्तिला तोंडाने काही देऊ नये. डॉक्टरांना बोलावा. उपचारांच्या सल्ल्याशिवाय उलटी करवू नये. 2. श्वसनाद्वारे: व्यक्तिला ताजी हवा आणा व शरीराचे तापमान राखा. व्यक्ति श्वास घेत नसेल किंवा श्वास घेताना त्रास होत असेल तर कृत्रिम श्वसन द्या, प्राधान्याने तोंडाने श्वास द्या. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. 3. त्वचेशी संपर्क होऊन त्वचेवर प्रभाव पडल्यास: प्रभावित भागाला साबणाने व पाण्याने चांगले धुवावे. केस आणि नखांच्या खाली देखील धुवावे. वेदना, लालसरपणा किंवा चिडचिड कायम राहिल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. सर्व दूषित कपडे वेगळे करून वापरण्यापूर्वी साबण आणि स्वतंत्रपणे स्वतंत्र धुवावे. 4. डोळ्यांशी संपर्क झाल्यास: डोळ्यात अडचणीच्या ठिकाणी पाण्याने हळुवार धुवावे. वेदना, लालसरपणा किंवा फोटोफोबिया कायम राहिल्यास, नेत्रतज्ज्ञ सल्ला घ्यावा. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

उतारा: कोणतेही विशिष्ट उतारा नाही, लक्षणात्मक आणि पाठिंबा देणारे उपचार करावे.

वनस्पतीविषारी:-

साठवणुकीची अटी:- 1. कीटकनाशक असलेली पिशवी मूळ कंटेनरमध्ये इतर वस्तू ठेवण्याची जागा / स्टोरेज जागेपासून दूर, मुले आणि पशुधन, पशुखाद्य किंवा इतर वस्तू ठेवण्याच्या जागेपासून दूर स्वतंत्र कोठीत किंवा आवरात तेथेही लहान मुलांच्या आवाक्याबाहेर कुलूप लावलेली कपाटात ठेवावी. 2. कीटकनाशक साठवणुकीच्या खोल्या योग्य बांधलेल्या, कोरडे, चांगले प्रकाश आणि वायुवीजन आणि वाष्पाच्या संपर्कात येऊ नये म्हणून पुरेशी आकाराचे असावे.

सुरक्षा खबरदारी:- 1. उत्पादन लागू करताना, पेय, धूम्रपान करू नका किंवा पान चावू नका. 2. उत्पादन हाताळताना त्वचेचे संरक्षण करणारे शर्ट, लांब पँट, रासायनिक प्रतिरोधक दस्ताने, मास्क, गॉगल आणि झाकलेले बूट घालून. 3. वारा ज्या दिशेने वाहतो त्याच्या दिशेने फवारणी करून फवारणी करणाऱ्या व्यक्तीवर फवारणी होणार नाही. 4. नोझल तोंडाने फुंकू नका. ब्लॉक नोझल पातळ स्टेम किंवा ब्रशने स्वच्छ करा. 5. त्वचेवर कोठेही सांडल्यास, उघड्या भागांना साबण आणि भरपूर पाण्याने धुवावे. 6. हाताळणी आणि खाण्यापूर्वी, पिण्यापूर्वी किंवा धूम्रपान करण्यापूर्वी हाताने चांगले धुवावे. दूषित कपडे वेगळे करून धुवावे.

सावधगिरीचे विधान: 1. लेबल / पत्रकावर असलेल्याशिवाय इतर कोणत्याही कारणासाठी वापर नको. 2. कंटेनर रिकामे झाल्यानंतर त्याचे तुकडे करून नष्ट करावे. 3. हे उत्पादन जलचरांसाठी विषारी आहे. शेजारील तुती लागवड आणि रेशीम कीटक संगोपन सुविधांवर फवारणी टाळा. पिकांनंतर तुती लागवड फिरवू नका जेथे फवारणी किंवा पानांवर लागू केलेल्या क्लोरेंट्रानिलिप्रोल आधारित फॉर्मुलेशन सामान्यपणे वापरले जाते.

वापरलेले कंटेनर धुवावे, वापरलेले व अतिरिक्त सामग्रीचे सुरक्षित पाणी: 1. कीटकनाशक निर्माता तसेच उत्पादनाचे फॉर्मुलेटर किंवा ऑपरेटर यांची पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त सामग्री सुरक्षित पद्धतीने नष्ट करण्याची जबाबदारी आहे जेणेकरून पर्यावरण किंवा पाण्याचे प्रदूषण टाळता येईल. 2. वापरलेले पॅकेजेस पुन्हा वापरू नयेत म्हणून बाहेर सोडू नयेत. 3. पॅकेजेस तोडून वस्तीपासून दूर दफन करावे.

रासायनिक रचना:

१) क्लोरेन्ट्रानिलिप्रोल (ए.आई.)	१८.५० % भा/भा
२) मेथाइल मेथाक्रायलेट इथोक्सीलेटेड ग्राफ्ट कोपोलिमर	३.०० % भा/भा
३) इथाइलीन ऑक्साइड / प्रोपाइलीन ऑक्साइड ब्लॉक कोपोलिमर आणि इथोक्सीलेटेड अल्कोहल	२.०० % भा/भा
४) अटापुलगाइट क्ले	१.०० % भा/भा
५) झेन्थन गम	०.२५ % भा/भा
६) १,२-बेन्झिसोथियाझोलिन-३-वन	०.१० % भा/भा
७) सिलिकॉन इमल्शन	०.५० % भा/भा
८) प्रोपाईलीन ग्लायकोल	६.०० % भा/भा
९) पाणी	क्यूएस % भा/भा
एकूण	**१००.००% भा/भा**

"भाडी डब्बा इतीही पुन्हाचा वापरणे धोकादायक आहे."

उत्पादन आणि वितरक: **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**
नोंदणीकृत कार्यालय: ४८ हिल रोड, बांद्रा (प.), मुंबई - ४०० ०५०.
फैक्टरी प्लॉट नं. सी-४/१, खेरोली एम.आई.डी.सी., गाव : खेरोली, तालुका : चिपळूण, जिल्हा : रत्नागिरी, राज्य : महाराष्ट्र. पिनकोड : ४१५६०४. भारत.

ઓએમજી

ક્લોરેન્ટ્રાનિલિપ્રોલ ૧૮.૫% વ/વ એસ.સી
(કીટકનાશક)

વાપરતાં પહેલાં પત્રિકા વાંચો.

ક્લોરેન્ટ્રાનિલિપ્રોલ ૧૮.૫% વ/વ એસ.સી (૨૦% વ/વ) એ એન્થ્રેનિલિક ડાયમાઈડ કીટકનાશક છે. તે એક વ્યાપક સ્પેક્ટ્રમ કીટકનાશક છે અને ચોખા, કોબી, કપાસ, શેરડી, ટમેટા, મરચાં, સોયાબીન, રીંગણ, તુવેર, ચણા, ઉડદ, કારેલા, ભિંડી, મકાઈ અને મગફળીની સિફારિશ કરવા માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે.

ભલામણ:

ઉપયોગ કરતા પહેલા સારી રીતે હલાવો

પાક(પો)	કીટનું સામાન્ય નામ	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા		પાણીમાં મંદન (લિટર)	છેલ્લી સ્પ્રેથી પાકની લણણી સુધીનો પ્રતીક્ષાનો સમયગાળો (દિવસોમાં)	પ્રત્યેક સ્પ્રેનો ત્યારબાદનો પુન: પ્રવેશના સલામતી સમય (કલાકો)
		એ. એ. (ગ્રામ)	ફોર્મ્યુલેશન (મી.લી.)			
ચણા	ઈલાયચીનો ઝાંખરો (સ્પોડોપ્ટેરા એક્સિગુઆ)	૨૫	૧૨૫	૫૦૦	૧૧	-
કારેલા	ફળ અને પાંદડાં ખાતી ઇયળો (લેપ્ટોનોટર્સા અને હેરિસોનિયા)	૨૦-૨૫	૧૦૦-૧૨૫	૫૦૦	૭	-
ઉડદ	શીંગ છેદક (મારુકા સ્પા. & પુખ્ત કીટક)	૨૦	૧૦૦	૫૦૦	૨૦	-
રીંગણ	ફળ અને ડાંખળી છેદક (લ્યુકોનોડેસ ઓર્બોનાલિસ)	૪૦	૨૦૦	૫૦૦ - ૭૫૦	૩	-
કોબી	હીરા પતંગિયું (પ્લુટેલા જાઈલોસ્ટેલા)	૩૦	૧૫૦	૫૦૦	૩	-
ટમેટા	ફળ છેદક (હેલિકોવા આર્મિજેરા, સ્પોડોપ્ટેરા લિટા, સ્કોપોરપા એક્સિગુઆ)	૩૦	૧૫૦	૫૦૦	૩	-
મગફળી	તમાકુની ઇયળ (સ્પોડોપ્ટેરા લિટા)	૩૦	૧૫૦	૫૦૦	૨૮	-
મકાઈ	સ્ટેમ બોરર (સ્ટેમ બોરર અને ગુલાબી સ્ટેમ બોરર)	૩૦	૧૫૦	૫૦૦	૧૦	-
ભિંડી	ફળ છેદક (=પિજન આર્મ; ઈરેસિયા = નિલો)	૨૫	૧૨૫	૫૦૦	૫	-
તુવેર	ગ્રામ પોડ બોરર (હેલિકોવા આર્મિજેરા) શીંગ માખી (મારુકા ઓબ્ટુસા)	૩૦	૧૫૦	૫૦૦ - ૭૫૦	૨૯	-
ચોખા	સ્ટેમ બોરર (સ્કિરપોફાગા ઈનસર્ટુલાસ) પાન વાળનાર (ક્નેફાલોક્રોસિસ મેડિનાલિસ)	૩૦	૧૫૦	૫૦૦	૪૭	-
સોયાબીન	લીલી ઈયળ (ક્રુસોડેક્સિસ એકુટા) વીવીલ (ઓલો બ્રેચી)	૩૦	૧૫૦	૫૦૦ - ૭૫૦	૨૨	-
શેરડી	ટોચ બોરર (ચિલો સૈકેરિફેગસ

TAMIL

ஓஎம்ஜி

குளோராந்தாப்ரானிலிப்ரோல் 18.5% எ/எ எஸ் சி

(பூச்சிக்கொல்லி)

உபயோகப்படுத்துவதற்கு முன்பு விழுமியத்தையும் படிக்கவும்

குளோராந்தாப்ரானிலிப்ரோல் 18.5% எ/எ - மை சி 200 லி.மி. பூச்சி மருந்து 50 மி.லி. [illegible]

பயிர்களுக்கு பயன்படுத்தும் முறை, விழுமியங்கள் மற்றும் காலக்கெடுவுகள்

பயிர்கள்	பூச்சிகளின் பெயரு பெயர்	பயன்படுத்தும் அளவு - லிட்டர் / ஏ			கடைசி தெளிப்பிற்கு முன்னான நாட்கள் (PHI) - அறுவடை செய்வதற்கு
		எ.மு. (லிட்டரில்)	மறு மு. அளவு (மி.லி)	நீர் (லிட்டரில்)	
[illegible]	[illegible]	25	125	500	11
[illegible]	[illegible]	20-25	100-125	500	7
[illegible]	[illegible]	20	100	500	28
[illegible]	[illegible]	40	200	500-750	3
[illegible]	[illegible]	10	50	500	3
[illegible]	[illegible]	30	150	500	3
[illegible]	[illegible]	30	150	500	9
[illegible]	[illegible]	30	150	500	8
[illegible]	[illegible]	30	150	500	28
[illegible]	[illegible]	40	200	500	10
[illegible]	[illegible]	25	125	500	5
[illegible]	[illegible]	30	150	500-750	29
[illegible]	[illegible]	30	150	500-750	29
[illegible]	[illegible]	30	150	500	47
[illegible]	[illegible]	30	150	500-750	22
[illegible]	[illegible]	30	150	500-750	22
[illegible]	[illegible]	100-125	500-625	1000	208
[illegible]	[illegible]	75	375	1000	208
[illegible]	[illegible]	75	375	1000	208
[illegible]	[illegible]	75	375	1000	208
[illegible]	[illegible]	30	150	500	3

எச்சரிக்கை

பூச்சிக்கொல்லி தெளிப்பதற்கான தான் நடைமுறைகள்

உபயோகிப்பதற்கான வழிமுறைகள் [illegible]

பயிர் பாதுகாப்பு [illegible]

பயன்பாட்டு இடம் [illegible]

உபயோகமுறை [illegible]

முன்னெச்சரிக்கை [illegible]

மருந்து தயாரிப்பு [illegible]

கலவைகளை வழிமுறைகள் [illegible]

தெளிப்பான் பராமரிப்பு [illegible]

தெளிப்பு திரவம் [illegible]

பயிர்களுக்கான பரிந்துரைகள் மற்றும் பூச்சிகளின் இலக்கை வழிமுறைகளுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவுகளை நிர்ணயம்

தமிழ்நாடு செடிகளுக்கான பூச்சிகள் மற்றும் பூச்சிகளின் இலக்கை வழிமுறைகளுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவுகளை நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கு வழிமுறைகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது

தமிழ்நாடுவிவசாயிகள் வழிமுறைகள் பயிர்களான பீச்சுகளுடன் வெளை மரம் மரிமரம், சிறிய உயிரினத்துக்கும் நல்ல கவனம் தேவை.

குறைவு 1. 0.5 மி.லி/லி (0.5 மி.லி/லி) அ.மு.மு.மு