ENGLISH

POLICE®

FIPRONIL 40% + IMIDACLOPRID 40% WG

(Systemic & Contact Insecticide)

Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG is a contact and systemic insecticide. It contains 400 gram of Fipronil and 400 gram of Imidacloprid active ingredients, per kg of formulation.

Recommendation :

Crop	Common name of the Pest	Dosage / ha a.i. (g)	Dosage / ha Formulation (g)	Dilution in Water (Litre)	Pre harvest Interval (Days)	Re-entry Period (hours)
Sugarcane	White grubs *(Holotrichia consanguinea)*	(175 + 175) to (200 + 200)	(437.5 to 500)	(1000 to 1250)	296	48
Groundnut	White grubs *(Holotrichia serrata)*	(100 + 100) to (120 + 120)	(250 to 300)	1000	106	
Rice	Yellow stem borer *(Scirpophaga incertulas)*	(40 + 40) to (50 + 50)	(100 to 125)	500	7	
	Leaf folder *(Cnaphalocrocis medinalis)*					
	Brown Plant Hopper *(Nilaparvata Lugens)*					
Chilli	White grubs and termite	200 + 200	500	1000	3	
	Thrips *(Scirtothrips dorsalis)*	(30 + 30) to (40 + 40)	(75 to 100)	500	7	
	Fruit Borer *(Helicoverpa armigera)*					
Cotton	Aphids *(Aphis gossypii)*	50 + 50	125	500	36	
	Jassids *(Amrasca biguttula biguttula)*					

Good Practices relating to pesticide application techniques:

Direction of Use: Direct spray towards the crop and ensure uniform and proper coverage. It is recommended to use Knapsack sprayer or motorized knapsack sprayer fitted with hollow cone nozzle against the target insect pests in different crops as indicated in the above table.

Weather Condition (In general): Spray preferably during morning and evening hours. Do not apply on a windy day or before a rain.

Soil & Water (where ever applicable): No specific soil & water conditions are prescribed.

Crop stage for Application: May be applied in the recommended crop at any stage of crop growth when the incidence of insect pest is observed to cause economic loss.

Application Techniques: It is recommended to use Knapsack sprayer or motorized knapsack sprayer fitted with hollow cone nozzle. Take the required quantity of formulation dilute with a little water and stir using a stick. Then add the remaining quantity of water as per spray volume required and mix well again by stirring.

Equipment Type: It is recommended to use Knapsack sprayer or motorized knapsack sprayer fitted with hollow cone nozzle.

NozzleType: Hollow cone nozzle.

Dosage: Please refer above table for dosage details.

Instruction for Mixing: Take the required quantity of formulation dilute with a little water and stir using a stick. Then add the remaining quantity of water as per spray volume required and mix well again by stirring.

Re-entry Period: 48 hours.

Manner & Time of Application: May be applied to the above mentioned crops at the interval of 15-20 days when the incidence of insect pests is observed in the field.

Application Timings: 1) One application of Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG as soil drenching at the time of planting of Sugarcane crop. 2) One application of foliar spray at seedling stage in groundnut crop. 3) Need based foliar spraying of formulation as per pest infestation in rice & chilli crop. 4) Spray preferably during morning and evening hours. Do not apply on a windy day or during rain.

Frequency including max number of sprays: 2-3 sprays at 15-20 days interval may be applied at the recommended dose. Repeat application, if necessary.

Stages during which pesticides should not be applied on any crop: Apply only on stage as instructed in crop stage of application. Do not applied any other stage.

Symptoms of Poisoning: Convulsions, Tremors, Anxiety, Restlessness.

Caution: The above mentioned symptoms must not be confused with organophosphorus compounds. There may be delayed neurological effects, including brain oedema.

First Aid Measures: 1) Remove contaminated clothing immediately and dispose off safely. Call a physician immediately. 2) When inhaled, remove to fresh air and seek medical aid. Give oxygen or artificial respiration if needed. 3) In case of skin contact, wash off thoroughly with plenty of soap and water, if available with polyethylenglycol 400, subsequently rinse with water. 4) In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. 5) If swallowed, seek medical advice immediately. Gastric lavage should be considered in case of significant ingestions only within first two hours. However, the application of activated charcoal and sodium sulphate is always advisable. 6) In case of convulsions, a benzodiazepine (e.g. diazepam) should be given according to standard regimens. 7) Keep under medical supervision for at least 48 hours.

Antidote: Specific antidote not known. Treat symptomatically.

Phytotoxity: Non phytotoxic at recommended dose.

Storage Conditions: 1) Storage and transportation of the plant growth regulator should be done in such a way that no foodstuff and animal feed are contaminated. 2) Store in a cool, dry, well-ventilated, well-built room of sufficient dimensions and in its original containers, away from foodstuff and animal feeds. 3) If leakage or spillage occurs during transportation or storage, necessary measure should be taken to prevent poisoning and pollution of soil and water. Keep out of reach of children.

Safety Precautions: 1) Avoid contact with spilled product or contaminated surface. 2) Wear personal protective equipment. Unprotected persons must be kept away. 3) Do not allow the undiluted product to come into contact with skin. Use PVC or other plastic material gloves or nitrile gloves and long sleeved shirts to protect skin to avoid direct contact with the product. 4) Avoid contact with skin, eyes and clothing. Keep working clothes separately. For eye protection, use safety glasses (goggles). 5) Wash hands away from eating, drinking, smoking or using the toilet and also wash hands immediately after spray. If necessary, take a shower after finishing the spray. 6) Remove soiled and soaked clothing immediately and clean thoroughly before using again.

Cautionary Statement: 1) Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. 2) Destroy the container after use as directed on leaflet. **3) The product is reported to be toxic to fishes, aquatic invertebrates and bees. Its use in and around water bodies and during active foraging period of bees should be avoided.**

Disposal of used containers, washing from equipment and surplus material: 1) It shall be the duty of manufacturers, formulators of insecticides and operators to dispose packages or surplus material and washings in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2) The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3) The packages shall be broken and buried away from habitation.

Chemical Composition:

Content		% w/w
Fipronil A.I.	active ingredients	40.00% w/w
Imidacloprid A.I.	active ingredients	40.00% w/w
Sodium polyacrylate	other ingredients	3.00% w/w
Sodium Dioctyl sulfosuccinate 85%	other ingredients	2.00% w/w
Non Ionic aqueous emulsion of (30%) polydimethylsiloxane	other ingredients	0.30% w/w
Sodium lignosulfonate sulfomethylated	other ingredients	QS w/w
	Total :	100.00% w/w

" DANGEROUS TO RE USE EMPTY CONTAINER "

Manufactured & Marketed by : **Gharda Chemicals Limited**
Regd. Office: 48, Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400050.
Factory: Industrial Growth Center, Phase II, Samba, (J&K) - 184121

HINDI

पोलीस

फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्लुजी

(अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्लुजी एक स्पर्शीय एवं अंतर्प्रवाही कीटनाशक है। इसके प्रति किलोग्राम फारमुलेशन में ४०० ग्राम फिप्रोनिल व ४०० ग्राम इमिडाक्लोप्रिड सक्रिय तत्त्व समाविष्ट है।

सिफारिश :

फसल	कीड़ों के सामान्य नाम	खुराक प्रति हेक्टर सक्रिय तत्व (ग्रा.)	खुराक (ग्रा.)	पानी की मात्रा (ली.)	कटाई आई.पी.एम. संदर्भित (दिनों)	पुनः प्रवेश की अवधि (घंटे)
गन्ना	सफेद ग्रब *(होलोट्रिकिया कंसंगुइनिया)*	(१७५ + १७५) से (२०० + २००)	(४३७.५ से ५००)	(१००० से १२५०)	२९६	४८
मूँगफली	सफेद ग्रब *(होलोट्रिकिया सेराटा)*	(१०० + १००) से (१२० + १२०)	(२५० से ३००)	१०००	१०६	
धान	पीला तना छेदक *(स्क्रपोफागा इनसरटुलास)*	(४० + ४०) से (५० + ५०)	(१०० से १२५)	५००	७	
	पान लीपेटक *(क्नेफालोक्रोसिस मेडिनालिस)*					
	भूरा पौधा का गुलदस्ता *(नीलापार्वाता लुगेन्स)*					
मिर्च	सफेद ग्रब और दीमक	२०० + २००	५००	१०००	३	
	थ्रिप्स *(सिरटोथ्रिप्स डोरसालिस)*	(३० + ३०) से (४० + ४०)	(७५ से १००)	५००	७	
	फल छेदक *(हेलिकवरपा आर्मिजेरा)*					
कपास	माहू *(एफिड पोलस्पी)*	५० + ५०	१२५	५००	३६	
	तेला *(अमरास्का बीगुटुला बीगुटुला)*					

कीटनाशक अनुप्रयोग तकनीकों से संबंधित अच्छे आचार :

उपयोग के लिए निर्देश : फसल की ओर सीधा छिड़काव करें और एक समान और उचित कवरेज सुनिश्चित करें। टेबल में दिए गए विवरण के अनुसार फसलों में लक्षीकृत कीटों के लिए नैपसैक स्प्रेयर या मोटरचालित नैपसैक स्प्रेयर का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

मौसम की स्थिति : (सामान्यतः) छिड़काव प्रातः और शाम के घंटों के दौरान छिड़काव करें। बारिश या तेज हवा के समय छिड़काव न करें।

मिट्टी और पानी : (जहाँ लागू होवे) : कोई विशिष्ट मिट्टी या पानी की स्थिति निर्धारित नहीं है

फसल अवस्था : फसल की वृद्धि के किसी भी अवस्था में छिड़काव किया जा सकता है जब कीट का प्रकोप होने पर आर्थिक नुकसान होने की संभावना हो।

आवेदन तकनीक : होलो कोन नोजल के साथ लगे हुए नैपसैक स्प्रेयर या मोटरचालित नैपसैक स्प्रेयर का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। आवश्यक मात्रा में सिमिश्रण (ली.) बीज़ पानी मिलाने वाले लाठी से अच्छी तरह मिलाएँ। अब पानी आवश्यक छिड़काव मात्रा अनुसार पानी की बाकी मात्रा मिलाने वाले हल्का मिलाएँ। आवश्यकतानुसार सा मात्रा के अनुसार बना हुआ पानी डालें और फिर से हिलाते हुए अच्छी तरह मिलाएँ।

उपकरण प्रकार : होलो कोन नोजल के साथ लगे हुए नैपसैक स्प्रेयर या मोटरचालित नैपसैक स्प्रेयर

नोजल प्रकार : होलो कोन नोजल.

खुराक : कृपया ऊपर तालिका देखें।

सिमिश्रण के लिए निर्देश : फॉर्मुलेशन की आवश्यक मात्रा में अल्प हो थोड़े से पानी के साथ घोलकर करें और एक स्टिक का उपयोग करके हिलाएँ। आवश्यकतानुसार स्प्रे मात्रा के अनुसार बचा हुआ पानी डालें और फिर से हिलाते हुए अच्छी तरह मिलाएँ।

पुनः प्रवेश अवधि : ४८ घंटे।

आवेदन का समय और तरीका : उपरोक्त फसलों में कीट का प्रकोप होने पर १५-२० दिनों के अंतराल पर फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्लुजी के एक छिड़काव की सिफारिश की जाती है।

नोजल प्रकार : होलो कोन नोजल।

खुराक : कृपया ऊपर तालिका देखें।

सिमिश्रण के लिए निर्देश : फॉर्मुलेशन की आवश्यक मात्रा में अल्प हो थोड़े से पानी के साथ घोलकर करें और एक स्टिक का उपयोग करके हिलाएँ। आवश्यकतानुसार स्प्रे मात्रा के अनुसार बचा हुआ पानी डालें और फिर से हिलाते हुए अच्छी तरह मिलाएँ।

पुनः प्रवेश अवधि : ४८ घंटे।

आवेदन का समय और तरीका : उपरोक्त फसलों में कीट का प्रकोप होने पर १५-२० दिनों के अंतराल पर फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्लुजी के एक छिड़काव की सिफारिश की जाती है।

नोजल प्रकार : होलो कोन नोजल.

TAMIL

போலீஸ்

ஃபிப்ரோனில் 40% + இமிடாக்ளோப்ரிட் 40% கலவை

(குடல் மற்றும் தொடு நஞ்சு பூச்சிக்கொல்லி)

ஃபிப்ரோனில் 40% + இமிடாக்ளோப்ரிட் 40% WG குடல் மற்றும் தொடு நஞ்சு பூச்சிக்கொல்லி. ஒவ்வொரு கிலோ நனையும்தூளில் 400 கிராம் ஃபிப்ரோனில் மற்றும் 400 கிராம் இமிடாக்ளோப்ரிட் கொண்ட உட்பொருட்களாகும்.

பரிந்துரை:

பயிர்	பூச்சியின் பெயர்	மருந்தளவு / எக்டர்		நீரளவில் தெளிக்கை செறிவு (மி.கி.)	தெளிக்கப்படும் மருந்தின் அளவு (லி./எக்டர்)	முடிவு நாளுக்கு முன் (நாள்)
		கிராம் (கிராம்)	கிலோ (கிலோ)			
கறும்பு	கரையான் Termites (மாதிரி பெயர் Microtermes obesi)	(175+175) மறை (200+200)	(437.5 மறை 500)	(1000 மறை 1250)	296	
நிலக்கடலை	கரையான் Termites (மாதிரி பெயர் Microtermes obesi)	(100+100) மறை (125+125)	(250 மறை 312.5)	1000	106	
நெல்	புகையிலை வெட்டுப் புழு Leaf cutter caterpillar (மாதிரி பெயர் Nomophila noctuella)	(40+40) மறை (50+50)	(100 மறை 125)	500	7	42
	இலை சுருட்டுப் புழு Leaf roller (மாதிரி பெயர் Cnaphalocrocis medinalis)					
	பச்சைத் தத்தி Jassids (மாதிரி பெயர் Nephotettix virescens)					
மிளகாய்	வெள்ளை ஈக்கள் White fly (மாதிரி பெயர் Bemisia tabaci)	200+200	500	1000	3	49
	இலைப்பேன் Thrips (மாதிரி பெயர் Scirtothrips dorsalis)	(30+30) மறை (37+37)	(75 மறை 93.5)	500	7	
	வெள்ளைப் பேன் Aphids (மாதிரி பெயர் Aphis gossypii)					
பருத்தி	பேரிக்காய் புழு Pink bollworm (மாதிரி பெயர் Pectinophora gossypiella)	50+50	125	500	36	
	தத்தி பூச்சி Leafhopper (மாதிரி பெயர் Amrasca biguttula biguttula)					

பூச்சிக்கொல்லி பயன்படுத்தும் முன் பயிரை பெட்டகம் செய்யும் காலை நேரம் தவிர்க்கவும். பயன்படுத்தும் முன் பயிரை பெட்டகம் செய்யும் நேரத்தை குறைக்கவும். பெட்டகம் செய்யப்பட்டவுடன் பெரும்பாலான பயிர்களில் வயல் இலைகளுக்கு மேலாக 24 மணி நேரத்திற்கு பெட்டகம் செய்யவும். பெட்டகம் செய்யப்பட்ட பயிர்களை 24 மணி நேரத்திற்கு அறுவடை செய்யக்கூடாது.

வாசனை (பொருந்தாத) : மாம்பழ வண்டு (மாதிரி பெயர் Cryptorhynchus mangiferae) மாம்பூ விலை: 1 கிலோ மாம்பூவில் பயன்படுத்தவும் கலவை.

பயன்படுத்தவேண்டிய பயிர்கள்: பொருளாதார நிலுவை பூச்சிகள் மற்றும் பூச்சிகளுக்கு எதிராக பயன்படுத்தவும். பயிர் வகைப் பிரிவு நிலைகளில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட பயிர்கள் மட்டுமே.

பயன்படுத்தும் நுட்பங்கள்: கொடுக்கப்பட்டுள்ள பொருத்தமான நுட்பங்கள் தெளிப்பான் அல்லது கை பூச்சி தெளிப்பான் பயன்படுத்தி சிறந்தமுறையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தெளிவான மற்றும் தூய்மையான தண்ணீரை மட்டுமே பயன்படுத்தவும். தெளிக்கும் கரைசலை தயாரிக்கும் போது, சிறிதளவு தண்ணீரில் தேவையான அளவு மருந்தை கலக்கவும். கலவை கலக்கவும்.

உபயோக வரம்பு: பொருந்தாத விஷயங்கள் மற்றும் நுகர்வோர் தொடர்பான அபாயங்கள் ஏதுமில்லை. பொருந்தாத தன்மை: தகவல் கிடைக்கவில்லை.

நச்சுத்தன்மை அறிவுரைகள்: தோலுடன் பட்டால் இரும்பு தயாரிப்பை உடனடியாக நீக்கி, பிறகு நன்னீரினால் சிறிது நேரம் குறைந்தது 20 நிமிடங்கள். பின் மருத்துவ ஆலோசனை பெறவும். கண்களுடன் தொடர்பு: கண்களை நன்கு கழுவவும்.

நீண்டகால நுண்ணுயிர் கலவை: 46 மணி நேரம்.

பயன்படுத்தும் விதம் மற்றும் காலம்: வறுத்தும் பூச்சிகள் காலை அல்லது மாலை 15-20 நாட்கள் இடைவெளியில் 2-3 முறை தெளிக்கவும். கொடுக்கப்பட்ட நீர்மட்டங்கள் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டால் 60% விளைச்சல் அதிகரிக்கும் சாத்தியம்.

பயன்படுத்தவேண்டிய காலம்: 1) குறுகிய பயிரை நடுவதோடு பரவலான தளைத்தெடுப்பு பூச்சிகளுக்கு எதிராக பயன்படுத்தவும். 2) நிலக்கடலை பயிரை தாக்கும் 60% விளைச்சல் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. 3) நிலக்கடலை பயிரை தாக்கும் பூச்சிகளுக்கு எதிராக பயன்படுத்தவும். 4) வண்டு வகையான பூச்சிகளுக்கு எதிராக பயன்படுத்தவும். 5) பருத்தி பயிரை தாக்கும் பூச்சிகளுக்கு எதிராக பயன்படுத்தவும். 6) மிளகாய் பயிரை தாக்கும் பூச்சிகளுக்கு எதிராக பயன்படுத்தவும்.

விஷத்தன்மை அறிவுரைகள்: கடுமையான விஷம். நீண்டகால விஷம். மனிதர்களுக்கு புற்றுநோய் ஏற்படுத்தும் சாத்தியம் உள்ளது. மனிதர்களுக்கு மரபணு ரீதியான தீங்கு விளைவிக்கும் சாத்தியம் உள்ளது. கருவுறுதலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் சாத்தியம் உள்ளது. கருவுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் சாத்தியம் உள்ளது. தாய்ப்பாலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் சாத்தியம் உள்ளது.

ரசாயனக் கலவை:

உள்ளடக்கம்	% w/w
ஃபிப்ரோனில் ஏ.ஐ.	40.00% w/w
இமிடாக்ளோப்ரிட் ஏ.ஐ.	40.00% w/w
டிஃபுடாக் பாஸிட் (பாஸ்ஃபோட்)	3.00% w/w
சோடியம் லாரில் சல்ஃபேட்	2.00% w/w
புரதம் நீக்கப்பட்ட சோயாபீன் மாவு (30%) (மாவில் 3 கிராம் நைட்ரஜன்/100 கிராம்)	9.30% w/w
ஸ்டார்ச்	QS w/w
ஊட்டச்சத்துக்கள் (ஃபிப்ரோனில் 0.1% w/w)	0.1% w/w
மொத்தம்	100.00% w/w

"வெற்று கொள்கலனை பயன்படுத்துவது தடைசெய்யப்பட்டது"

தயாரிப்பு சந்தைப்படுத்தும்தியாயு: **ஸர்டா கெமிக்கல்ஸ் லிமிடட்**

(ஃபிப்ரோனில் 1 ஆலுமைனர் 49, ஜெட் சிட்டி ஜாமுர் (), ஜாமுர் - 400300 மொத்தமாக: ஜெமினி லைஃப்லைன் ஹோட் லிமிடட், சிடிஎல் 1, சென்னை, (ஒரு) - 184121

TELUGU

పోలీస్

ఫిప్రోనిల్ 40% + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 40% డబ్ల్యుజి

(కాకుడు మరియు అంతర్గాహక కీటకాలకు వినాశన క్రిమిసంహారి)

ఫిప్రోనిల్ 40% + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 40% డబ్ల్యుజి అనేది కాకుడు మరియు అంతర్గాహకాలకు వినాశన క్రిమిసంహారి. రెండు కిలోల నాణ్యతకలిగిన 400 గ్రాముల ఫిప్రోనిల్ మరియు 400 గ్రాముల ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మరియు మిశ్రమమైనవి.

సిఫారసులు :

పంట(లు)	కీటకం పేరు	సిఫారసు చేసిన మోతాదు		నీటిలో కలుపవలసిన గాఢత (మి.గ్రా.)	తీసుకోవలసిన మోతాదు (లీ./హెక్టా.)	కోత కంటే ముందు వేచి ఉండే కాలం (రోజులు)
		గ్రా. (గ్రాములో)	కి.గ్రా. (కిలోలో)			
కబ్బము	చీడ పీల్చు పురుగు (మాదిరి పేరు Microtermes obesi)	(175+175) మరియు (200+200)	(437.5 మరియు 500)	(1000 మరియు 1250)	296	
వేరుశెనగ	పురుగు / తెల్లపురుగు (మాదిరి పేరు Microtermes obesi)	(100+100) మరియు (125+125)	(250 మరియు 312.5)	1000	106	
వరి	పొగాకు గుడారం పురుగు (మాదిరి పేరు Nomophila noctuella)	(40+40) మరియు (50+50)	(100 మరియు 125)	500	7	42
	ఆకుచుట్టు పురుగు (మాదిరి పేరు Cnaphalocrocis medinalis)					
	పచ్చ తత్తడి (మాదిరి పేరు Nephotettix virescens)					
మిరపకాయ	తెల్లదోమ తామర పురుగు (మాదిరి పేరు Bemisia tabaci)	200+200	500	1000	3	49
	ఆకు పేనుబంక (మాదిరి పేరు Scirtothrips dorsalis)	(30+30) మరియు (40+40)	(75 మరియు 100)	500	7	
	పత్తి పురుగు (మాదిరి పేరు Aphis gossypii)					
	పేరిక్కాయ పురుగు (మాదిరి పేరు Pectinophora gossypiella)	50+50	125	500	36	
	తత్తడి పురుగు (మాదిరి పేరు Amrasca biguttula biguttula)					

కీటకాలకు ఉపయోగించే తయారీ సరంజామా మరియు అప్లికేషన్ పద్ధతులు:

ఉపయోగించే గరిష్ఠ నీటి పరిమాణం: పరిధులు తక్కువ ప్రదేశాలలో పిచికారీ చేసినప్పుడు, సాధారణ పరిధులు ఎకరానికి 200 లీటర్లు మరియు పెద్ద పరిధులు ఎకరానికి 400 లీటర్లు. ఎకరానికి 400 లీటర్ల కంటే ఎక్కువ పరిధులు ఉపయోగించకూడదు. ఎకరానికి 200 లీటర్ల కంటే తక్కువ పరిధులు ఉపయోగించకూడదు. ఎకరానికి 200 లీటర్ల కంటే తక్కువ పరిధులు ఉపయోగించకూడదు. ఎకరానికి 200 లీటర్ల కంటే తక్కువ పరిధులు ఉపయోగించకూడదు. ఎకరానికి 200 లీటర్ల కంటే తక్కువ పరిధులు ఉపయోగించకూడదు.

తెగుళ్ల నివారణ పద్ధతులు: పురుగుమందులు పిచికారీ చేసేటప్పుడు, పురుగుమందు పిచికారీ చేసేటప్పుడు, పురుగుమందు పిచికారీ చేసేటప్పుడు, పురుగుమంద