English

Hindi

Marathi

Gujarati

Punjabi

Rangeela®

Fipronil 4% + Acetamiprid 4% w/w SC
(Insecticide)

Read Leaflet Before Use.

Fipronil 4.0% + Acetamiprid 4.0% (w/w) SC is a combination of a new generation Phenylpyrazole Compound, Fipronil and a neonicotinoid, Acetamiprid which brings together excellent synergism in controlling various sucking pests complex in cotton crop. It kills insects through contact, ingestion, systemic action as well as translaminar effect.

Recommendation :

Crop (s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (l)	Waiting Period between last spray to harvest (days)
		AI (g)	Formulation (ml)		
Cotton	Aphids, Jassids and Whiteflies	40+40	1000	500	30

SHAKE WELL BEFORE USE

Good Practices relating to pesticide application techniques

Direction of Use: Method of Application: It should be applied as foliar spray. Uniform coverage is necessary for effective control of insect pests. A simple knapsack sprayer can be used for spraying. Preparation of Spray Solution: Mix the recommended dose in ¼ of the recommended quantity of water to the spray tank with agitation. Add remaining quantity of water with continuous agitation. Ensure complete dispersion of the product in mix water before spraying of the spray solution. Maintain agitation while spraying. Number of application: 2-3 sprays are required at an interval of 7-14 days, depending upon the pest infestation.

Weather Condition(in general): Spray when the wind is steady and ideal. Avoid spraying in temperature above 30°C.

Soil & Water(where ever applicable): Only used as foliar application.

Crop Stage for application: vegetative growth stage

Application Technique: A simple knapsack sprayer fitted with hollow cone nozzle type can be used for spraying.

Equipment Type: Knapsack sprayer

NozzleType: Hollow cone nozzle

Dosage: As mentioned in table

Instruction for Mixing:-

Re-entry Period: as soon as spray dries up or 48 hours

Manner and Time of Application: Do not spray against wind.

Application Timing: Avoid application in afternoon hours. Ideal timing for application is morning and evening hours.

Frequency: 2-3 sprays

Stages during which pesticides should not be applied on any crop:-

Precautions to be taken to avoid harm to the beneficial insects like honey bees and natural enemies of pests: Do not spray during active bee-foraging period of the day

Symptoms of Poisoning: mainly consists of irritability, lethargy, muscle tremors and in extreme case possibly convulsions/seizures may occur. Nausea, vomiting. mild, temporary health effects mostly headache and dizziness, paresthesia, gastroinstential, respiratory and dermal signs and symptoms.

First Aid: If ingested: if person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, Consult a physician. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. Consult eye specialist.

Antidote: No specific antidote, symptomatic and supportive therapy.

Phytotoxicity: Non phytotoxic when used as recommended.

Storage Conditions: 1. The packages containing insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly food articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide. Keep out of reach of children. 2. The store rooms should be well built well lit, well ventilated and of sufficient dimensions. The conditions of the store should be dry and cool.

Safety Precaution: 1) Avoid inhalation and contact with skin and eyes. 2) Keep away from children, food stuff, animal feed, heat and flame, Store in cool and dry place under lock and key. 3) Do not mix the insecticides with bare hands. 4) Do not eat, drink, smoke or chew tobacco while spray. 5) Spray the insecticide only in the direction of wind blowing and not against it so as to prevent the setting of the drift on body. 6) The user should use full protective clothing with rubber gloves, boots. Face should be covered with face shield or dust mask and body should be covered with an overall or rubber apron and hood or hat. 7) Do not use as an ultra-low volume spray.

Cautionary Statement: 1. It is toxic to honey bees, spray application should be avoided during the foraging period of bees. 2. Highly toxic to fish, aquatic organisms hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture. 3. Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. 4. Destroy the container after use as directed on leaflet. 5. Toxic to earthworms and other beneficial arthropods. 6. Toxic to birds.

Disposal of used containers, washing from equipment and surplus material: 1. It shall be the duty of manufactures, formulators of insecticides and operators to dispose packages or surplus material and washings in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Chemical Composition :

Fipronil a.i.	4.00 % W/W
Acetamiprid a. i.	4.00 % W/W
Stabilizers : Sunflower oil	5.00 % W/W
Emulsifier : Blend of modified polyethanoxy ether and of sulfated anionic surfactant	8.00 % W/W
Sticking/ Stabilizing agent : Formaldehyde	0.50% W/W
Anti foaming agent : Silicon defoamer	0.20%W/W
Solvent : Water	Q. S. %
Total	**100.000%W/W**

" DANGEROUS TO RE USE EMPTY CONTAINER "

Manufactured & Marketed by: **GHARDA CHEMICALS LIMITED**
Regd. Office: 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400 050.
Factory : Industrial Growth Centre, Phase II, Samba, (J&K) -184121

रंगीला

फिप्रोनिल ४% + एसीटामिप्रिड ४% भार/भार एस.सी.
(कीटनाशक)

इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़े ।

फिप्रोनिल ४% + एसीटामिप्रिड ४% एस.सी. (भार/भार) एस.सी. एक नये जमाने के फिनायलपायराजोल युक्त फिपोनिल व निओनिकोटि नोइड युक्त एसीटामिप्रिड का मिश्रण है जो कि मिलकर एक उच्च किस्म के उत्पाद का निर्माण करते है जो कि कपास की फसल के विभिन्न कीटों को रोकते है यह कीटों को छूने, निगलने व सिस्टमिक क्रिया से व साथ ही ट्रांसलेमिनर प्रभाव से खत्म करते है।

उपयोग:

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
		स. तत्व (ग्रा)	संरचना (मि. ली)		
कपास	एफिड, जैसिड एंव सफेद मक्खी	४०+४०	१०००	५००	३०

उपयोग करने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिलायें

कीटनाशक अनुप्रयोग तकनीकों से संबंधित अच्छे अभ्यास:

उपयोग के लिए निर्देश : सुझाई गयी डोज का एक चोथायी गयी मात्रा बतायी गये पानी के साथ हिलाते हुये टैंक में मिलाये। बची हुयी सामग्री को पूरी तरह हिलाते हुये टैंक में मिलायें। सुनिश्चित कर ले कि कीटनाशक पानी में पूरी तरह घुल गया हो। स्प्रे करते समय मिलावट को समान रखने के लिये स्प्रेयर को हिलाते रहे। इसका उपयोग फोलियर स्प्रे से करना चाहिए। कोई विशेष मिट्टी की स्थिति निर्धारित नहीं है। (पीएचआई के अवलोकन के बाद) फूल पर और सिर्फ कटाई से पहले लागू न करें। कीटों की अच्छी रोकथाम के लिये समान मात्रा में चारों तरफ छिडकाव होना चाहिए। नेपसेक स्प्रेयर खोखला कोन नोक प्रकार के साथ का उपयोग किया जा सकता है।

छिड़काव का समय – छिड़काव की संख्या: २ से ३ बार छिड़काव ७–१४ दिनों के अन्दर कीटों के संख्या के आधार पर करें। एक सत्र में कोई तीन से अधिक स्प्रे नही। पुनः प्रवेश का समय जैसे ही छिड़काव फसल से सूख जाये।

मौसम की स्थिति : जब हवा स्थिर और आदर्श हो तब स्प्रे करें। ३०° से. से अधिक तापमान में छिड़काव से बचे।

मिट्टी और पानी : केवल फोलिअर एप्लीकेशन के रूप में उपयोग किया जाता है।

फसल अवस्था : वनस्पति विकास चरण

आवेदन तकनीक : खोखले शंकु नोजल प्रकार से सुसज्जित एक साधारण नैपसेक स्प्रेयर का उपयोग छिड़काव के लिए किया जा सकता है।

उपकरण प्रकार: नेपसैक स्प्रेयर

नोजल प्रकार: खोखले शंकु नोक

खुराक: As mentioned in table

मिश्रण के लिए निर्देश: –

पुनः प्रवेश अवधि: जैसे ही स्प्रे सूख जाता है या ४८ घंटे

आवेदन का समय और समय: हवा के विपरीत छिडकाव न करें

आवेदन का समय : दोपहर के घंटों में छिडकाव से बचें। छिडकाव के लिए आदर्श समय सुबह और शाम का समय है।

अधिक से अधिक अंक सहित आवृत्ति: २–३

चरण जिसके दौरान किसी भी फसल पर कीटनाशक नहीं लगाया जाना चाहिए: –

शहद की मक्खियों और कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लाभकारी कीड़ों से नुकसान से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियां: –

विष के लक्षण: मुख्यतः चिडचिडापन, उदासी, मान्सपेशियों में ऐठन। अत्याधिक प्रकोप की अवस्था में दौरे पड़ने की संभावनाए हो सकती है। मतली उल्टी। हल्के, अस्थायी स्वास्थ्य प्रभाव ज्यादातर सिरदर्द और चक्कर आना, पेरेस्टेसिया, गैस्ट्रोइन्टेंशियल, श्वसन और त्वचीय लक्षण है।

पादप आविषालुता : सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशाक्ता नहीं हैं।

प्राथमिक उपचार: अगर मुंह से निगल लिया है: यदि व्यक्ति सचेत और सतर्क है, तो पानी से मुंह कुल्ला कराये और पीने के लिए १ या २ गिलास पानी दें। एक बेहोश व्यक्ति के मुंह से कुछ भी कभी नहीं दे। डॉक्टर को बुलाएं। बिना उपस्थित चिकित्सक की सलाह उल्टी न कराये। यदि साँस में लिये जाने पर: रोगी को ताजी हवा में ले जाएं और शरीर के तापमान का ख्याल रखें। यदि रोगी साँस नहीं ले रहा है या कठिनाई से साँस ले रहा है, तो कृत्रिम श्वसन दें, एक चिकित्सक से परामर्श करें। त्वचा के संपर्क के मामले में: शरीर के प्रभावित हिस्से को अच्छी तरह से साबुन से धोएं और बालों और नाखूनों सहित पानी का खूब इस्तेमाल करें। यदि दर्द, लालिमा या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श करे। सभी दूषित कपड़ों को अलग किया जाना चाहिए और उपयोग से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए। आखों के संपर्क के मामले में: कम से कम १५ मिनट के लिए बहुत सारे पानी से धीरे–धीरे धोए। यदि दर्द, जलन, लालिमा या फोटोफोबिया बनी रहती है तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें।

विष नाशक : कोई विशिष्ट विषहर औषध नहीं है, लाक्षणिक उपचार करें। रोगसूचक और सहायक चिकित्सा करें।

संग्रहण की शर्ते : कोई विशेष विषनाशक नहीं है, लक्षणों के अनुसार इलाज करें।

सुरक्षा के लिए सावधानियाँ: १) इसे सूंघे नहीं तथा त्वचा एवं आँखों को इसके संपर्क से बचाए। २) इसको बच्चों से, खाद्य पदार्थ, पशु, आहार और आग से दूर रखिए। इसको सुखी और ठंडी जगह में ताला लगाकर रखें। ३) इसको नंगे हाथोंसे नहीं मिलाना चाहिए। ४) छिड़काव के समय खाना–पीना, धूम्रपान करना या तम्बाकू चुघलना वर्जित है। ५) हमेशा हवा की दिशा में ही छिडकाव कीजिए, उसके विपरीत नहीं ताकि छिड़काव के कण बदन पर न गिरे। ६) उपयोगकर्ता के छिड़काव करने के समय सुरक्षित कपड़े, रबड़ के दस्ताने, बुट पहने चाहिए। मुँह फेस शील्ड या डस्ट मास्क को ढका होना चाहिए (७) इस कीटनाशक को अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे की तरह नहीं छिड़कना चाहिए।

सावधानिय कथन: १. यह मधुमखियों के लिए हानिकारक है, जब मधुमखिया भोजन की तलाश में जाते हैं तब छिड़काव न करें। २. मछलियों, जलीय जीवों के लिए अत्यधिक जहरीला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि के पास इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ३. लेबल लीफलेट में निर्देष्ट किये गये फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। ४. उपयोग के बाद खाली डिब्बों को लिफलेट में दिये गये निर्देशो के अनुसार नष्ट करे। ५. केंचुआ और अन्य फायदेमंद आर्थ्रोपोड के लिए विषाक्त। ६. पक्षियों को विषाक्त।

कीटनाशक के प्रयोग किये गए डिब्बों, बचे हुए कीटनाशको तथा पात्रों के धोवन का निपटारा : १. यह कीटनाशकों के निर्माताओं, ऑपरेटरों और फॉर्मूलेटर का कर्तव्य होगा कि पर्यावरणीय या जल प्रदूषण को रोकने के लिए एक सुरक्षित तरीके से पैकेज या अधिशेष सामग्री और धोवन का निपटान करें। २. उपयोग किये हुए पैकेज को खुले में ना छोड़े ताकि उनका पुनरुपयोग ना किया जा सके। ३. पैकेज को तोड़ कर आबादी से दूर जमीन के निचे गाड़ दें।

रासायनिक संरचना :

फिप्रोनिल स.त.	४.०० % भा/भा
एसीटामिप्रिड स.त.	४.०० % भा/भा
स्टेबिलायजर सनपलोवर ऑयल	५.०० % भा/भा
इमुल्सिफायर ब्लैड ऑफ मोडिफाइड पोलीइथोनोक्सी ईथर एंव सल्फेटेड अनआयोनिक सरफेक्टेन्टस	८.०० % भा/भा
स्टिकिंग / स्टेब्लाइंजिग एजैंट फार्मल्डिहाइड	०.५० % भा/भा
एंन्टी फोमिंग एजैंट सिलिकान डिफामर	०.२० % भा/भा
सोल्वैंट पानी	पर्याप्त मात्रा %
योग	**१००.००० % भा/भा**

" खाली कंटेनर का दोबारा उपयोग करना खतरनाक है । "

निर्माता और विक्रेता: **घरडा केमिकल्स लिमिटेड,**
पंजी. कार्यालय: ४८ हिल रोड बांद्रा (प), मुंबई – ४०० ०५०. भारत.
फॅक्टरी इन्डर्स्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, फेज २, साम्बा, जम्मू–कश्मिर – १८४०२१.

रंगीला

फिप्रोनील ४% ॲसिटामीप्रीड ४% भार/भार एस.सी.
(कीटकनाशक)

वापरण्यापूर्वी माहिती पत्रक वाचा.

फिप्रोनील ४% + ॲसिटामीप्रीड ४% एस.सी. (भार/भार) हे एक नवीन पिढीतील फेनाइलपायराझोल कंपाउंड आहे, फिप्रोनील आणि एक निओनिकोटीइड ॲसिटामीप्रीडचे मिश्रण आहे जे कपाशीच्या पीकातील विविध रस शोषक कीटकांच्या नियंत्रणासाठी संयुक्तपणे उत्कृष्ट संयुक्त शक्ती निर्माण करते. स्पर्श , पोटात जाणे, यंत्रणांतर्गत कृती तसेच ट्रान्सलामिनार परिणामामार्फत कीटकांचा नाश करते.

शिफारस:

पीक(के)	कीटकाचे सामान्य नाव	मात्रा/हेक्टर		पाण्यात सौम्यीकरण (लीटर)	शेवटची फवारणी आणि कापणीच्या दरम्यान थांबण्याचा कालावधी (दिवसांत)
		सघ (ग्राम)	मिश्रण (मिली)		
कपाशी	तुडतुडे, मावा आणि पांढरी माशी	४०+४०	१०००	५००	३०

वापरण्यापूर्वी बाटली व्यवस्थित हलवा

कीटकनाशक वापरासंबंधित पाळावयाच्या पद्धती

वापरण्यासाठी निर्देश: वापरण्याची पद्धतः हे फवारणी साठी वापरायचे आहे. किडींच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी एक सारखी फवारणी करावी. फवारणीसाठी नैपसॅक पंप वापरावा. फवारणी द्रावण तयार करणे: शिफारस केलेले प्रमाण एक चतुर्थांश पाण्यात मिसळून फवारणी टाकीत मिसळावे. उरलेले पाणी टाकून सतत मिसळत रहावे. फवारणी करण्यापूर्वी उत्पादन पूर्णपणे पाण्यात मिसळलेले असल्याची खात्री करावी. फवारणीची संख्या: किडींच्या प्रादुर्भावानुसार ७–१४ दिवसांच्या अंतराने २–३ फवारण्या करव्या लागतात.

हवामानस्थिती (सर्वसाधारणपणे): वारा स्थिर व योग्य असेल तेव्हा फवारणी करावी. ३०° सेल्सिअस पेक्षा जास्त तापमानात फवारणी करणे टाळावे.

माती आणि पाणी (जसे लागू असेल तसे): फक्त पानांवरील खत फवारणीसाठी वापरले जाते.

फवारणीसाठी पीक अवस्था : वनस्पती वाढीचा टप्पा

वापरण्याची पद्धत: फवारणीसाठी हॉलो कोन नोझल बसवलेला साधा नॅपसॅक स्प्रेयर वापरता येतो.

उपकरणांचा प्रकार: नॅपसॅक स्प्रेयर

नॉझल प्रकार: हॉलो कोन नॉझल

प्रमाण: तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे

मिश्रणासाठी सूचना :–

पुन्हा प्रवेश कालावधी: फवारणी सुकल्यावर किंवा 48 तास

फवारणी करण्याची पद्धत आणि वेळ: वाऱ्याच्या उलट्या दिशेने फवारणी करू नये.

फवारणी करण्याची वेळ: दुपारच्या वेळी फवारणी करणे टाळा. फवारणीची योग्य वेळ सकाळ आणि संध्याकाळची आहे.

वारंवारता: २–३ फवारण्या

कुठल्याही पिकावर कीटकनाशके लावू नयेत असे टप्पे :–

मधमाश्यांसारख्या फायदेशीर कीटकांचे आणि किटकांचे नैसर्गिक शत्रू यांचे नुकसान टाळण्यासाठी घ्यावयाची खबरदारी: मधमाश्यांच्या दिवसागरातील सक्रिय काळात–खाणे गोळा करण्याच्या कालावधीत फवारणी करू नये

विषबाधाची लक्षणे: प्रमुख्याने क्षोभ, सुस्ती, स्नायूंचे थरथरणे आणि अत्यंत गंभीर परिस्थितीत संभाव्य आचलेक्षप्ती येऊ शकतात. मळमळ, उलट्याए सौम्य, तात्पुरते आरोग्यावर होणारे परिणाम मुख्यतः डोकेदुखी आणि चक्कर येणे, स्पर्शअपवेदन, जठराचे विकार, श्वसन आणि त्वचेच्या चिन्हे आणि लक्षणे.

प्रथमोपचार: जर सेवन केले असेल तर: जर एखादी व्यक्ती जागरूक आणि सतर्क असेल तर पाण्याने तोंड स्वच्छ धुवा आणि १ किंवा २ ग्लास पाणी पिण्यास द्या. बेशुद्ध व्यक्तीला कधीही तोंडाने काही देऊ नका. डॉक्टरांना फोन करा. डॉक्टरांच्या सांगितल्या शिवाय उलट्या करू नकाध्करायला लावू नका.

श्वासावाटे आत घेतल्यास: रुग्णाला ताज्या हवेत घेऊन जा आणि शरीराच्या तापमानाची काळजी घ्या. जर रुग्ण श्वास घेत नसेल किंवा श्वास घेण्यास त्रास होत असेल तर कृत्रिम श्वासोच्छ्वास द्या, डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

त्वचेशी संपर्कात आल्यास: शरीराचा प्रभावित भाग साबणाने आणि केस आणि नखांच्या खाली भरपूर पाण्याने स्वच्छ धुवा. वेदना, लालसरपणा किंवा क्षोभ कायम राहिल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सर्व दूषित कपडे वेगळे करावेत आणि वापरण्यापूर्वी साबण आणि पाण्याने स्वतंत्रपणे स्वच्छ धुवावेत.

डोळ्यांच्या संपर्कात आल्यास: कमीतकमी १५ मिनिटे भरपूर पाण्याने हळूवारपणे धुवा. वेदना, क्षोभ, लालसरपणा किंवा प्रकाशभिरूपणा कायम राहिल्यास नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

प्रतिविष: विशिष्ट प्रतिविष ज्ञात नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा.

फायटोटॉक्सिटी: शिफारस केल्याप्रमाणे वापरल्यास फायटोटॉक्सिक नाही.

साठवणुकीच्या अटी: १. कीटकनाशक असलेले पॅकेजेस इतर वस्तू खास करून अन्नपदार्थ ठेवण्यासाठी असलेल्या खोल्या आणि जागांपासून दूर एका स्वतंत्र खोलीत किंवा जागेत साठवली पाहिजेत किंवा कुलूप किल्ली खाली एका स्वतंत्र कपाटात ठेवली पाहिजेत. २. कीटकनाशक साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा जागा चांगल्या बांधकामाच्या, थंड, कोरड्या, हवेशीर, वाफेपासून दूषीतीकरण टाळण्यासाठी पुरेशा आकारमानाच्या असल्या पाहिजेत.

सुरक्षिततेची खबरदारी : १) श्वासावाटे आत घेण्यास तसेच त्वचा आणि डोळ्यांशी संपर्क टाळा. २) लहान मुलांपासून, अन्नपदार्थ, पशुखाद्य, उष्णता व ज्योत यांच्यापासून दूर ठेवावे, कुलूप व किल्ली खाली थंड व कोरड्या जागी ठेवावे. ३) कीटकनाशके उघड्या हाताने मिसळू नयेत. ४) फवारणी करताना खाणे, पिणे, धूम्रपान करणे किंवा तंबाखू चघळू नये. ५) कीटकनाशकाची फवारणी फक्त वाऱ्याच्या दिशेने करावी, त्याच्या विरुद्ध नाही जेणेकरून शरीरावर उडण्यापासून रोखता येईल. ६) वापरकर्त्याने रबर ग्लोव्हज, बूटसह पूर्ण संरक्षणात्मक कपडे वापरावे. चेहरा फेस शील्ड किंवा डस्ट मास्कने झाकून ठेवावा आणि शरीर एकंदर किंवा रबर ॲप्रन आणि हुड किंवा टोपीने झाकून ठेवावे. ७) खूप कमी प्रमाण असलेला स्प्रे वापरू नका.

सावधगिरीचे निवेदन: १. मधमाशांसाठी हे विषारी आहे, मधमाश्यांच्या आहारकाळात फवारणी करणे टाळावे. २. मासे, जलचर यांना विषारी म्हणून जलस्रोत, जलचर किंवा मत्स्यपालनाजवळ वापरू नये. ३. लेबल आणि पत्रकांवरील लिहिल्याप्रमाणे वापरले पाहिजे इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरू नये. ४. पत्रकावर सांगितल्याप्रमाणे वापरल्यानंतर कंटेनर नष्ट करा. ५. गांडूळ आणि इतर फायदेशीर संधिपाद प्राण्यांसाठी विषारी. ६. पक्ष्यांसाठी विषारी.

वापरलेल्या कंटेनर, उपकरणे आणि अतिरिक्त साहित्य धुतलेले पाणी किंवा द्रव यांची विल्हेवाट लावणे: १. पर्यावरणीय किंवा जलप्रदूषण टाळण्यासाठी पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त साहित्य आणि धुतलेले पाणी किंवा द्रावणे सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावणे हे कीटकनाशकांचे उत्पादक, निर्माते आणि वापर करणाऱ्या लोकांचे कर्तव्य असेल. 2. वापरलेली पॅकेजेस पुन्हा वापरण्यासाठी बाहेर ठेवली जाणार नाहीत. ३. पॅकेजेस तोडून वस्तीपासून दूर पुरली गेली पाहिजेत.

रासायनिक रचना:

फिप्रोनील स.घ.	४.००%भार/भार
ॲसिटामीप्रीड स.घ.	४.००%भार/भार
स्टॅबिलायझर्स:सूर्यफूल तेल	५.००%भार/भार
इमल्सिफायर: मोडीफाइड पॉलीएथोनॉक्सी इथर आणि सल्फेटेड ॲनिऑनिक सरफॅक्टन्ट यांचे मिश्रण	८.००%भार/भार
स्टिकिंग/स्टॅबिलायझिंग एजन्ट: फॉर्मलडिहाइड	०.५० %भार/भार
ॲंटी फोमिंग एजन्ट:सिलीकॉन डिफोमर	०.२० %भार/भार
विद्रावक: पाणी	पुरेशा प्रमाणात%
एकूण	**१००.००० %भार/भार**

" रिकामे कंटेनर पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे."

उत्पादन कर्ता आणि विक्रेता: **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**
नोंदणीकृत कार्यालय: ४८, हिल रोड, वांद्रे (प.), मुंबई–४०००५०. भारत.
फॅक्टरी : इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, फेज २, साम्बा, जम्मू–कश्मिर – १८४१२१.

રંગીલા

ફિપ્રોનિલ ૪% + એસેટેમિપ્રિડ ૪% વ/વ એસ.સી.
(કીટકનાશક)

વાપરતાં પહેલાં પત્રિકા વાંચો.

ફિપ્રોનિલ ૪% + એસેટેમિપ્રિડ ૪% (વ/વ એસસી) એક નવયુગીન ફિનાઈલપાયરાઝોલયુક્ત ફિપ્રોનિલ અને નીઓનિકોટિનોઈડનું સંયોજન છે. એસેટેમિપ્રિડ, જે કપાસના પાકમાં વિભિન્ન ચૂસીયા કીટકોને નિયંત્રિત કરવામાં ઉત્કૃષ્ટ સહક્રિયા લાવે છે, તે કીટકોને સંસર્ગ દ્વારા, પેટમાં જઈને, સર્વાંગી ક્રિયાશીલતા તથા ટ્રાન્સલૅમિનાર અસર દ્વારા ખતમ કરે છે.

ભલામણ :

પાક(કો)	કીટકોનાં સામાન્ય નામ	માત્રા/હેક્ટર		મિશ્રણ માટે પાણી (લીટર)	છેલ્લા છંટકાવથી લણણી સુધીનો પ્રતીક્ષા સમય (દિવસોમાં)
		સ.ઘ. (ગ્રામ)	ફોર્મ્યુલેશન (ગ્રામ)		
કપાસ	મલોમશી, તડતડિયાં અને સફેદ માખી	૪૦+૪૦	૧૦૦૦	૫૦૦	૩૦

વપરાશ પહેલાં બાટલીને યોગ્ય રીતે હલાવો.

કીટકનાશક વપરાશની તકનીકો સંબંધિત સારી પદ્ધતિઓ

વપરાશ સંબંધિત માર્ગદર્શન: ઉપયોગની પદ્ધતિ: તે પર્ણસમૂહ-સ્પ્રે (સીધા પાંદડા પર) તરીકે લાગુ પાડવી જોઈએ. જીવાતોના અસરકારક નિયંત્રણ માટે સમાન કવરેજ જરૂરી છે. છંટકાવ માટે સરળ નેપસેક સ્પ્રેયરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. સ્પ્રે સોલ્યુશનની તૈયારી: ભલામણ કરેલ માત્રાને એક ચતુર્થાંશ પાણીમાં મિશ્રણ સાથે સ્પ્રે ટાંકીમાં ભેળવી દો. સતત મિશ્રણ સાથે બાકીનું પાણી ઉમેરો. સ્પ્રે સોલ્યુશનનો છંટકાવ કરતા પહેલા, ઉત્પાદનને પાણીમાં સંપૂર્ણ વિખેરી નાખવાની ખાતરી કરો. છંટકાવ કરતી વખતે મિશ્રણ કરવાનું રાખો. ઉપયોગની સંખ્યા: જંતુના ઉપદ્રવના આધારે, 7-14 દિવસના અંતરાલ પર 2-3 સ્પ્રે જરૂરી છે.

હવામાનની સ્થિતિ (સામાન્ય રીતે): જ્યારે પવન સ્થિર અને આદર્શ હોય ત્યારે સ્પ્રે કરો. ૩૦ ડિગ્રી સેલ્સિયસથી વધુ તાપમાનમાં છંટકાવ કરવાનું ટાળો.

માટી અને પાણી (જ્યાં પણ લાગુ હોય): માત્ર વનસ્પતિઓ પર વપરાશ તરીકે ઉપયોગ થાય છે.

અરજી માટે પાકનો તબક્કો: વનસ્પતિ વૃદ્ધિનો તબક્કો

વપરાશની તકનીક: હોલોકોન ટાઈપ નોઝલ સાથે ફીટ કરેલ એક સરળ નેપસેક સ્પ્રેયરનો ઉપયોગ છંટકાવ માટે કરી શકાય છે.

સાધનોનો પ્રકાર: નેપસેક સ્પ્રેયર

નોઝલ પ્રકાર : હોલોકોન નોઝલ

માત્રા: કોષ્ટકમાં જણાવ્યા મુજબ

મિશ્રણ માટે સૂચના:–

ફરીથી પ્રવેશનો સમયગાળો: સ્પ્રે સુકાઈ જાય અથવા ૪૮ કલાક

અરજી કરવાની રીત અને સમય: પવન સામે છંટકાવ કરશો નહીં.

અરજીનો સમય: બપોરના કલાકોમાં અરજી કરવાનું ટાળો. અરજી કરવા માટેનો આદર્શ સમય સવાર અને સાંજનો છે.

આવર્તન: ૨–૩ સ્પ્રે

તબક્કા કે જે દરમિયાન કોઈપણ પાક પર જંતુનાશકો લાગુ ન કરવા જોઈએ:–

લાભદાયી જંતુઓ જેમ કે મધમાખીઓ અને જીવાતોના કુદરતી દુશ્મનોને નુકસાન ન **થાય તે માટે સાવચેતી રાખવી:** દિવસે મધમાખી–ચારાના સક્રિય સમયગાળા દરમિયાન છંટકાવ કરશો નહીં

ઝેરના લક્ષણો: મુખ્યત્વે ચીડિયાપણું, સુસ્તી, સ્નાયુઓમાં ધ્રુજારી અને અતિશય ભયાનક કિસ્સામાં સંભવતઃ આંચકી આવી શકે છે. ઉબકા, ઉલટી તેમજ કામચલાઉ સ્વાસ્થ્ય અસરો મોટે ભાગે માથાનો દુખાવો અને ચક્કર, પેરેસ્થેસિયા, ગેસ્ટ્રોઈન્સ્ટેન્શિયલ , શ્વસન અને ત્વચા પર ચિહ્નો જેવા લક્ષણો.

પ્રાથમિક સારવાર: જો પીવામાં આવે તો: જો વ્યક્તિ સભાન અને સચેત હોય, તો પાણીથી મોં ધોઈ નાખો અને પીવા માટે ૧ કે ૨ ગ્લાસ પાણી આપો. બેભાન વ્યક્તિને ક્યારેય મોઢેથી કંઈ ન આપો. ડૉક્ટરને બોલાવો. હાજર ડોક્ટર દ્વારા કેહવામાં નાં આવે ત્યાં સુધી ઉલ્ટી માટે પ્રેરિત કરશો નહીં.

જો શ્વાસ દ્વારા લેવામાં આવેલ હોય: દર્દીને તાજી હવામાં લઈ જાઓ અને શરીરના તાપમાનનું ધ્યાન રાખો. જો દર્દીને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ ન પડી રહી હોય અથવા શ્વાસ લેવામાં તકલીફ હોય તો કૃત્રિમ શ્વાસોચ્છવાસ આપો, ડૉક્ટરની સલાહ લો.

ત્વચાના સંપર્કના કિસ્સામાં: શરીરના અસરગ્રસ્ત ભાગને સાબુ અને પુષ્કળ પાણીથી વાળ અને નખની નીચે સારી રીતે ધોઈ લો. જો દુખાવો, લાલાશ અથવા બળતરા ચાલુ રહે, તો ડૉક્ટરની સલાહ લો. બધા દૂષિત કપડાંને અલગ–અલગ રાખવા જોઈએ અને ઉપયોગ કરતા પહેલા સાબુ અને પાણીથી અલગથી સારી રીતે ધોવા જોઈએ.

આંખના સંપર્કના કિસ્સામાં: ઓછામાં ઓછા ૧૫ મિનિટ માટે પુષ્કળ પાણીથી હળવા હાથે કોગળા કરો. જો પીડા, બળતરા, લાલાશ અથવા ફોટોફોબિયા ચાલુ રહે છે. આંખના નિષ્ણાતની સલાહ લો.

ઝેરનું મારણ: ઝેરનું કોઈ ચોક્કસ મારણ નથી, લક્ષણો અનુસાર સારવાર કરો.

ફાયટોટોક્સિટી : જ્યારે ભલામણ મુજબ ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે નોન–ફાયટોટોક્સિક હોય.

સંગ્રહ કરવાની શરતો: ૧ કીટકનાશક ધરાવતાં પેકેજને અન્ય ચીજવસ્તુઓ રાખવાની જગ્યાઓ અથવા ઓરડાઓથી દુર અલગ જ જગ્યાઓ અથવા ઓરડામાં અથવા મટીરીયલનાં જથ્થા અને પ્રકાર અનુસાર અલગ જ કબાટમાં તાળુંચાવી વાસીને રાખવા. બાળકોની પહોંચ થી દુર રાખો. ૨ સંગ્રહ કરવાની જગ્યા કે ઓરડો મજબુત, સુકો, હવાઉજાસવાળો અને પૂરતો મોકળો હોવો જોઈએ. સંગ્રહ કરવાની જગ્યા સુકી અને ઠંડી હોવી જોઈએ.

સલામતી સાવચેતી: ૧) ઈન્હેલેશન તેમજ ત્વચા અને આંખો સાથે સંપર્ક ટાળો. ૨) બાળકો, ખાદ્ય સામગ્રી, પશુ આહાર, ગરમી અને પ્રકાશથી દૂર રાખો, તાળુંચાવી વાસીને ઠંડી અને સૂકી જગ્યાએ સ્ટોર કરો. ૩) ખુલ્લા હાથે કીટકનાશકોનું મિશ્રણ કરશો નહીં. ૪) સ્પ્રે કરતી વખતે ખાવું, પીવું, ધૂમ્રપાન કરવું અથવા તમાકુ ખાવું નહીં.

૫) કીટકનાશકનો માત્ર પવન ફૂંકાય તે દિશામાં જ છંટકાવ કરો અને તેની સામે નહીં જેથી શરીર પર ડ્રિફ્ટ સેટિંગ અટકાવી શકાય. ૬) વપરાશકર્તાએ રબરના મોજા, બૂટ સાથે સંપૂર્ણ રક્ષણાત્મક કપડાંનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ચહેરો ફેસ શિલ્ડ અથવા ડસ્ટ માસ્કથી ઢંકાયેલો હોવો જોઈએ અને શરીરને ઓવરઓલ અથવા રબરના એપ્રોન અને હૂડ અથવા ટોપીથી ઢાંકવું જોઈએ. ૭) અલ્ટ્રા–લો વોલ્યુમ સ્પ્રે તરીકે ઉપયોગ કરશો નહીં .

સાવચેતીભર્યું નિવેદન: ૧. તે મધમાખીઓ માટે ઝેરી છે. મધમાખીઓના ઘાસચારાના સમયગાળા દરમિયાન સ્પ્રેનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ. ૨. માછલી માટે ઝેરી, જળચર જીવો તેથી જળાશયો, જળચરઉછેર અથવા મત્સ્યઉછેરની નજીક ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ. ૩. લેબલ અને પત્રિકાઓ પર સબ્સ્ક્રાઇબ કરેલ હોય તે સિવાયના અન્ય કોઈ હેતુ માટે ઉપયોગ ન કરવો. ૪. પત્રિકા પરના નિર્દેશ મુજબ ઉપયોગ કર્યા પછી કન્ટેનરનો નાશ કરો. ૫. અળસિયા અને અન્ય ફાયદાકારક આર્થ્રોપોડ્સ માટે ઝેરી. ૬. પક્ષીઓ માટે ઝેરી.

વપરાયેલ કન્ટેનરનો નિકાલ, સાધનોમાંથી ધોવા અને વધારાની સામગ્રી: ૧ પર્યાવરણીય અથવા જળ પ્રદૂષણ થતું અટકાવવા માટે પેકેજો અથવા વધારાની સામગ્રી ને ધોઈને સુરક્ષિત રીતે નિકાલ કરવો તે ઉત્પાદકો, કીટકનાશકોના ફોર્મ્યુલેટર અને સંચાલકોની ફરજ રહેશે. ૨ વપરાયેલ પેકેજો તેમના પુનઃઉપયોગને રોકવા માટે બહાર છોડવા નહીં.૩. પેકેજોને તોડીને વસવાટથી દૂર દફનાવવામાં આવે.

રાસાયણિક સંયોજન :

ફિપ્રોનિલ સ. ઘ.	૪.00% વ/વ
એસેટેમિપ્રિડ સ.ઘ.	૪.00% વ/વ
સ્ટેબિલાઈઝર : સુરજમુખી તેલ	૫.00% વ/વ
ઇમલ્સિફાયર : મોડિફાઇડ પોલીઇથોનોક્સી ઇથર અને સલ્ફેટેડ અનઆયોનિક સર્ફેક્ટન્ટ્સનું મિશ્રણ	૮.00% વ/વ
સ્ટિકિંગ/સ્ટેબિલાઈઝિંગ એજન્ટ: ફોર્મલડીહાઇડ	0.૫0% વ/વ
એન્ટિ ફોમિંગ એજન્ટ : સિલિકોન ડીફોમર	0.૨0% વ/વ
સોલ્વન્ટ : પાણી	ક્યુએસ. %
કુલ	**૧00.000% વ/વ**

''ખાલી ડબ્બા ફરીથી ઉપયોગ કરવાનું ખતરનાક છે.''

ઉત્પાદક અને વેચાણકર્તા: **ઘરડા કેમિકલ્સ લિમિટેડ**
રજિ. ઑફિસ: 48, હિલ રોડ, બાંદ્રા (પ), મુંબઈ – 400 050/ ભારત.
ફેક્ટરી: ઈન્ડસ્ટ્રિયલ ગ્રોથ સેન્ટર, ફેઝ-૨, સાંબા, (જમ્મુ-કાશ્મીર) - ૧૮૪૧૨૧.

ਰੰਗੀਲਾ

ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ ੪% + ਐਸੀਟਾਮੀਪ੍ਰਿਡ ੪% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ ਐਸ. ਸੀ.
(ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।

ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ ੪% - ਐਸੀਟਾਮੀਪ੍ਰਿਡ ੪% ਐਸ ਸੀ (ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਸੀ) ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਮਾਨੇ ਦੇ ਫ਼ਿਨਾਇਲਪਾਇਰਾਜ਼ੋਲ ਯੁਕਤ ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ ਅਤੇ ਨਿਓਨੀਕੋਟੀਨਾਇਡ ਯੁਕਤ ਐਸੀਟਾਮੀਪ੍ਰਿਡ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ, ਨਿਗਲਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤੇ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ:

ਫਸਲ	ਕੀਟ ਦਾ ਆਮ ਨਾਂ	ਮਾਤ੍ਰਾ/ ਹੈਕਟੇਅਰ		ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲਿ.)	ਅੰਤਿਮ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਫਾ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)
		ਏ.ਆਈ. (ਗ੍ਰਾ.)	ਸੂਤਰੀਕਰਣ (ਮਿ.ਲੀ.)		
ਕਪਾਹ	ਚੇਪਾ, ਤੇਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ	੪੦+੪੦	੧,੦੦੦	੫੦੦	੩੦

ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਤਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ: ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ (ਸਿੱਧਾ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀੜੇ–ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਵਰੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪਰੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪਰੇਅ ਘੋਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। ਸਪਰੇਅ ਘੋਲ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 7–14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ 2–3 ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੌਸਮ ਦੀ ਹਾਲਤ (ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ): ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਰੁਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। 30°C ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ।

ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ (ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ): ਸਿਰਫ ਪੱਤੇ ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਫਸਲ ਪੜਾਅ: ਵਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੜਾਅ

ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ: ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਹਾਲੋਂ ਕੋਣ ਵਾਲੇ ਨੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਕਿਸਮ: ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ

ਨੋਜ਼ਲ ਕਿਸਮ: ਹੋਲੋ ਕੋਨ ਨੋਜ਼ਲ

ਮਾਤਰਾ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰਨ ਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼:–

ਮੁੜ–ਦਾਖਲਾ ਮਿਆਦ: ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 48 ਘੰਟੇ

ਛਿੜਕਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਹਵਾ ਦੇ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ।

ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਗਾਉ। ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ: 2–3 ਸਪਰੇਅ

ਉਹ ਪੜਾਅ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ:–

ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀੜਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਟ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: ਦਿਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ ਜੱਦ ਮਧੂ–ਮੱਖੀਆਂ ਚਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ

ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੜਚਿੜੇਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਤੀ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੰਬਣੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੜਵੱਲ/ਦੌਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਹਲਕੇ ਅਸਥਾਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਪੈਰੇਥੀਸੀਆ, ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ, ਸਾਹ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਲੱਛਣ।

ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਪਾਅ: ਜੇਕਰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ 1 ਜਾਂ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉ।

ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੇ: ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਸਾਹ ਦਿਓ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ: ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਜੇਕਰ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਜਲਣ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਉ। ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ: ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੋ। ਜੇ ਦਰਦ, ਜਲਣ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਫੋਟੋਫੋਬੀਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ: ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ, ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਥੈਰੇਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੌਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਨ: ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭੰਡਾਰਣ ਸ਼ਰਤਾਂ: 1. ਜਿਹੜੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸਾਮਗ੍ਰੀ, ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਵਰੂਪ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੰਦਰਾ ਚਾਬੀ ਲਾਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। 2. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰਣ, ਸੁੱਕੇ, ਠੰਡੇ ਰੋਸ਼ਨੀਦਾਰ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਾਇਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਭਾਫ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: 1) ਸਾਹ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ। 2) ਬੱਚਿਆਂ, ਖਾਣ–ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਜੰਦਰੇ ਅਤੇ ਚਾਬੀ ਲਗਾ ਕੇ ਠੰਡੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰੋ। 3) ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਾਓ। 4) ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਪੀਓ, ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੰਬਾਕੂ ਚਬਾਓ। 5) ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਾ ਜੋ ਬੂੰਦਾਂ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਨਾ ਪੈਣ। 6) ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਰਬੜ ਦੇ ਐਪਰਨ ਅਤੇ ਟੋਪੀ ਜਾਂ ਹੈਟ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 7) ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਵਰਤੋ।

ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ: 1. ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ, ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2. ਮੱਛੀਆਂ, ਜਲ–ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਲ–ਸਥਾਨਾਂ, ਜਲ–ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 3. ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਪਰਚੇ 'ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 4. ਪਰਚੇ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। 5. ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੀਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ। 6.ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ।

ਵਰਤੇ ਗਏ ਪੈਕੇਜ, ਵਾਧੂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਧੋਣ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: 1. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਫਾਰਮੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਕੇਜਾਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 2. ਵਰਤੇ ਗਏ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 3. ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਰਸਾਇਣਕ ਮਿਸ਼ਰਨ :

ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ ਏ.ਆਈ.	4.00 % ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਐਸੀਟਾਮੀਪ੍ਰਿਡ ਏ.ਆਈ.	4.00 % ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਸਟੈਬਿਲਾਇਜ਼ਰ : ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ	5.00 % ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਐਮਲਸੀਫਾਇਰ : ਬਲੈਂਡ ਆਫ ਮੌਡੀਫਾਇਡ ਪੋਲੀਏਥਾਨੋਕਸੀ ਈਥਰ ਅਤੇ ਸਲਫੇਟੇਡ ਐਨੀਆੱਨਿਕ ਸਰਫੈਕਟੇਂਟ ਦਾ ਘੋਲ	8.00 % ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਚਿਪਕਾਣ ਵਾਲਾ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਤ : ਫੋਰਮਲਡੀਹਾਇਡ	0.50% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਐਂਟੀ ਫੌਗਿੰਗ ਏਜੰਟ : ਸਿਲਿਕੌਨ ਡੀਫੌਮਰ	0.20% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਸੌਲਵੇਂਟ : ਪਾਣੀ	ਕਿਊ.ਐਸ. % ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ
ਕੁਲ	**100.000% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ**

''ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।''

ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ: **ਘਰਡਾ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿ.,**
ਰਜਿ. ਆਫਿਸ : 48 ਹਿੱਲ ਰੋਡ, ਬਾਂਦਰਾ (ਪੱ.), ਮੁੰਬਈ - 400050, ਭਾਰਤ
ਫੈਕਟਰੀ : ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਗ੍ਰੋਥ ਸੈਂਟਰ, ਫੇਜ਼ II, ਸਾਂਬਾ, (ਜੰਮੂ – ਕਸ਼ਮੀਰ) . 184121

RANGEELA®

DIRECTION FOR USE

FOR AGRICULTURAL USE
कृषि उपयोग के लिए

Read Leaflet Before Use
इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

RANGEELA®

Fipronil 4% + Acetamiprid 4% w/w SC
(Insecticide)

रंगीला

फिप्रोनिल ४% + एसीटामिप्रिड ४% भार/भार एस.सी.
(कीटनाशक)

Manufactured & Marketed by:
GHARDA CHEMICALS LIMITED
Regd. Office: Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400050. INDIA.

For any complaints, contact Customer Care Executive at Gharda Chemicals Limited, Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400050. INDIA
Tel.: 022 66265998 / 66265999
Email: consumercare@gharda.com
Website: www.gharda.com

® Registered Trademark of Gharda Chemicals Limited

J.02.25-01
JPP024

Tamil	Telugu	Kannada	Malayalam		Urdu

ரங்கீலா

ஃபிப்ரோனில் 4% + அசிடாமிப்ரிட் 4% எ/எ எஸ்சி

(பூச்சிக்கொல்லி)

உபயோகிப்பதற்கு ன்பு சிற்றேட்டை படிக்கவும்.

ஃபிப்ரோனில் 4% + அசிடாமிப்ரிட் 4% (எ/எ எஸ்சி) ஒரு புதிய தலைமுறை ஃபினைல்பைரஸோல் கூட்டுப்பொருளின் ஒரு கலவை. ஃபிப்ரோனில் மற்றும் ஒரு நியோனிகோடினாய்டு, அசிடாமிப்ரிட் இணைந்து பருத்திப் பயிரில் பற்பல சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளின் சிக்கல்களைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. இது பூச்சிகளை தொடு நஞ்சாக, உட்கொள்ளல், ஊடுருவிச் சென்று செயல்புரிகிறது அதேபோல் இலைத் தெளிப்பாக ஆற்றல் வாய்ந்தது.

பரிந்துரைகள்

பயிர்(கள்)	பூச்சியின் பொதுப் பெயர்	அளவு / ஹெ		நீரில் அளவு (லிட்)	கடைசி தெளிப்பிலிருந்து அறுவடைக்கு இடையே காத்திருக்கும் காலம் (நாட்கள்)
		தீ.மூ. (கிராம்)	கலவை (மிலி)		
பருத்தி	அசுவணி, தத்துப் பூச்சி, மற்றும் வெள்ளை ஈ	40+40	1000	500	30

பயன்படுத்தும் முன்னர் பாட்டிலை நன்றாகக் குலுக்கவும்

பூச்சிக்கொல்லி பயன்பாட்டு நுட்பங்கள் தொடர்பான மேம்பட்ட சிறந்த நடைமுறைகள்

பயன்படுத்தும் விதம்: பயன்படுத்தும் முறை: இது இலைகள் மீது தெளிக்கப்பட வேண்டும் ...

பயன்படுத்திய காலி கொள்கலன்கள், உபகரணங்களை கழுவிய நீர் மற்றும் எஞ்சிய மீதிப்பொருட்கள் ஆகியவற்றை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்துதல்: 1. சுற்றுச்சூழல் அல்லது நீர் மாசுபடுவதைத் தடுக்கும் வகையில் காலி பொட்டலங்கள் அல்லது எஞ்சிய மீதிப்பொருட்கள் மற்றும் தெளித்தபின் உபகரணங்கள் மற்றும் பிற உபகரணங்களை கழுவிய நீர் ஆகியவற்றை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்துவது உற்பத்தியாளர்கள், பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை உருவாக்கியவர்கள் மற்றும் தெளிப்பவர்களின் கடமையாகும். 2. காலியான மருந்து பொட்டலங்களை மீண்டும் பயன்படுத்தாமல் தடுக்க அவை அழிக்கப்படாமல் அப்படியே வெளியில் போடுவிடக்கூடாது. 3. காலியான மருந்து பொட்டலங்களை உடைத்து குடியிருப்புகளுக்குச் சற்று தள்ளி ஆழமாகத் தோண்டி புதைக்க வேண்டும்.

இரசாயனக்கலவை :

ஃபிப்ரோனில் தீ.மூ	4.00% எ/எ
அசிடாமிப்ரிட் தீ.மூ.	4.00% எ/எ
ஸ்டெபிலைஸர்ஸ்: சூரியகாந்தி எண்ணெய்	5.00% எ/எ
எமல்ஸிஃபையர்: பிளெண்ட் ஆஃப் மாடிஃபைடு அயானிக் சர்ஃபேக்டன்ட்	8.00% எ/எ
ஸ்டிக்கிங்/ஸ்டெபிலைஸிங் ஏஜெண்ட்: ஃபார்மால்டிஹைடு	0.50% எ/எ
ஆன்ட்டி ஃபோமிங் ஏஜென்ட்: சிலிகான் டிஃபோமர்	0.20% எ/எ
சால்வென்ட் : தண்ணீர்	தே.அ
மொத்தம்	100.000% எ/எ

''வெற்று கொள்கலனை பயன்படுத்துவது அபாயகரமனாது''

உற்பத்தியாளர் மற்றும் வர்த்தகம் செய்வோர் : **கர்டா கெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட்**
பதிவு அலுவலகம் : 48, ஹில் ரோடு, டாந்திரா (மே), மும்பை 400050, இந்தியா.
ஃபேக்டரி: இண்டஸ்ட்ரியல் குரோத் சென்டர், பேஸ் ஐஐ, சம்பா, (ஜே அண்ட் கே) - 184121.

రంగీలా

ఫిప్రోనిల్ 4% + అసెటామిప్రిడ్ 4% బ/బ ఎస్.సి.

(కీటకనాశని)

ఉపయోగించడానికి ముందు కరపత్రం చదవండి.

ఫిప్రొనిల్ 4.0% అసెటామిప్రిడ్ 4.0% (బ/బ ఎస్.సి) అనేది ఫిప్రొనిల్ మరియు నియోనికోటినాయిడ్ యొక్క నవ తరం ఫెనైల్‌పైరజోల్ కాంపౌండ్‌యొక్క సమ్మేళనం. ఇది ప్రత్తి పంటలో వివిధరకాలరసం పీల్చు పురుగులను నియంత్రించడంలోస్పర్శ, ఉదర, అంతర్‌ప్రవాహిక చర్యమరియు ట్రాన్స్‌లామినార్ ప్రభావం చూపుతుంది.

ఉపయోగించుట:

పంట(లు)	కీటకం మామూలు పేరు	మోతాదు/హెక్టారుకు		కలపవలసిన నీళ్ళు (లీటర్లు)	ఆఖరి పిచికారి నుంచి పంట కోసేంత వరకు వేచివుండవలసిన కాలం (రోజుల్లో)
		ఎ.ఐ. (గ్రాములు)	ఫార్ములేషన్ (మి.లీ)		
ప్రత్తి	పేనుబంక, పచ్చదోమ మరియు తెల్లదోమ	40+40	1000	500	30

ఉపయోగం ముందు బాగా కదలటం

కీటకనాశిని ఉపయోగించే టెక్నిక్స్ కు సంబంధించి మంచి పద్ధతులు

వినియోగానికి సూచన: వాడే విధానం: దీనిని ఆకులపై పిచికారి చేయాలి. కీటకాలను సమర్థవంతంగా ...

ఉపయోగించిన డబ్బాలు, ఉపకరణాలను కడిగిన నీళ్ళు మరియు మిగులు పదార్థాల విసర్జన: 1. పర్యావరణం లేదా నీటి కాలుష్యాన్ని నివారించుటకు ప్యాకేజీలు లేదా మిగులు పదార్థాలు మరియు కడిగిన నీళ్ళను సురక్షితంగా విసర్జించడము తయారీదారులు, ఫార్ములేటర్ల బాధ్యత అవుతుంది. 2. ఉపయోగించబడిన డబ్బాలు తిరిగి ఉపయోగించబడకుండా బయట వదిలిపెట్టకూడదు. 3. ప్యాకేజీలను విరగ్గొట్టి నివాస స్థలాలకు దూరంగా పూడ్చిపెట్టాలి.

రసాయనిక మిశ్రమం:

ఫిప్రొనిల్ ఎ.ఐ.	4.00% బ/బ
అసెటామిప్రైడ్ ఎ.ఐ.	4.00% బ/బ
స్టెబిలైజర్లు: పొద్దుతిరుగుడు నూనె	5.00% బ/బ
ఎమల్సిఫైయర్: సవరించిన పాలిఎథనోక్సి ఇథర్ మరియు సల్ఫేటెడ్ అనియానిక్ సర్ఫాక్టెంట్	8.00% బ/బ
స్టికింగ్/స్టెబిలైజింగ్ ఏజెంట్: ఫార్మల్‌డిహైడ్	0.50% బ/బ
యాంటీ ఫోమింగ్ ఏజెంట్: సిలికాన్ డీఫోమర్	0.20 % బ/బ
సాల్వెంట్: నీళ్ళు	కావలసినంత %
మొత్తం:	100.000% బ/బ

''ఖాళీ డబ్బాలని తిరిగి ఉపయోగించడం ప్రమాదం''

తయారీ మరియు మార్కెటింగ్ చేయువారు : ఘర్‌డా కెమికల్స్ లిమిటెడ్
రిజిస్టర్డు కార్యాలయం: 18, హిల్ రోడ్డు, బాంద్రా (వెస్ట్), ముంబయి– 400 050, ఇండియా.
కర్మాగారం: ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ సెంటర్, ఫేజ్ ఐఐ, సాంబ, (జమ్మూ–కాశ్మీర్) - 184 121.

ರಂಗೀಲಾ

ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 4% + ಎಸಿಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ 4% ತೂ/ತೂ ಎಸ್‌ಸಿ

(ಕ್ರೀಮಿನಾಶಕ)

ಬಳಸುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿರಿ.

ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 4.0% + ಎಸಿಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ 4.0% ಎಸ್‌ಸಿ (ತೂ/ತೂ) ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಫಿನೈಲ್‌ಪಿರಜೋಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ ಮತ್ತು ನಿಯೊನಿಕೊಟಿನಾಯಿಡ್‌ದ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಎಸಿಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ ಇದು ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ, ಸೇವನೆ, ಅಂತಪ್ರವಾಹಿ ಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಲಮಿನರ್ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಸಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸ್ಸು:

ಬೆಳೆ(ಗಳು)	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಮಾಣ/ಪ್ರ. ಹೆ		ನೀರಿನಲ್ಲಿ (ಲೀ.)	ಹಿಂದಿನ ಸ್ಪ್ರೇದಿಂದ ಕಟಾವುವರೆಗಿನ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
		ಸ.ಫ. (ಗ್ರಾಂ)	ದ್ರಾವಣ (ಮಿಲಿ)		
ಹತ್ತಿ	ಗಿಡಹೇನು, ಜಿಗಿಹುಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ನೊಣ	40+40	1000	500	30

ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಬಾಟಲ್‌ನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲುಗಾಡಿಸಿ

ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಸುವ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ: ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ: ಇದನ್ನು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ (ನೇರವಾಗಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ) ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ...

ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನೀರಿನ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ಪಾದಕರು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರು–ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು.

ರಸಾಯನಿಕ ಘಟಕಾಂಶಗಳು:

ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ ಸ.ಫ.	4.00% ತೂ/ತೂ
ಎಸಿಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ ಸ.ಫ.	4.00% ತೂ/ತೂ
ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಲೈಜರ್: ಸನ್‌ಫ್ಲಾವರ್ ಆಯಿಲ್	5.00% ತೂ/ತೂ
ಇಮಲ್ಸಿಫೈಯರ್: ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ಮೊಡಿಫೈಡ್ ಪಾಲಿಯಿಥನಾಕ್ಸಿ ಇಥರ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫೇಟೆಡ್ ಆನಿಯೊನಿಕ್ ಸರ್ಫಕ್ಟಂಟ್	8.00% ತೂ/ತೂ
ಸ್ಟಿಕಿಂಗ್/ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಲೈಜಿಂಗ್ ಎಜೆಂಟ್: ಫರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್	0.50% ತೂ/ತೂ
ಆ್ಯಂಟಿ ಫೋಮಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೀಫೋಮರ್	0.20% ತೂ/ತೂ
ಸಾಲ್ವೆಂಟ್: ನೀರು	ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆತಕ್ಕಷ್ಟು
ಒಟ್ಟು	100.000% ತೂ/ತೂ

''ಬರಿದಾದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳನ್ನು ಪುನ : ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.''

ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರು: **ಘರ್ಡಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್**
ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿ: 48 ಹಿಲ್ ರೋಡ್, ಬಾಂದ್ರಾ (ಪ), ಮುಂಬಯಿ – 400 050.
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗ್ರೋಥ್ ಸೆಂಟರ್, ಫೇಜ್ 2, ಸಾಂಬಾ, ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮಿರ್ - 184121

രംഗീല

ഫിപ്രോനിൽ 4% +അസെറ്റാമിപ്രിഡ് 4% ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു എസ്‌സി

(കീടനാശിനി)

ഉപയോഗത്തിനു മുമ്പ് ലഘുലേഖ വായിക്കുക

ഫിപ്രോനിൽ 4.0% +അസെറ്റാമിപ്രിഡ് 4% (ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു എസ്‌സി) ന്യൂ ജനറേഷൻ ഫിനൈൽ പിറസോൾ സംയുക്തമായ ഫിപ്രോനിലിന്റെയും നിയോനിക്കോട്ടിനോയിഡിന്റെയും ഒരു മിശ്രണമാണ്. പരുത്തി കൃഷിയിലെ നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന വിവിധ കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ മികച്ച ഒരെണ്ണമായ കോമ്പിനേഷൻ ഒരു കീടനാശിനിയാണ് അസെറ്റാമിപ്രിഡ്. ഇത് സ്പർശനത്തിലൂടെയും ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചും അന്തർ വ്യാപന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും ട്രാൻസ്‌ലാമിനാർ പ്രഭാവത്തിലൂടെയും കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു.

ശുപാർശകൾ

വിള	കീടത്തിന്റെ സാധാരണ പേര്	ഡോസേജ്/ ഹെക്ടർ		വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിക്കൽ (ലി)	അവസാന തളിക്കും വിളയെടുപ്പിനുമിടയിലെ കാത്തിരിപ്പ് കാലയളവ്
		എ.ഐ (ഗ്രാം)	ഫോർമുലേഷൻ (മില്ലി)		
പരുത്തി	മുഞ്ഞ, ചാഴി, വെള്ള ഈച്ച	40+40	1000	500	30

ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബോട്ടിൽ നന്നായി കുലുക്കുക

കീടനാശിനി പ്രയോഗ രീതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല സമ്പ്രദായങ്ങൾ

ഉപയോഗത്തിന്റെ ദിശ: ഉപയോഗ രീതി: ഇത് ഇലകളിൽ സ്പ്രേ ആയി പ്രയോഗിക്കണം. ...

ഉപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യൽ, ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കഴുകൽ, മിച്ച വസ്തുക്കൾ: 1. പാരിസ്ഥിതികമോ ജലപരമോ ആയ മലിനീകരണം തടയുന്നതിന് പാക്കേജുകളോ മിച്ച വസ്തുക്കളോ കഴുകലുകളോ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ സംസ്കരിക്കേണ്ടത് നിർമ്മാതാക്കൾ, കീടനാശിനികളുടെ ഫോർമുലേറ്റർമാർ, ഓപ്പറേറ്റർമാർ എന്നിവരുടെ കടമയായിരിക്കണം. 2. ഉപയോഗിച്ച പാക്കേജുകൾ അവയുടെ പുനരുപയോഗം തടയുന്നതിന് പുറത്ത് വിടരുത്. 3. പാക്കേജുകൾ തകർത്ത് വാസസ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുഴിച്ചിടണം.

രാസഘടന :

ഫിപ്രോനിൽ എ. ഐ	4.00% ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു
അസെറ്റാമിപ്രിഡ് എ. ഐ	4.00% ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു
സ്റ്റെബിലൈസർ : സൂര്യകാന്തി എണ്ണ	5.00% ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു
പോളിഎതനോക്സിൽ ഈതറിന്റെയും സൾഫേറ്റഡ് അനൊയോണിക് സർഫക്ടിന്റെയും മിശ്രണം	8.00% ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു
സ്റ്റിക്കിംഗ്/സ്റ്റെബിലൈസിംഗ് ഏജന്റ് ഫോർമാൽഡിഹൈഡ്	0.50% ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു
ആന്റി ഫോമിംഗ് ഏജന്റ്: സിലിക്കോൺ ഡിഫോമർ	0.20% ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു
സോൾവന്റ്: വെള്ളം	ക്യൂ. എസ്%
മൊത്തം	100.000 % ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു

''ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപത്കരമാണ്''

ഉൽപാദനവും വിപണനവും : **ഗർഡ കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ്,**
രജി. ഓഫീസ്: 48, ഹിൽ റോഡ്, ബാന്ദ്ര (വെ) മുംബൈ 400050, ഇന്ത്യ
ഫാക്ടറി: ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് സെന്റർ, ഫേസ് 2, സാംബ, (ജെ ആൻഡ് കെ)-184121

রঙ্গেলা

ফিপ্রোনিল 4% + এসিটামিপ্রিড 4% ডাব্লু/ডাব্লু এসসি

(কীটনাশক)

ব্যবহারের পূর্বে লিফলেট পড়ে নিন।

ফিপ্রোনিল ৪.০% । এসিটামিপ্রিড ৪.০% (ডাব্লু/ডাব্লু) এসসি একটি নতুন প্রজন্মের ফেনাইলপাইরাজোল যৌগ, ফিপ্রোনিল এবং একটি নিউওনিকোটিনয়েড, এসিটামিপ্রিডের সংমিশ্রণ যা সুতির ফসলের বিভিন্ন চোষক কীটপতঙ্গকে নিয়ন্ত্রণে দুর্দান্ত সমন্বয় নিয়ে আসে। এটি যোগাযোগ, ইনজেশন, সিস্টেমিক অ্যাকশন পাশাপাশি ট্রান্সলামিনার প্রভাবের মাধ্যমে পোকামাকড়কে হত্যা করে।

সুপারিশ:

ফসল	পোকার সাধারণ নাম	ডোজ / হেক্টর		তরলীকরণ লিটার	শেষ স্প্রের পর ফসল কাটার জন্য অপেক্ষার সময়কাল (দিন)
		সঃ উঃ গ্রাম	ফর্মুলেশন		
তুলো	Aphids, Jassids and Whiteflies	40+40	1000	500	30

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান

কার্যকর কীটনাশক প্রয়োগ পদ্ধতির নির্দেশিকা

...

উদ্বৃত্ত উপাদান ধোয়া: 1. পরিবেশগত বা জলের দূষণ রোধ করার জন্য, প্রস্তুতকারকদের, কীটনাশকগুলির ফর্মুলেটর এবং অপারেটরদের প্যাকেজিং, অতিরিক্ত উপাদান এবং ওয়াশিংগুলি নিরাপদ উপায়ে নিষ্পত্তি করা উচিত। 2. তাদের পুনঃব্যবহার রোধ করতে, ব্যবহৃত প্যাকেজগুলিকে বাইরে ফেলে রাখা উচিত নয়। 3. প্যাকেজগুলিকে অবশ্যই ভেঙে ফেলতে হবে এবং কোনও মানুষের বাসস্থান থেকে দূরে পুঁতে দিতে হবে।

রাসায়নিক রচনা:

ফিপ্রোনিল এ.আই.	4.00% ওজন/ওজন
অ্যাসিটামিপ্রিড এ.আই.	4.00% ওজন/ওজন
স্ট্যাবিলাইজার: সূর্যমুখী তেল	5.00% ওজন/ওজন
ইমুলিফায়ার: পরিবর্তিত পলিথানক্সি ইথার এবং সালফেটেড অ্যানিয়োনিক সার্ফাক্ট্যান্টের মিশ্রণ	8.00% ওজন/ওজন
স্টিকিং/স্থিতিশীল এজেন্ট: ফর্মালডিহাইড	0.50 ওজন/ওজন
অ্যান্টি ফোমিং এজেন্ট: সিলিকন ডিফোমার	0.20 ওজন/ওজন
দ্রাবক: জল	পর্যাপ্তপরিমাণ বানাতে %
মোট:	100.00% ওজন/ওজন

''খালি পাত্র ব্যবহার করা বিপজ্জনক''

নির্মাতা ও বিপণনকারী : ঘরডা কেমিক্যালস লিমিটেড
পঞ্জীকৃত কার্যালয় : ৪৮, হিল রোড, বান্দ্রা (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০৫০, ভারত
ফ্যাক্টরী : ইণ্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, ফেজ ২, সম্বা, জম্মু-কাশ্মীর-১৮৪১২১.

رنگیلا

فیپرونل ۴٪ + ایسی ٹمپیریڈ ۴٪ ڈبلیو/ ڈبلیو ایس سی

(حشرات کش)

استعمال سے پہلے کتابچہ کو بغور پڑھیں۔

فیپرونیل ۴٪ + ایسیٹامیپریڈ ۴٪ ایس.سی. (وزن / وزن) ایس. سی. ایک نئے زمانے کے فینائیل پائیرازول کے تال میل والا اور فیپرونیل اور نیونی کوتی کے تال میل والا مرکب ہے۔ ایسیٹامیپریڈ جو مل کر ایک اعلیٰ قسم کی تخلیق کرتا ہے جو کی کپاس کی فصل کے الگ الگ کیڑوں کو روکتے ہیں یہ کیڑوں کو چھونے، نگلنے اور سرائیتی عمل سے اور ساتھ ہی ٹرانسلیمینار اثر سے ختم کرتے ہیں۔

سفارش :

فصل (فصلیں)	کیڑے کا عام نام	خوراک فی ہیکٹر		پانی میں محلول (لیٹر)	آخری چھڑکاؤ سے فصل کی کٹائی کی مدت کے درمیان انتظار کی مدت (دنوں)
		کارگر جزو (گرام)	محلول (ملی لیٹر)		
کپاس	ایفائیڈس، جیسڈس اور سفید مکھیاں	۴۰ + ۴۰	۱۰۰۰	۵۰۰	۳۰

استعمال سے پہلے اچھی طرح سے ہٹ ہلا

پیسٹی سائڈ ادویات کے چھڑکاؤ کی تکنیک سے متعلق اچھے طریقے

ہدایت برائے استعمال: چھڑکاؤ کا طریقہ: اس دوا کو نباتات کی پتیوں پر چھڑکاؤ کرنے کے لئے استعمال ...

استعمال شدہ کنٹینرز کو ٹھکانے لگانا، سامان اور اضافی مواد سے دھونا: ۱. کیڑے مار دواؤں کے مینوفیکچررز، فارمولا بنانے والوں اور آپریٹرز کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ پیکیجز یا اضافی مواد اور واشنگ کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگائیں تاکہ ماحولیاتی یا آبی آلودگی کو روکا جاسکے۔ ۲. استعمال شدہ پیکجوں کو ان کے دوبارہ استعمال کو روکنے کے لئے باہر نہیں چھوڑا جائے گا۔ ۳. پیکجوں کو توڑ کر رہائش گاہ سے دور دفن کیا جائے گا۔

کیمیائی اجزائے ترکیبی :

فیپرونیل اے. آئی.	4.00% وزن/وزن
ایسیٹامیپریڈ اے. آئی.	4.00% وزن/وزن
اسٹیبلائزرس : سن فلاور آئیل	5.00% وزن/وزن
ایملسیفائر: موڈیفائیڈ پولی ایتھینوکسی ایتھر اور سلفیٹیڈ اینیونیک سرفیکٹینٹ کا تال میل	8.00% وزن/وزن
اسٹکنگ / اسٹیبلائزنگ ایجنٹ : فورمل ڈیہائیڈ	0.50% وزن/وزن
اینٹی فومنگ ایجنٹ : سیلیکان ڈیفومر	0.20% وزن / وزن
سالوینٹ : پانی	کیو. ایس. %
کُل :	100.000% وزن/وزن

خالی کنٹینر کو دوبارہ استعمال کرنا خطرناک ہے۔

تیار کردہ اور تجارت کردہ بذریعہ: **گھارڈا کیمیکلس لمیٹیڈ**
جسٹرڈ آفس: 48، ہل روڈ، باندرہ (مغرب)، ممبئی۔ 400 050۔ انڈیا۔
یکٹری: انڈسٹریئل گروتھ سینٹر، فیز II، سامبا، (جے اینڈ کے)۔ 184121.