English

TIPSY®

Azoxystrobin 10% + Fipronil 5% w/v SC
(Fungicide + Insecticide)

Read Leaflet Before Use.

Azoxystrobin 10% + Fipronil 5%+ w/v SC is oil based Suspension Concentrate formulation used for the control of Yellow stem borer, Leaf folder, Brown plant hopper, Sheath blight, Leaf blast in Rice and Thrips, Chill fruit borer, Powdery mildew, Fruit rot in Chilli.

Recommendation: Shake well before use

Crop	Common Name of the Pest	Dosage/HA a.i. (g)	Formulation (ml)	Dilution (liter)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry period (hours)
Rice	Yellow stem borer, Leaf folder, Brown Plant Hopper (BPH), Sheath Blight, Leaf blast	125 + 62.5	1250	500	53	24
Chilli	Thrips, Chill fruit Borer, Powdery Mildew, Anthracnose / Fruit Rot	100 + 50	1000	500	5	

Good Practices relating to pesticide application techniques

Direction of use: Direct spray towards the crop and ensure uniform and proper coverage. It is recommended to use Knapsack sprayer or motorized knapsack sprayer fitted with hollow cone nozzle against the target insect pests in chilli and rice as indicated in the table.

Weather condition (In general): Spray preferably during morning and evening hours. Do not apply on a windy day or before a rain.

Soil and water (where ever applicable): No specific soil & water conditions are prescribed.

Crop stage for Application: May be applied in the recommended crop at any stage of crop growth when the incidence of insect pest is observed to cause economic loss.

Application Techniques: It is recommended to use Knapsack sprayer or motorized knapsack sprayer fitted with hollow cone nozzle. Shake the bottle well before use. Take the measured quantity of product and add to it a small quantity of water, mix thoroughly and then add remaining quantity of water, stir well before the use. Spray uniformly and insure proper coverage of the spray on the plant.

Equipment Type: It is recommended to use Knapsack sprayer or motorized knapsack sprayer fitted with hollow cone nozzle

Nozzle Type: Hollow cone nozzle

Dosage: Please refer above table for dosage details.

Instruction for Mixing: Take the measured quantity of product and add to it a small quantity of water, mix thoroughly and then add remaining quantity of water, stir well before the use.

Re-entry Period: 24 hours.

Manner & Time of application: May be applied to the above crops at the interval of 10-15 days when the incidence of insect pests observed in the field.

Application Timings: Spray preferably during morning and evening hours. Do not apply on a windy day or during rain.

Frequency including max number of sprays: 1-2 sprays at 10-15 days interval may be applied at the recommended dose. Repeat application, if necessary.

Stages during which pesticides should not be applied on any crop: Apply only on stage as instructed in crop stage for application. Do not apply at any other stage.

Symptoms of Poisoning: Irritability, lethargy, muscle tremors, convulsions, nausea, vomiting, diarrhoea and abdominal pain.

First Aid Measures: Remove the affected person to a well-ventilated area or fresh air and protect him from undercooling. *IN CASE OF SKIN CONTACT:* Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. *IN CASE OF EYE CONTACT:* Rinse eyes with clean water for several minutes. *IN CASE OF INGESTION:* Give the patient one or two glasses of water, if able to swallow. Do not induce vomiting. Get the attention of the medical doctor immediately. *NOTE:* Do not induce vomiting or never give anything by mouth to an unconscious person.

Antidote: There is no specific antidote. Treat symptomatically.

Phytotoxicity: Non-phytotoxic at recommended dose

Storage Conditions: 1. Storage and transportation of the product should be done in such a way that no foodstuff and animal feed are contaminated. 2. Store in a cool, dry, well-ventilated, well-built room of sufficient dimensions and in its original containers, away from foodstuff and animal feeds. 3. If leakage or spillage occurs during transportation or storage, necessary measure should be taken to prevent poisoning and pollution of soil and water. Keep out of reach of children.

Safety Precautions: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animal's food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing, mask, goggles and boots, while mixing and spraying.

Cautionary Statement: 1. Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. 2. Destroy the container after use as directed on leaflet. 3. It is toxic to honey bees, spray application should be avoided during the foraging period of bees. 4. Toxic to fish, aquatic organisms hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture.

Disposal of used containers, washing from equipment and surplus material: 1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of insecticides and operators to dispose packages or surplus material and washings in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Chemical Composition:

Azoxystrobin A.I.	active ingredient	10.0% w/v
Fipronil A.I.	active ingredient	5.0% w/v
Sunflower oil	other ingredient	54.0% w/v
Amine salt of Polyoxyethylene alkyl phenol ether Phosphate	other ingredient	3.0% w/v
Polyoxy Ethylene Glycol Ether block Copolymer	other ingredient	6.0% w/v
Sodium alkyl naphthalene sulfonate condensate	other ingredient	1.0% w/v
Propylene Glycol	other ingredient	6.5% w/v
Xanthium Gum	other ingredient	0.5% w/v
20% aqueous Dipropylene glycol solution of 1,2-benzisothiazolin-3-one	other ingredient	0.5% w/v
Silicon emulsion xiameter-4	other ingredient	1.0% w/v
Deionized water	other ingredient	Q.S.
Total		**100.00% w/v**

Density: 1.04 - 1.1 **"DANGEROUS TO RE USE EMPTY CONTAINER"**

Manufactured & Marketed by: **GHARDA CHEMICALS LIMITED**
Regd. Office: 48 Hill Road, Gharda House, Bandra (W), Mumbai - 400 050.
Factory: Plot No. C-4/1, Kherdi M.I.D.C., Village: Kherdi, Taluka: Chiplun, District: Ratnagiri, State: Maharashtra, Pincode- 415604.

Hindi

टिप्सी

एजोक्सिस्ट्रोबिन १०% + फिप्रोनिल ५% भा/आ एस.सी.
(फफूंदीनाशक + कीटनाशक)

इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़े ।

एजोक्सिस्ट्रोबिन १०% + फिप्रोनिल ५% एस.सी. तेल आधारित सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट फॉर्मूलेशन है जिसका उपयोग धान में लगने वाले पीला तना छेदक, पत्ता मोड़क, भूरा फुदका, फफूँद ऑगनी, पत्ता झुलिस के नियंत्रण में किया जाता है।इसके अलावा मिर्च में लगने वाले चुरदा, मिर्च फल छेदक, चूर्ण फफूँदी, फल विगलन रोग के नियंत्रण में किया जाता है।

सिफारिश: उपयोग करने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिलायें

फसल	कीटों के सामान्य नाम	सक्रिय तत्व (ग्रा.)	फुहारा प्रति हेक्टर: फॉर्मूलेशन (मि.ली.)	पानी की मात्रा (ली.)	फसल कटाई से पूर्व का अंतरालन (दिन)	पुनः प्रवेश की अवधि (घंटे)
धान	पीला तना छेदक, पत्ता मोड़क, भूरा फुदका, फफूँदी ऑगनी, पत्ता झुलिस	१२५ + ६२.५	१२५०	५००	५३	२४
मिर्च	चुरदा, मिर्च फल छेदक, चूर्ण फफूँदी, फल विगलन रोग	१०० + ५०	१०००	५००	५	

कीटनाशक अनुप्रयोग तकनीकों से संबंधित अच्छे तरीका:

उपयोग के लिए निर्देश: फसल की ओर सीधा छिड़काव करें और एक समान और उचित कवरेज सुनिश्चित करें। टेबल में दिए गए विवरणों के अनुसार मिर्च और धान में लगने वाले कीटों के नियंत्रण में हॉलो कोन नोजल के साथ लगे हुए नैपसैक स्प्रेयर या मोटरचालित नैपसैक स्प्रेयर का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

मौसम की स्थिति (सामान्य): सुबह और शाम के घंटों के दौरान छिड़काव करें। बारिश या तेज हवा हो तब छिड़काव न करें।

मिट्टी और पानी: मिट्टी और पानी की कोई विशिष्ट स्थिति निर्धारित नहीं है।

फसल अवस्था: फसल की वृद्धि के किसी भी चरण में छिड़काव किया जा सकता है जब कीट का प्रकोप होने पर आर्थिक नुकसान होने की संभावना हो।

आवेदन तकनीक: होलो कोन नोजल के साथ लगे हुए नैपसैक स्प्रेयर या मोटरचालित नैपसैक स्प्रेयर का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। बोतल को अच्छी तरह हिलाएँ। उत्पाद की मापी गई मात्रा में और उसमें थोड़ी मात्रा में पानी डालें, अच्छी तरह से मिलाएँ और फिर शेष मात्रा में पानी जोड़ें, उपयोग से पहले अच्छी तरह से हिलाएँ। फसल की ओर सीधा, एकसमान और उचित कवरेज से छिड़काव करें।

उपकरण प्रकार: होलो कोन नोजल के साथ लगे हुए नैपसैक स्प्रेयर या मोटरचालित नैपसैक स्प्रेयर का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

नोजल प्रकार: होलो कोन नोजल

खुराक: खुराक विवरण के लिए कृपया उपरोक्त तालिका देखें।

मिश्रण के लिए निर्देश: उत्पाद की मापी गई मात्रा लें और उसमें थोड़ी मात्रा में पानी डालें, अच्छी तरह से मिलाएँ और फिर शेष मात्रा में पानी जोड़ें, उपयोग से पहले अच्छी तरह से हिलाएँ। फसल की ओर सीधा, एकसमान और उचित कवरेज से छिड़काव करें।

पुनः प्रवेश अवधि: २४ घंटे

आवेदन का समय और प्रतिबंध: उपरोक्त फसलों में कीट का प्रकोप होने पर १०–१५ दिनों के अंतराल पर निर्दिष्ट मात्रा में छिड़काव किया जा सकता है।

आवेदन का समय: विशेषतः सुबह और शाम के घंटों के दौरान छिड़काव करें। बरसात के दिन या तेज हवा के दौरान ना करें।

आवृत्ति में अधिक अधिक सहित आवृत्ति: उपरोक्त तालिका में बताई गई खुराक स्तर में कीट का प्रकोप होने पर १०–१५ दिनों के अंतराल में एक से दो छिड़काव किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो छिड़काव दोहराएँ।

चरण जिसके दौरान किसी भी फसल पर कीटनाशक नहीं लगाया जाना चाहिए: फसल अवस्था में दिए गये निर्देशानुसार ही मात्र पर आवेदन करें, किसी अन्य चरण में आवेदन न करें।

विष के लक्षण: चिड़चिड़ापन, सुस्ती, मांसपेशियों में कंपन, झटके, मतली, उल्टी, दस्त और पेट दर्द।

प्राथमिक उपचार: रोगी को शुद्ध हवा में लें जाएँ तथा आर्टिफिशियल रीस्पाइरेशन दे बचाएँ। त्वचा में लगने पर दूषित कपड़े उतार दें और साबुन को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएँ। यदि दोनों दूषित हो जाये तो: नजदीक डॉक्टर या रोग पर जाएँ या रोगी। यदि निगल जाये तो: रोगी को पानी पिलाएँ। पानी न कराएँ और उल्टी उत्पन्न करने का प्रयास न करें। यदि लक्षण होता हो तो तुरंत डॉक्टर को बुलाएँ। सूचना: यदि लक्षण होता हो तो मुहँ से कुछ न दें। उल्टी न कराएँ।

विषनाशक: कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षण अनुसार इलाज करें।

पादप आविषाक्तता: कीटनाशक की सिफारिश के अनुसार इस्तेमाल करने पर पौधों पर कोई विषाक्तता नहीं।

संग्रहण की शर्तें: 1. इसका संग्रह तथा परिवहन इस तरह से किया जाए जिससे खाद्यों, मवेशी चारा सही, खाद्यों के संपर्क तथा पर्यावरण दूषित न हो। 2. उत्पाद को ठण्डे अच्छी तरह से वातायन पदार्थ और पर्याप्त आकार में दूर रखें। संग्रह की जगह दूसरी दवाई को जिसका निर्माण सही हैम से किया गया हो। 3. दुर्घटना वश, बोरी उपचार और रोशनीघर से। 3. उसके संग्रह या परिवहन के काल यदि उत्पाद गिर या फैल पड़ा हो तो पानीय और जानी को जहरीला या प्रदूषित होने से रोकने के लिए उचित उपाय शीघ्र करें। बच्चों के पहुँच से दूर रखें।

सुरक्षा के लिए सावधानियाँ: 1. खाद्यसामग्री, खाद्यसामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। 2. मुँह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचायें। 3. छिड़काव की वाष्प का रोग द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। 4. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पेय और कुछ चबाना नहीं चाहिए। 5. छिड़काव करने या मिलाते समय पूरे सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

सावधानियाँ कथन: 1. लेबल और पत्रक पर जो लिखा है, उससे भिन्न काम और अन्य उद्देश्य या उपयोग के लिए नहीं। 2. पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात आवरण को नष्ट करें। 3. यह कीटनाशकों के लिए हानिकारक है, जो मधुमक्खियों भोजन की तलाश में जाते है तब छिड़काव न करें। 4. मछलियों, चलीय जीवों के लिए अत्यधिक जहरीला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि के पास इस्तेमाल नहीं करना चाहिये।

कीटनाशक के प्रयोग किये गए डिब्बों, वर्ध सूर्ध कीटनाशकों तथा पानी के धोवन का निपटान: 1. यह कीटनाशकों के निर्माताओं, जीवनरोधी फॉर्मूलेटर का कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण या जल प्रदूषण को रोकने की किए एक सुरक्षित तरीके से पैकेज या अधिशेष सामग्री और धोवन का निपटान करें। 2. उपयोग किए हुए पैकेज को खुले में न छोड़े ताकि उनका पुनरुपयोग न किया जा सके। 3. पैकेज को तोड़कर आवासों से दूर जमीन के नीचे गाड़ दें।

रासायनिक संरचना:

एजोक्सिस्ट्रोबिन एआई	सक्रिय घटक	१०.०% डब्ल्यू/वी
फिप्रोनिल एआई	सक्रिय घटक	५.०% भा/आ
सनफ्लॉवर ऑइल	अन्य घटक	५४.०% भा/आ
अमाइन लॉवट ऑफ् पॉलीओक्सीइथीलीन अल्काइल फेनोल ईथर फॉस्फेट	अन्य घटक	३.०% भा/आ
पॉलीओक्सी इथीलीन ग्लाइकोल ईथर ब्लॉक कोपोलिमर	अन्य घटक	६.०% भा/आ
सोडियम अल्काइल नेफ्थालीन सल्फोनेट कन्डेंसेट	अन्य घटक	१.०% भा/आ
प्रोपिलीन ग्लाइकोल	अन्य घटक	६.५% भा/आ
कंथिलियम गम	अन्य घटक	०.५% भा/आ
२०% एक्वेयस डिप्रोपीलीन ग्लाइकोल सोल्यूशन ऑफ १,२-बेन्जीसोथियाजोलिन-३-अन्य	अन्य घटक	०.५% भा/आ
सिलिकोन इमल्शन सियामीटर-४	अन्य घटक	१.०% भा/आ
डीआयोनाईज्ड वॉटर	अन्य घटक	पर्याप्त मात्रा
कुल:		**१००.०० भा/आ**

डेन्सिटी: १.०४–१.१ **"खाली कंटेनर का दोबारा उपयोग करना खतरनाक है।"**

निर्माता और विक्रेता: **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**
पंजी. कार्यालय: ४८ हिल रोड, गांव (प), मुंबई - ४०० ०५०.
फैक्टरी: प्लॉट नं.: सी-४/१, खेरडी एम.आय.डी.सी., गांव: खेरडी, तालुका, चिपळूण, जिला: रत्नागिरी, राज्य महाराष्ट्र, पिनकोड: ४१५६०४.

Marathi

टिप्सी

ॲझोक्सिस्ट्रोबिन १०% + फिप्रोनिल ५% डब्ल्यू/वी एस.सी.
(बुरशीनाशक + कीटनाशक)

वापरण्यापूर्वी माहिती पत्रक वाचा.

ॲझोक्सिस्ट्रोबिन १०% + फिप्रोनिल ५% डब्ल्यू/वी एस.सी. हे तेल विषयक आहे व त्याचा वापर भात पिकातील पिवळा खोड किडा, पाने गुंडाळणारी अळी, तपकिरी तुडतुडा, म्यानकुजीव व करडा करपा आणि फुलकिडे, मिरची वरील फळ पोखरणारी अळी, बुरशी, मिरची वरील करपा.

शिफारस: वापरण्यापूर्वी चांगले हलवा

पीक	किटकाचे सामान्य नाव	प्रमाण प्रती हेक्टर: एआय (ग्रा.)	फॉर्मुलेशन (मिली)	पाणी (लिटर)	पेस्टसाठी फवारणी से शेवटची फवारणी यात पाहण्याचा कालावधी (दिवस)	पुन्हा प्रवेश मुक्तावधि (तास)
भात	पिवळा खोड किडा, पान गुंडाळणारी अळी, तपकिरी तुडतुडा (बीपीएच), करपा व करा	१२५ + ६२.५	१२५०	५००	५३	२४
मिरची	चुरदा, मिर्च फल छेदक, चूर्ण फफूँदी, फल विगलन रोग	१०० + ५०	१०००	५००	५	

कीटनाशक वापरण्या तंत्रांशी संबंधित चांगल्या पद्धती

वापराबाबत निर्देश: पिकावर थेट फवारणी करावी व एकसमान व योग्य पेरणी करावी. तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे मिर्ची आणि तांदळातील लक्षित कीटकांच्या विरुद्ध पोकळ शंकू नोझलसह नॅपसॅक स्प्रेयर किंवा मोटरयुक्त नॅपसॅक स्प्रेयर वापरण्याची शिफारस केली जाते.

हवामानविषयी (सर्वसाधारणपणे): सकाळी सकाळ आणि संध्याकाळच्या वेळेत फवारणी करावी, वारे वाहत असताना वा पाऊस पडताना फवारणी करू नये.

माती आणि पाणी (जेथे लागू असेल तेथे): माती आणि पाण्याची कोणतीही विशिष्ट परिस्थिती नोंदली नाही.

फवारणीसाठी पीक अवस्था: ज्ञातीचा प्रादुर्भाव आर्थिक नुकसानीच्या उंबरठ्यापेक्षा उत्पन्नाचे प्रमाण जास्त असेल तर पीकाच्या कोणत्याही टप्प्यावर शिफारस केलेल्या किमान लागवड करता यावे.

फवारण्याच्या पद्धती: पोकळ शंकू नोझलने बसवलेले नॅपसॅक स्प्रेयर किंवा मोटराइज्ड नॅपसॅक स्प्रेयर वापरण्याची शिफारस नेली जाते. वापरण्यापूर्वी बाटली नीट हलवा. उत्पादनाचे मोजलेले प्रमाण घ्या आणि त्यात थोडाच प्रमाणात पाणी घाला. चांगले मिसळा आणि नीट उपरोक्त पाणी घाला. वापरण्यापूर्वी नीट ढवळा. फवारणीचा समान आणि योग्य कव्हरेज सुनिश्चित करावी.

उपकरणांचा प्रकार: पोकळ शंकू नोझलसह बसवलेले नॅपसॅक स्प्रेयर किंवा मोटराइज्ड नॅपसॅक स्प्रेयर वापरण्याची शिफारस केली जाते

नोझल प्रकार: पोकळ शंकू नोझल

डोस: कृपया वरील तक्ता पहा.

मिश्रणासाठी सूचना: उत्पादनाचे प्रमाण घ्या आणि त्यात थोडाच प्रमाणात पाणी घाला, चांगले मिसळा आणि नीट ढवळले पाणी घाला, वापरण्यापूर्वी नीट ढवळा.

पुन: फवारणीसाठीचा कालावधी: २४ तास

फवारण्याची पद्धत व वेळ: लेताल किडीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास १०–१५ दिवसांच्या अंतराने वरील पिकांवर फवारावे.

फवारणीचा वेळा: सकाळी सकाळ आणि संध्याकाळच्या वेळेत फवारणी करावी. वाऱ्याच्या दिशेनी किंवा वादळाच्या वेळी करू नका.

जास्तीत जास्त फवारणीसह वारंवारता: शिफारस केलेल्या प्रमाणापेक्षा १०–१५ दिवसांच्या अंतराने २ फवारण्या लागू केल्या जाऊ शकतात. आवश्यक असल्यास पुन्हा करा नवलता.

कोणत्याही पिकावर कीटकनाशके फवारू नयेत अशी टप्पे: फवारणीसाठी पीक अवस्थेत सांगितल्याप्रमाणे फवारणी करा. दुसऱ्या कोणत्याही अवस्थेत लागू करू नका.

विषबाधेची लक्षणे: चिडचिडेपणा, सुस्ती, स्नायूंमधील थरथरणे, चक्रावल, मळमळ, उलट्या, जुलाब आणि ओटीपोटात दुखणे.

प्रथमोपचार उपाय: रोगी को शुद्ध हवा में लें जायें तथा आर्टिफिशियल रीस्पाइरेशन दे बचायें। त्वचा में लगने पर दूषित कपड़े उतार दें और साबुन को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएँ। यदि दोनों दूषित हो जाये तो: नजदीक डॉक्टर या रोग पर जाएँ या रोगी। यदि निगल जाये तो: रोगी को पानी पिलाएँ। पानी न कराएँ और उल्टी उत्पन्न करने का प्रयास न करें। यदि लक्षण होता हो तो तुरंत डॉक्टर को बुलाएँ। सूचना: यदि लक्षण होता हो तो मुहँ से कुछ न दें। उल्टी न कराएँ।

विषनाशक: कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षण अनुसार इलाज करें।

पादप आविषाक्तता: कीटनाशक की सिफारिश के अनुसार इस्तेमाल करने पर पौधों पर कोई विषाक्तता नहीं।

संग्रहण की शर्तें: 1. इसका संग्रह तथा परिवहन इस तरह से किया जाए जिससे खाद्यों, मवेशी चारा सही, खाद्यों के संपर्क तथा पर्यावरण दूषित न हो। 2. उत्पाद को ठण्डे अच्छी तरह से वातायन पदार्थ और पर्याप्त आकार में दूर रखें। संग्रह की जगह दूसरी दवाई को जिसका निर्माण सही हैम से किया गया हो। 3. दुर्घटना वश, बोरी उपचार और रोशनीघर से। 3. उसके संग्रह या परिवहन के काल यदि उत्पाद गिर या फैल पड़ा हो तो पानीय और जानी को जहरीला या प्रदूषित होने से रोकने के लिए उचित उपाय शीघ्र करें। बच्चों के पहुँच से दूर रखें।

सुरक्षा के लिए सावधानियाँ: 1. खाद्यसामग्री, खाद्यसामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। 2. मुँह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचायें। 3. छिड़काव की वाष्प का रोग द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। 4. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पेय और कुछ चबना नहीं चाहिए। 5. छिड़काव करने या मिलाते समय पूरे सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

सावधानियाँ कथन: 1. लेबल और पत्रक पर जो लिखा है, उससे भिन्न काम और अन्य उद्देश्य या उपयोग के लिए नहीं। 2. पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात आवरण को नष्ट करें। 3. यह कीटनाशकों के लिए हानिकारक है, जो मधुमक्खियों भोजन की तलाश में जाते है तब छिड़काव न करें। 4. मछलियों, चलीय जीवों के लिए अत्यधिक जहरीला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि के पास इस्तेमाल नहीं करना चाहिये।

कीटनाशक के प्रयोग किये गए डिब्बों, वर्ध सूर्ध कीटनाशकों तथा पानी के धोवन का निपटान: 1. यह कीटनाशकों के निर्माताओं, जीवनरोधी फॉर्मूलेटर का कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण या जल प्रदूषण को रोकने की किए एक सुरक्षित तरीके से पैकेज या अधिशेष सामग्री और धोवन का निपटान करें। 2. उपयोग किए हुए पैकेज को खुले में न छोड़े ताकि उनका पुनरुपयोग न किया जा सके। 3. पैकेज को तोड़कर आवासों से दूर जमीन के नीचे गाड़ दें।

रासायनिक संरचना:

ॲझोक्सिस्ट्रोबिन एआई	सक्रिय घटक	१०.०% डब्ल्यू/वी
फिप्रोनिल एआई	सक्रिय घटक	५.०% डब्ल्यू/वी
सूर्यफुलचे तेल	अन्य घटक	५४.०% डब्ल्यू/वी
पॉलीओक्सीइथिलीन अल्काईल फिनॉल ईथरचे अमाईन मीठ	अन्य घटक	३.०% डब्ल्यू/वी
पॉलीओक्सी इथिलीन ग्लाइकोल ईथर ब्लॉक कोपोलिमर	अन्य घटक	६.०% डब्ल्यू/वी
सोडियम अल्काईल नेफ्थालीन सल्फोनेट कन्डेन्सेट	अन्य घटक	१.०% डब्ल्यू/वी
प्रोपीलीन ग्लाइकोल	अन्य घटक	६.५% डब्ल्यू/वी
झेंथिअम गम	अन्य घटक	०.५% डब्ल्यू/वी
२०% जलीय डिप्रोपीलीन ग्लाइकोल सोल्यूशन ऑफ १,२-बेंझीसोथियाझोलिन-३-अन्य	अन्य घटक	०.५% डब्ल्यू/वी
सिलिकोन इमल्शन झियामीटर-४	अन्य घटक	१.०% डब्ल्यू/वी
डीआयोनाईज्ड वॉटर	अन्य घटक	पर्याप्त मात्रा
एकूण:		**१००.०० डब्ल्यू/वी**

घनता: १.०४–१.१ **"रिकामे कंटेनर पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे."**

उत्पादन करा = विक्रेता: **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**
रजि. कार्यालय: ४८ हिल रोड, गांव (प), मुंबई - ४०० ०५०.
फॅक्टरी: प्लॉट नं. सी-४/१, खेरडी एम.आय.डी.सी., गांव: खेरडी, तालुका: चिपळूण, जिल्हा: रत्नागिरी, राज्य: महाराष्ट्र, पिनकोड: ४१५६०४.

Gujarati

ટીપ્સી

એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 10% + ફિપ્રોનિલ 5% ડબ્લ્યુ/વિ એસસી
(ફૂગનાશક + જંતુનાશક)

વાપરતાં પહેલાં પત્રિકા વાંચો.

એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 10% + ફિપ્રોનિલ 5% ડબ્લ્યુ/વિ એસસી એ તેલ આધારિત સસ્પેન્શન કોન્સેન્ટ્રેટ ફોર્મ્યુલેશન છે જેનો ઉપયોગ યલો સ્ટેમ બોરર, લીફ ફોલ્ડર, બ્રાઉન પ્લાન્ટ હોપર, શીથ બ્લાઈટ, લીફ બ્લાસ્ટ ઈન રાઈસ એન્ડ થ્રીપ્સ, મરચાંના ફળ બોરર, પાઉડરી માર્ડિયુગ્રા અને મરચાંના ના સડા તે નિયંત્રણ માટે થાય છે.

ભલામણ: ઉપયોગ કરતા પહેલા સારી રીતે હલાવો

પાક	જંતુનું સામાન્ય નામ	ડોઝ/હે: એઆઈ (ગ્રા)	ફોર્મ્યુલેશન (મિલી)	મંજૂર (લિટર)	છેલ્લા છાંટણી વચ્ચે લણી સુધી રાહ જોવાનો સમય (દિવસ)	ફરીથી પ્રવેશનો સમયગાળો (કલાક)
ચોખા	યલો સ્ટેમ બોરર, લીફ ફોલ્ડર, બ્રાઉન પ્લાન્ટ હોપર (ડબ્લ્યુએચ), શીથ બ્લાઈટ, લીફ બ્લાસ્ટ	125 + 62.5	1250	500	53	24
મરચાં	થ્રીપ્સ, ચિલ્લીના ફળ બોરર, પાઉડરી માર્ડિયુગ્રા, એન્થ્રેક્નોઝ/ફ્રુટ રોટ	100 + 50	1000	500	5	

ઉપયોગ: ઉપયોગ કરવાની સૂચનાઓ: પાકને સીધો સ્પ્રે કરો અને એકસમાન અને યોગ્ય કવરેજની ખાતરી કરો. કોષ્ટકમાં દર્શાવેલ મરચાં અને ચોખામાં લક્ષિત જંતુઓ સામે કોલો કોન નોઝલ સાથે કોર સ્પ્રેયર અથવા મોટરાઈઝ્ડ નેપસેક સ્પ્રેયર અથવા મોટરાઈઝ્ડ નેપસેક સ્પ્રેયરનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. બોટલને સારી રીતે હલાવો. ઉત્પાદનનું માપેલ જથ્થો લો અને તેમાં થોડી માત્રામાં પાણી ઉમેરો, સારી રીતે મિક્સ કરો અને બાકીનું પાણી ઉમેરો. ઉપયોગ કરતાં પહેલાં સારી રીતે હલાવો. એકસમાન સ્પ્રે કરો અને છોડ પર સ્પ્રેનો યોગ્ય કવરેજની ખાતરી કરો.

સાધનોનો પ્રકાર: કોલો કોન નોઝલ સાથે કોર બેકપેક સ્પ્રેયર અથવા મોટરાઈઝ્ડ નેપસેક સ્પ્રેયરનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

નોઝલનો પ્રકાર: કોલો શંકુ નોઝલ

માત્રા: કોષ્ટકની વિગતો માટે કૃપા કરીને ઉપરના કોષ્ટકનો સંદર્ભ લો.

મિશ્રણ માટે સૂચનાઓ: ઉત્પાદનની માપેલ જથ્થો લો અને તેમાં થોડી માત્રામાં પાણી ઉમેરો, સારી રીતે મિક્સ કરો અને બાકી પાણી ઉમેરો, ઉપયોગ કરતા પહેલા સારી રીતે હલાવો.

પુનઃપ્રવેશ અવધિ: 24 કલાક

રીત અને સમય ના સ્પ્રેયર ની સંખ્યા: ખેતરમાં જંતુના જીવાતનો ઉપદ્રવ જોવા મળે ત્યારે ઉપરોક્ત પાકો પર 10-15 દિવસના અંતરે લાગુ કરી શકાય છે.

સ્પ્રે ના સમય: સામાન્ય રીતે અને સંધ્યા સમયે સ્પ્રે કરો. વરસાદ દિવસે કે વરસાદ પહેલા સ્પ્રે ના કરો.

સ્પ્રે ની મહત્તમ સંખ્યા સહિત આવર્તન: ભલામણ કરેલ માત્રામાં 10-15 દિવસના અંતરે 1-2 સ્પ્રે લાગુ કરી શકાય છે, જો જરૂરી હોય તો, ઓરિજીનલ દોહરાવવા જુવારપોલ કરો.

સ્પ્રાઇઝમાં કે જે દરમિયાન કીટનાશક કોઈ પણ પાક પર લાગુ ન કરવા જોઈએ: સ્પ્રે માટે પાકના તબક્કામાં સૂચવ્યા મુજબ જ સ્પ્રેયર કરો. અન્ય કોઈ તબક્કે લાગુ કરશો નહીં.

ઝેરના લક્ષણો: ચીડિયાપણું, સુસ્તી, સ્નાયુઓમાં ધ્રુજારી, આંચકી, ઉબકા, ઉલટી, ઝાડા અને પેટમાં દુખાવો.

પ્રથમ સહાયતા પગલાં: અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિને સારી રીતે વેન્ટિલેટેડ વિસ્તાર અથવા તાજી હવામાં દૂર લઈ જાઓ અને તેને ઠંડુ પડવાથી બચાવો. ત્વચાના સંપર્કના કિસ્સામાં: દૂષિત કપડાં દૂર કરો અને અસરગ્રસ્ત અંગોને સાબુ અને પાણીથી સારી રીતે ધોઈ લો. આંખના સંપર્કના કિસ્સામાં: થોડી મિનિટે સુધી આંખને સ્વચ્છ પાણીથી ધોઈ લો. ઈન્જેશનના કિસ્સામાં: દર્દીને એક કે બે ગ્લાસ પાણી આપો, જો બળી શકતા હોય તો. ઉલટીને પ્રેરિત કરશો નહીં. તાત્કાલિક તબીબી ડોક્ટરનું સલાહ લો. નોંધ: બેભાન વ્યક્તિને કશું આપવા અથવા ઉલ્ટીમાં પ્રેરિત ન આપો.

મારણ: આ કોઈ ચોક્કસ મારણ નથી. લક્ષણોની સારવાર કરો.

ફાયટોટોક્સિસિટી: ભલામણ કરેલ ડોઝ પર બિન-ફાઈટોટોક્સિક

સ્ટોરેજ શરતો: 1. ઉત્પાદનનો સંગ્રહ અને પરિવહન એવી રીતે થવો જોઈએ કે કોઈ પણ ખાદ્ય સામગ્રી અને પશુ આહાર દૂષિત ન થાય. 2. અવરાયાઓ અને પ્રાણીઓના પોરાઓથી દૂર. ઠંડા, સૂકા, સારી રીતે વેન્ટિલેટેડ, પર્યાપ્ત પરિમાણો સારી રીતે બંધ કરાયેલ અને તેના મૂળ કન્ટેનરમાં સ્ટોર કરો. 3. જો પરિવહન અથવા સંગ્રહ દરમિયાન લીકેજ અથવા ફેલાવો થાય તો ઝેર અને જમીન અને પાણીના ઝેર અને પ્રદૂષણને રોકવા માટે જરૂરી પગલાં લેવા જોઈએ. બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો.

સલામતી સાવચેતી: 1. ખાદ્યસામગ્રી, ખાદ્યપદાર્થોના ખાલી પાત્રો અને પ્રાણીઓના ખોરાકથી દૂર રાખો. 2. મોઢાં અને ત્વચા સાથે સંપર્ક ટાળો. 3. સ્પ્રે મિસ્ટ્રો માંથીના શ્વાસ લેવાનું ટાળો. પવનની દિશામાં સ્પ્રે કરો. 4. સ્પ્રે કર્યા પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરના ભાગોને સારી રીતે ધોઈ લો. 5. છંટકાવ કરતી વખતે ધૂમ્રપાન, પીવું, ખાવું અને ચાવવું નહીં. 6. મિશ્રણ અને છંટકાવ કરતી વખતે સંપૂર્ણ રક્ષણાત્મક કપડાં પહેરો.

સાવચેતીનું નિવેદન: 1. લેબલ અને પત્રિકામાં જણાવેલ સિવાયના કોઈપણ હેતુ કે ઉપયોગના ઉદ્દેશ્યમાં ન વાપરો. 2. પત્રિકા પરના નિર્દેશ મુજબ ઉપયોગ કર્યા પછી કન્ટેનરનો નાશ કરો. 3. મધમાખીઓ માટે ઝેરી છે, મધમાખીઓના ચારાચરણના સમયગાળા દરમિયાન સ્પ્રેનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ. 4. માછલી

50.00 mm

50.00 mm

TIPSY®

Azoxystrobin 10% + Fipronil 5% w/v SC

(Fungicide + Insecticide)

टिप्सी

एजोक्सिस्ट्रोबिन १०% + फिप्रोनिल ५% भा/आ एस.सी.

(फफूंदीनाशक + कीटनाशक)

DIRECTION FOR USE

FOR AGRICULTURAL USE

कृषि उपयोग के लिए

Read Leaflet Before Use

इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

Manufactured & Marketed by:

GHARDA CHEMICALS LIMITED

Regd. Office: Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400 050.

For any complaints, contact Customer Care Executive at Gharda Chemicals Limited, Gharda House, 48, Hill Road, Bandra (W), Mumbai-400050,

Tel.: 022 66265998/66265999,

Email: consumercare@gharda.com

Website: www.gharda.com

® - Registered Trademark of Gharda Chemicals Limited.

K.01.25-01

Tamil

டிப்ஸி

அசோக்ஸிஸ்ட்ரோபின் 10% + ஃபிப்ரோனில் 5% எஸ்.டபிள்யூ.எஸ்.சி

(பூஞ்சைக் கொல்லி – பூச்சிக்கொல்லி)

உபயோகிப்பதற்கு முன் படிக்கவும்.

பயன்படுத்துவதற்கு முன் தண்ணீரை குலுக்கவும்.

பயிர்	பூச்சிகள் மேலாண்மை	ஒரு ஏக்கருக்கான பரிந்துரைகளை				
		செயல்படு மூலப்பொருள்	உருவாக்கப் பயிரி	நீர்த்த அளவு (மி.லி.-லிட்டரில்)	கலவை அளவுகளில் (மி.லி.-லிட்டரில்)	காத்திருக்கும் நாட்கள் (அறுவடைக்கு முன்னர் தெளித்தல்)
அரிசி	பழுப்பு தாவரத் தத்தி, இலை சுருட்டி புழு (புழுவும் கூண்டுவிரிப் பூச்சி), இலைமடக்கி புழு, பூச்சி, இலை வெங்காய த்ரிப்ஸ்	125 + 62.5	1250	500	53	24
மிளகாய் பயிர்	காய்ப்புழு, துளைப்பான், பச்சை தத்தி, வெள்ளை ஈக்கள், பூஞ்சை, இலை வெங்காய த்ரிப்ஸ்	100 + 50	1000	500	5	

Telugu

టిప్సి

అజోక్సిస్ట్రోబిన్ 10% + ఫిప్రోనిల్ 5% డబ్ల్యూ/వి ఎస్సి

(శిలీంధ్రనాశిని + క్రిమినాశిని)

ఉపయోగించడానికి ముందు కదుపుట వలదు.

విరివిగానిధి ముందు నీరు చేయండి

పంట(లు)	కీటకాల సమస్యకు వినియోగించే	మోతాదు/హెక్టారుకు			రెండవ పిచికారీ మధ్య వ్యవధి (రోజులు)	తిరిగి ప్రవేశించే వ్యవధి
		మి.లి (గ్రా)	నీటి పరిమాణం (మి.లి.)	మి.లి (లీ.లు.లు)		
వరి	పనుపచ్చని పాకాకు తొలిచే పురుగు, ఆకుముడత, పత్తెర్లను చుట్టే పురుగు, సెమీలూపర్ కాటర్పిల్లర్	125 + 62.5	1250	500	53	24
మిరప	కాయతొలుచు పురుగు తొలిచే పురుగు బాణపు తొలిచే పురుగు, తెల్లదోమ, పచ్చదోమ	100 + 50	1000	500	5	

Kannada

ಟಿಪ್ಸಿ

ಅಜೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 10% + ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ 5% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ವಿ ಎಸ್‌ಸಿ

(ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ + ಕೀಟನಾಶಕ)

ಬಳಸುವ ಮುಂಚೆತಾಣಿ ಕರಗುವುದನ್ನು ಒರಿರಿ.

ಬೆಳೆ	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಮಾಣ/ಹೆ		ಕೊಯ್ಯಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಿಶ್ರಣದ ನಡುವಿನ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)	ಮರುಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ (ನಂಗಳು)
		ಮಿ.ಲಿ (ಗ್ರಾ)	ಸಿಂಪಡಣೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ಮಿ.ಲಿ)		
ಅಕ್ಕಿ	ಮಡಚಿ ಕುಟಕಿಹುಳು, ಎಲೆ ಸುರುಳಿ, ಕಂದು ಜಿಗಿಹಳ (ಎಸಿಎಸ್), ಸೆಮಿಲೂಪರ್ ಕಾಟರ್ಪಿಲರ್	125 + 62.5	1250	500	53	24
ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡಗಳು	ಕಾಯಿ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು ಬಾಣದ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು ಬಿಳಿನೊಣ / ಹಸಿರುಜಿಗಿ	100 + 50	1000	500	5	

Malayalam

ടിപ്സി

അസോക്സിസ്ട്രോബിൻ 10% + ഫിപ്രോണിൽ 5% ഡബ്ല്യൂ/വി എസ്സി

(കുമിൾനാശിനി + കീടനാശിനി)

ഉപയോഗത്തിനു മുമ്പ് ഇഷ്ടലേഖ വായിക്കുക

വിള	കീടങ്ങളുടെ പൊതുനാമം	ഒരേക്കറിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടവ				
			ഉപയോഗ			
		സജീവ ഘടകം	ഉത്പന്നത്തിന്റെ അളവ് (ഗ്രാം/മി.ലി)	ലായനിയുടെ അളവ് (ലിറ്റർ)	വിളവെടുക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള അവസാന തളിപ്പിനു ശേഷമുള്ള കാത്തിരിപ്പ് (ദിവസങ്ങൾ)	
നെല്ല്	തണ്ടുതുരപ്പൻ പുഴു, ഇലചുരുട്ടി പുഴു (ചുരുട്ടിപ്പുഴു), ഇലമടക്കി പുഴു, ഇലത്തുരപ്പൻ പുഴു, ഉള്ളി ഇലത്തുരപ്പൻ	125 + 62.5	1250	500	53	24
തക്കാളി	ഇലചുരുട്ടി, കായ്തുരപ്പൻ, ഇലത്തുരപ്പൻ, വെള്ളീച്ച, ഉള്ളി ഇലത്തുരപ്പൻ	100 + 50	1000	500	5	

Bengali

টিপসি

অ্যাজোক্সিস্ট্রোবিন 10% + ফিপ্রোনিল 5% ডব্লিউ/ভি এসসি

(ছত্রাকনাশক + কীটনাশক)

ব্যবহারের পূর্বে লিফলেট পড়ে নিন।

ফসল	কীটপতঙ্গের সাধারণ নাম	ডোজেজ/হেক্টর			শেষ স্প্রে এবং ফসল কাটার মধ্যে অপেক্ষার সময়কাল (দিন)	পুনরায় প্রবেশের সময়কাল (ঘণ্টায়)
		এ.আই (গ্রাম)	পরিণত (মিলিলি)	জল (লাগে (লিটার)		
ধান	ধানের মাজরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা (বিভিন্ন), থোপানো ও অন্যান্য	125 + 62.5	1250	500	53	24
লঙ্কা	লঙ্কার ছিদ্রপ, ফল ছিদ্রকারী পোকা, থ্রিপস্ (বিভিন্ন), থোপানো	100 + 50	1000	500	5	

ব্যবহার করার আগে ভাল করে ঝাঁকিয়ে নিন

Azoxystrobin 10% + Fipronil 5% w/v SC

(Fungicide + Insecticide)

टिप्सी

एजोक्सिस्ट्रोबिन १०% + फिप्रोनिल ५% भा/आ एस.सी.

(फफूंदीनाशक + कीटनाशक)

DIRECTION FOR USE

FOR AGRICULTURAL USE

कृषि उपयोग के लिए

Read Leaflet Before Use

इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

Manufactured & Marketed by:

GHARDA CHEMICALS LIMITED

Regd. Office: Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400 050.

For any complaints, contact Customer Care Executive at Gharda Chemicals Limited, Gharda House, 48, Hill Road, Bandra (W), Mumbai-400050,

Tel.: 022 66265998/66265999,

Email: consumercare@gharda.com

Website: www.gharda.com

® - Registered Trademark of Gharda Chemicals Limited.

K.01.25-01

டிப்ஸி

பூச்சிகளுக்கு எதிரான செயல்திறன் மற்றும் பயன்பாட்டு முறை: பயிர்களை பாதிக்கும் பூச்சிகளான பழுப்பு தாவரத் தத்தி, இலை சுருட்டி புழு (புழுவும் கூண்டுவிரிப் பூச்சி), இலைமடக்கி புழு, பூச்சி, இலை வெங்காய த்ரிப்ஸ் மற்றும் பைலோரிடா ஸ்பாட் வண்டுகளுக்கு எதிராக பயன்படுத்தவும். பூஞ்சைகளுக்கு எதிராக, பைலோரிடா ஸ்பாட் வண்டுகளுக்கு எதிராக 9 மடங்கு நீர்த்த கரைசலை பயன்படுத்தவும். 1 லிட்டர் மருந்துக்கு 9 லிட்டர் தண்ணீர் என்ற விகிதத்தில் கலந்து பயன்படுத்தவும். 2 மருந்துகளை கலக்கும்போது, தொடர்ச்சியான கிளறலுடன் தொடர்ச்சியான கிளறல் தேவைப்படுகிறது.

காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ளுதல்: காலநிலை மாற்றம் பொதுவாக பெரும்பாலான பயிர்களுக்கு, காய்ந்த வெப்பம் மற்றும் ஈரப்பதம் மன்னிக்கக் கூடிய சூழ்நிலைகளை உருவாக்கலாம். பெரும்பாலான பயிர்களுக்கு சிக்கலான பூச்சிகளை ஊக்குவிக்கிறது. பூச்சிகளுக்கு எதிரான பயிர் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும்.

பரிந்துரைகள்:

பயிர்	பூச்சிகளுக்கான பயன்பாடுகளை				
	செயல்படு மூலப்பொருள்	உருவாக்கப் பயிரி	நீர்த்த அளவு (மி.லி.-லிட்டரில்)	கலவை அளவுகளில் (மி.லி.-லிட்டரில்)	காத்திருக்கும் நாட்கள் (அறுவடைக்கு முன்னர் தெளித்தல்)
அரிசி	பழுப்பு தாவரத் தத்தி, இலை சுருட்டி புழு (புழுவும் கூண்டுவிரிப் பூச்சி), இலைமடக்கி புழு, பூச்சி, இலை வெங்காய த்ரிப்ஸ்	125 + 62.5	1250	500	53	24
மிளகாய் பயிர்	காய்ப்புழு, துளைப்பான், பச்சை தத்தி, வெள்ளை ஈக்கள், பூஞ்சை, இலை வெங்காய த்ரிப்ஸ்	100 + 50	1000	500	5	

செயல்படு மூலப்பொருள் (ஏ.ஐ.): அசோக்ஸிஸ்ட்ரோபின் 10% + ஃபிப்ரோனில் 5% டபிள்யூ/வி எஸ்சி

உருவாக்கப் பயிரி: 125 + 62.5 மி.லி. (கிராம்)

நீர்த்த அளவு: 1250 மி.லி.

கலவை அளவுகளில்: 500 மி.லி. (லிட்டர்)

காத்திருக்கும் நாட்கள் (அறுவடைக்கு முன்னர் தெளித்தல்): 24 நாட்கள்

மீண்டும் நுழைவதற்கான காலம்: 24 மணி நேரம்

பயிர்களுக்கு ஏற்ற பயிர்கள்: நெல்

பயிர்களுக்கு ஏற்ற பூச்சிகள்: பழுப்பு தாவரத் தத்தி, இலை சுருட்டி புழு (புழுவும் கூண்டுவிரிப் பூச்சி), இலைமடக்கி புழு, பூச்சி, இலை வெங்காய த்ரிப்ஸ் மற்றும் பைலோரிடா ஸ்பாட் வண்டு

பயிர்களுக்கு ஏற்ற நோய்கள்: பூஞ்சைகளுக்கு எதிராக, பைலோரிடா ஸ்பாட் வண்டுகளுக்கு எதிராக 9 மடங்கு நீர்த்த கரைசலை பயன்படுத்தவும்.

பயன்பாட்டு முறை: பூச்சிகளுக்கு எதிராக, பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு மருந்தை 1 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து பயன்படுத்தவும். 2 மருந்துகளை கலக்கும்போது, தொடர்ச்சியான கிளறலுடன் தொடர்ச்சியான கிளறல் தேவைப்படுகிறது.

பயன்பாட்டு நேரம்: பூச்சிகளுக்கு எதிராக, பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு மருந்தை 10 முதல் 15 நாட்கள் இடைவெளியில் 1 முதல் 2 முறை பயன்படுத்தலாம். அவசர நிலைகளுக்கு, பூச்சிகளுக்கு எதிராக பயன்படுத்தவும். பூஞ்சைகளுக்கு எதிராக, பைலோரிடா ஸ்பாட் வண்டுகளுக்கு எதிராக 10 முதல் 15 நாட்கள் இடைவெளியில் 1 முதல் 2 முறை பயன்படுத்தவும்.

எந்த நிலையில் பூச்சிகளுக்கு எதிரான செயல்திறனை காண்பிக்கிறது மற்றும் பயன்பாடு: பெரும்பாலான பயிர் பருவம் வரை பயன்படுத்தலாம். பூஞ்சைகளுக்கு எதிராக, பைலோரிடா ஸ்பாட் வண்டுகளுக்கு எதிராக 10 முதல் 15 நாட்கள் இடைவெளியில் 1 முதல் 2 முறை பயன்படுத்தவும்.

எந்த நிலையில் பூச்சிகளுக்கு எதிரான செயல்திறனை காண்பிக்கிறது மற்றும் பயன்பாடு: பெரும்பாலான பயிர் பருவம் வரை பயன்படுத்தலாம். பூஞ்சைகளுக்கு எதிராக, பைலோரிடா ஸ்பாட் வண்டுகளுக்கு எதிராக 10 முதல் 15 நாட்கள் இடைவெளியில் 1 முதல் 2 முறை பயன்படுத்தவும்.

பயிர் அறுவடை மற்றும் பயன்பாடு: பருத்தி, சோளம், கரும்பு, சோளம், மிளகாய், தானியம், பருப்பு, சோயாபீன், பீன்ஸ், ஆமணக்கு, பருத்தி, கோதுமை, பார்லி, ஓட்ஸ், ஆப்பிள், திராட்சை, மாதுளை, சிட்ரஸ் பழங்கள், வாழை, தேயிலை, காபி, ரப்பர், தென்னை, ஏலக்காய், மிளகு, வெற்றிலை, கொட்டை, கிராம்பு, ஜாதிக்காய், ஜாதிபத்திரி, ஆமணக்கு, இஞ்சி, கொத்தமல்லி, கிராம்பு, கடுகு, வெந்தயம், ஜீரகம், பூண்டு, வெங்காயம், தக்காளி, பருத்தி,