X-Factor™

Fipronil 15% + Chlorantraniliprole 5% w/v SC
(Insecticide)

Read Leaflet Before Use.

Name of Formulation: Fipronil 15% + Chlorantraniliprole 5% w/v SC

Type of Formulation: 2

Used for control target pest: Used to control stem borer leaf folder in rice crop

Crop Name: Rice

Recommendation:

S. No	Name of the Corp	Common Name of the target pest	Waiting period from last spray to harvest (in days)	Active Ingredients (gram)	Formulation (ml)	Dilution in water (Liter)
1	Rice	Stem borer, Leaf folder	49	75 + 25	500	500

Shake well before use

Good Practices relating to pesticide application techniques

Direction of use: Measure required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop with suitable knapsack sprayer fitted with hollow cone nozzle.

Weather condition (In general): Spray preferably during morning and evening hours.

Soil and water (where ever applicable): Only used as foliar application.

Crop stage for application – Days after showing: Apply first spray during initial appearance of pests and repeat one or two sprays at 15 days interval depending on pest intensity.

Application Techniques: Measure required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop with suitable knapsack sprayer fitted with hollow cone nozzle.

Equipment Type: Knapsack sprayer

Nozzle Type: Hollow cone nozzle

Dosage: 75 + 25

Instruction for Mixing: Measure required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop with suitable knapsack sprayer fitted with hollow cone nozzle.

Re-entry Period: 48 hours.

Pre Harvest Interval (PHI): 49

Manner & Time of application: Avoid application in afternoon hours. Ideal timing for application is morning and evening hours. Do not spray against wind.

Application Timings: Apply first spray during initial appearance of pests and repeat one or two sprays at 15 days interval depending on pest intensity. Apply maximum two sprays. Spray preferably during morning and evening hours. Do not apply on a windy day or during rain.

Frequency including max number of sprays: Apply first spray during initial appearance of pests and repeat one or two sprays at 15 days interval depending on pest intensity. Apply maximum three sprays.

Stages during which pesticides should not be applied on any crop: Apply only on stage as instructed in crop stage for Application, Do not applied any other stage.

Precautions to be taken to avoid harm to the beneficial insects like honey bees and natural enemies: It is toxic to honey bees, spray application should be avoided during the foraging period of bees. Highly toxic to fish, aquatic organisms hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture.

Symptoms of poisoning: Irritability, lethargy, muscle tremors, convulsions, mild eye irritant with blurred vision. Vapor inhalation may result in nasal secretion.

First Aid Measures: Call the doctor immediately *If ingested:* If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. *If inhaled:* Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration. Consult a physician. *In case of skin contact:* Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. *In case of eye contact:* Rinse gently with plenty of water at least for15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. Consult eye specialist.

Antidote: No specific antidote of known Give symptomatic treatment

Safety Precautions: 1. Do not eat, drink, smoke or chew betel leaves while applying the product 2. Wear long sleeves shirt, long pants, chemical resistant gloves, mask, goggles and covered shoes while handling the product. 3. Avoid spray drift onto the spraying person by spraying with the direction of the wind. 4. Do not blow the spray nozzle with mouth, clean the blocked nozzle with a thin stem or brush.

Storage Conditions: 1. Storage and transportation of the product should be done in such a way that no foodstuff and animal feed are contaminated. 2. Store in a cool, dry, well-ventilated, well-built room of sufficient dimensions and in its original containers, away from foodstuff and animal feeds. 3. If leakage or spillage occurs during transportation or storage, necessary measure should be taken to prevent poisoning and pollution of soil and water. Keep out of reach of children.

Cautionary Statement: 1. Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. 2. Destroy the container after use as directed on leaflet. 3. The product is reported to be very toxic to aquatic organisms, fish and honey bees thus product containing molecules may be avoided near aquaculture and during active bee foraging period of the day.

Disposal of used containers, washing from equipment and surplus material: 1. It shall be the duty of manufactures, formulators of insecticides and operators to dispose packages or surplus material and washings in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Chemical Composition:

Fipronil A.I.	15.0 % w/v
Chlorantraniliprole A.I.	5.0% w/v
Polymethyl methacrylate polyethylene glycol graft copolymer	3.0% w/v
Nonionic proprietary surfactant blend, polymeric	2.0% w/v
Propylene glycol	6.5% w/v
Xanthan Gum	0.5% w/v
20% aqueous dipropylene glycol solution of 1,2-benzisothiazolin-3- one	0.5% w/v
Silicon emulsion	0.5% w/v
De-mineralized water	Q.S
Total	**100.00% w/v**

" DANGEROUS TO RE USE EMPTY CONTAINER "

Manufactured & Marketed by: **GHARDA CHEMICALS LIMITED**
Regd. Office: Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400 050.
Factory: Industrial Growth Centre, Phase II, Samba, Dist. Samba, Pin 184 121, Jammu & Kashmir

एक्स–फैक्टर

फिप्रोनिल १५%+क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल५% भा/आ एस.सी.
(कीटनाशक)

इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़े ।

फॉमूलेशन का नाम: कृपया विवरण के लिए पत्रक का सन्दर्भ लें।

फॉमूलेशन का प्रकार: २

लक्ष्य कीट नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है: सिफारिश धान में लगने वाले तना छेदक, पत्ता मोडक के नियंत्रण के लिए की जाती है।

फसल का नाम: धान

सिफारिशः

क्रम संख्या	निगम का नाम	लक्ष्य कीटनाशक का सामान्य नाम	अंतिम स्प्रे से कटाई तक प्रतीक्षा अवधि (दिनों में)	सक्रिय सामग्री (ग्राम)	सूत्रीकरण (मि.ली)	पानी में पतलापन (ली)
१	धान	तना छेदक, पत्ता मोड़क	४९	७५ + २५	५००	५००

उपयोग करने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिलायें

कीटनाशक अनुप्रयोग तकनीकों से संबंधित अच्छे अभ्यास:

इस्तेमाल के लिए निर्देश: उत्पाद की मापित मात्रा लें और उसमें थोड़ी मात्रा में पानी डालें फिर शेष मात्रा में पानी डालें। होलो कोन नोझल के साथ फिट किए गए नैपसैक स्प्रेयर से फसल की ओर सीधा, एकसमान और उचित कवरेज से छिड़काव करें।

मौसम की स्थिति (सामान्य रूप में): विशेषतः सुबह और शाम के घंटों के दौरान छिड़काव करें। बारिश या तेज हवा हो तब छिड़काव न करें।

मिट्टी और पानी (जहां भी लागू हो): केवल पर्ण छिड़काव के रूप में उपयोग किया जाता है।

आवेदन के लिए फसल चरण - दिखाने के बाद के दिन : कीटों के प्रारंभिक रूप में पहली बार छिड़काव करें और कीट की तीव्रता के आधार पर १५ दिनों के अंतराल पर दो छिड़काव दोहराएं।

आवेदन तकनीक: उत्पाद की मापित मात्रा लें और उसमें थोड़ी मात्रा में पानी डालें फिर शेष मात्रा में पानी डालें। होलो कोन नोझल के साथ फिट किए गए नैपसैक स्प्रेयर से फसल की ओर सीधा, एकसमान और उचित कवरेज से छिड़काव करें।

उपकरण के प्रकार: नैपसैक स्प्रेयर

नोजल प्रकार: होलो कोन नोझल

मात्रा बनाने की विधि : ७५ + २५

मिलाने का निर्देश : उत्पाद की मापित मात्रा लें और उसमें थोड़ी मात्रा में पानी डालें फिर शेष मात्रा में पानी डालें। होलो कोन नोझल के साथ फिट किए गए नैपसैक स्प्रेयर से फसल की ओर सीधा, एकसमान और उचित कवरेज से छिड़काव करें।

पुनः प्रवेश अवधि: ४८ घंटे

फसल पूर्व अंतराल (PHI): ४९

आवेदन का तरीका और समय: दोपहर के घंटों में छिड़काव न करें। छिड़काव के लिए आदर्श समय सुबह और शाम का समय है। हवा के खिलाफ छिड़काव न करें।

आवेदन का समय: कीटों के प्रारंभिक रूप में पहली बार छिड़काव करें और कीट की तीव्रता के आधार पर १५ दिनों के अंतराल पर दो छिड़काव दोहराएं। अधिकतम तीन छिड़काव करें। छिड़काव अधिमानतः सुबह और शाम के समय करें। हवा वाले दिन या बारिश के दौरान छिड़काव न करें।

स्प्रे की अधिकतम संख्या सहित आवृत्ति: कीटों के प्रारंभिक रूप में पहली बार छिड़काव करें और कीट की तीव्रता के आधार पर १५ दिनों के अंतराल पर दो छिड़काव दोहराएं। अधिकतम तीन छिड़काव करें।

चरणों के दौरान: फसल अवस्था में दिए गए निर्देशानुसार ही मंच पर छिड़काव करें, किसी अन्य चरण में छिड़काव न करें।

एहतियात: उत्पाद मधु मक्खियों के लिए विषाक्त है इसलिए दिन में सक्रिय फोर्जिंग अवधि के दौरान छिड़काव न करें। ४. उत्पाद जलीय जीवों के लिए अत्यधिक विषाक्त है, इसलिए इसका उपयोग जल निकायों, जलीय कृषि या मछली पालन क्षेत्र के पास नहीं किया जाना चाहिए।

विषाक्तता के लक्षण: चिड़चिड़ापन, आलस्य, मांसपेशियों में कंपन, झटके (मिरगी), आंख में हलकी जलन व धुंधला दिखना, वाष्प साँस में जाने पर नाक से पानी बह सकता है।

प्राथमिक चिकित्सा: १. अगर निगल लिया: यदि व्यक्ति सचेत और सतर्क है, तो पानी मैं मुंह कुल्ला करायें और पिने के लिए १ या २ गिलास पानी दें। एक बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ भी कभी नहीं दें। डॉक्टर को बुलायें। बिना उपस्थित चिकित्सक की सलाह उल्टी न करायें। २. अगर साँस ली जाए: रोगी को ताजी हवा में ले जाए और शरीर के तापमान का ख्याल रखें। यदि रोगी साँस नहीं ले रहा है या कठिनाई से साँस ले रहा है. तो कृत्रिम श्वसन दें, एक चिकित्सक से परामर्श करें। ३. त्वचा संपर्क के मामले में: शरीर के प्रभावित हिस्से को अच्छी तरह से साबुन से धोए और बालों और नाखूनों सहित पानी का खूब इस्तेमाल करें। यदि दर्द, लालिमा या जलन बानी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श करें। सभी दूषित कपड़ों को अलग किया जाना चाहियें और उपयोग से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। ४. आँख से संपर्क के मामले में: कम से कम १५ मिनिट के लिए बहुत सारे पानी से धीरे-धीरे धोए। यदि दर्द, जलन, लालिमा या फोटोफोबिया बनी रहती है तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह ले।

विषनाशक कथन: कोई विशिष्ट विष नाशक नहीं है। इसलिए, रोगसूचक और सहायक चिकित्सा दी जानी चाहिए।

सुरक्षा सावधानियां: १. उत्पाद का प्रयोग करते समय न कुछ खाएं, न पिएं, न धूम्रपान करें, न ही पान चबाएं। २. उत्पाद का प्रयोग करते पूरे बांह की शर्ट, लम्बी पैंट, रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताने, मास्क, चश्मा और ढकें हुए जुते पहनें। ३. हवा की दिशा के साथ छिड़काव करते हुए छिड़काव करने वाले व्यक्ति पर स्प्रे के बहाव से बचें। ४. स्प्रे नोझल को मुँह से न खोलें, नोझल को पतली सिंक या ब्रश से साफ करें। ५. शरीर पर किसी भी रिसाव की स्थिति में, खुलें हिस्सों को साबुन और काफी सारे पानी से धोएं। ६. हाथों और शरीर के खुले हिस्सों को अच्छी तरह धोएं। प्रयोग के बाद दूषित कपड़ों को उतारकर धोएं।

भंडारण के लिए निर्देश: १. इसका संग्रह तथा परिवहन इस तरह से किया जाए जिससे बच्चों, घरेलू जानवरों खाने-पीने को समान तथा पशुआहार दूषित न हो। २. कीटनाशक को इसके असली डिब्बे में खाद्य पदार्थ और पशुआहार से दूर रखें। सग्रह की जगह सूखी ठंडी हो जिसका निर्माण सही ढंग से किया गया हो। जगह पर्याप्त लम्बी चौड़ी हवादार और रोशनीदार हो। ३. इसके संग्रह या परिवहन के समय यदि पौध वर्धक नियंत्रक गिर या फैल रहा हो तो जमीन और पानी को जहरिला या प्रदूषित होने से रोकने के लिए जरूरी उपाय शीघ्र करें। बच्चों के पहुंच से दूर रखें।

चेतावनी बयान: १. लेबल और पत्रक पर जो वर्णित है, उससे भिन्न उद्देश्य या उपयोग के लिए नहीं। २. पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात आद्यान को नष्ट करें। ३. यह उत्पाद जलीय जीवों, मछली और मधु मक्खियों के लिए बहुत जहरीला बताया गया है, इसलिए अणुओं वाले उत्पाद को जलीय कृषि के पास और दिन की सकिय मधुमक्खी चारा अवधि के दौरान टाला जा सकता है।

प्रयुक्त कंटेनरों का निपटान: १. यह कीटनाशकों के निर्माताओं, ऑपरेटरों फॉर्मूलेटर का कर्तव्य होगा की पर्यावरणीय या जल प्रदुषण को रोकने की लिए एक सुरक्षित तरीके से पैकेज या अधिशेष सामग्री और धोवन का निपटारा न करें। २. उपयोग किए हुए पैकेज को खुले में न छोड़े ताकि उनका पुनरुपयोग ना किया जा सके। ३. पैकेज को तोड़कर आबादी से दूर जमीन के निचे गाड़ दें।

रासायनिक संरचनाः

फिप्रोनिल स.त.	१५.०% भा/आ
क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल स.त.	५.०% भा/आ
पोलीमिथाईल मेथाक्रिलेट– पोलीइथिलीन ग्लाइकोल ग्राफ्ट कोपोलिमर	३.०% भा/आ
नॉनिऑनिक प्रोप्रायटरी सरफेक्टन्ट ब्लेंड, पोलीमेरिक	२.०% भा/आ
प्रोपिलीन ग्लाइकोल	६.५% भा/आ
क्संथियम गम	
२०% एक्विअस डायपोपीलीन ग्लाइकोल सोल्यूशन ऑफ	०.५% भा/आ
१,२-बेन्झिसोथिआझोलिन-३-वन	०.५% भा/आ
सिलिकॉन इमल्शन	०.५% भा/आ
डी-मिनरलाइज्ड वॉटर	पर्याप्त मात्रा
कुल	**१००% भा/आ**

" खाली कंटेनर का दोबारा उपयोग करना खतरनाक है । "

निर्माता और विकेता: **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**
पंजी. कार्यालय: घरडा हाउस, ४८ हिल रोड बांद्रा (प), मुंबई – ४०० ०५०.
फॅक्टरी: इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, फेज–२, साम्बा, जि.साम्बा, पिन १८४१२१
जम्मू और कश्मीर.

एक्स-फॅक्टर

फिप्रोनिल १५% क्लोरान्ट्रानिलिप्रोल ५% व/प्र एससी
(कीटकनाशक)

वापरण्यापूर्वी माहिती पत्रक वाचा.

मात्रारुपाचे नाव: फिप्रोनिल १५% + क्लोरान्ट्रानिलिप्रोल ५% व/प्र एससी

मात्रारुपाचा प्रकार : २

लक्षित कीड नियंत्रणासाठी वापरले जाते : भात पिकातील खोड किडा पानांना मुडपणारा किड्यांच्या नियंत्रणासाठी वापरले जाते

पिकाचे नाव: भात

शिफारस:

अ.क्र.	पिकाचे नाव	लक्षित किडीचे सामान्य नाव	शेवटच्या फवारणीपासून काढणीपर्यंत प्रतीक्षा कालावधी (दिवसात)	सक्रिय घटक (ग्रॅम)	संरचना (मि.ली)	सौम्य करण्यासाठी पाणी (लिटर)
१	भात	खोड किडा, पानांना मुडपणारा किडा	४९	७५ + २५	५००	५००

वापरण्यापूर्वी चांगले हलवा

कीटकनाशक वापराच्या तंत्राशी संबंधित चांगल्या पद्धती:

वापरासाठी निर्देश: उत्पादनाचे आवश्यक प्रमाण मोजून ते थोड्या प्रमाणात पाण्यात चांगले मिसळावे. योग्य फवारणी पंपाद्वारे पिकाच्या एकूण आच्छादनासाठी निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उर्वरित पाणी घालाव.

हवामानस्थिती (सर्वसाधारणपणे): शक्यतो सकाळ आणि संध्याकाळच्या वेळेत फवारणी करावी.

माती आणि पाणी (जिथे लागू असेल तेथे): फक्त पानांवर लावण्यासाठी किंवा फवारणीसाठी वापरले जाते.

लागवडीसाठी पीकाचा टप्पा: किडींच्या सुरुवातीच्या काळात पहिली फवारणी करावी व किडीच्या तीव्रतेनुसार १५ दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन फवारण्या पुन्हा कराव्यात.

फवारणीचे तंत्र: हॉलो कोन नॉझल बसविलेले नॅपसॅक स्प्रेअर वापरण्याची शिफारस केली जाते. वापरण्यापूर्वी बाटली नीट हलवा. उत्पादनाचे मोजलेले प्रमाण घ्या आणि त्यात थोड्या प्रमाणात पाणी घाला, चांगले मिसळा आणि नंतर उरलेले पाणी घाला, वापरण्यापूर्वी चांगले ढवळा. एकसारखे फवारणी करावी व रोपावर फवारणीची योग्य व्याप्ती निश्चित करावी.

उपकरणांचा प्रकार: नॅपसॅक स्प्रेअर

नॉझल प्रकार: हॉलो कोन नॉझल

मात्रा: ७५ + २५

मिसळण्यासाठी सूचना: उत्पादनाचे आवश्यक प्रमाण मोजा आणि थोड्या प्रमाणात पाण्यात चांगले मिसळा. हॅलो कोन नॉझल बसविलेल्या उच्च व्हॉल्यूम स्प्रेअरचे नॅपसॅक स्प्रेअरसह पिकाच्या संपूर्ण आच्छादनासाठी संपूर्ण हालचालीसह निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उर्वरित पाणी घाला.

पुन्हा प्रवेशाचा कालावधी: ४८ तास.

पिकं काढणीच्या आधीचा कालावधी (पीएचआय): ४९

फवारणी करण्याची पद्धत व वेळ: दुपारच्या वेळेत फवारणी करणे टाळावे. फवारणी करण्याची योग्य वेळ सकाळ आणि संध्याकाळची आहे. वाऱ्याच्या विरुद्ध दिशेने फवारणी करू नये.

फवारणी करण्याच्या वेळा: किडींच्या प्रादुर्भावाच्या वेळी पहिली फवारणी करावी व किडीच्या तीव्रतेनुसार १५ दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन फवारण्या पुन्हा कराव्यात. जास्तीत जास्त दोन फवारण्या करा. फवारणी शक्यतो सकाळ आणि संध्याकाळच्या वेळेत करावी. वाऱ्याच्या दिवशी किंवा पावसाच्या वेळी फवारणी करू नका.

फवारणीच्या जास्तीत जास्त संख्येसह वारंवारता: किडींच्या सुरुवातीच्या काळात पहिली फवारणी करावी व किडीच्या तीव्रतेनुसार १५ दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन फवारण्या पुन्हा कराव्यात. जास्तीत जास्त तीन फवारण्या कराव्यात.

कोणत्या टप्प्यात कोणत्याही पिकावर कीटकनाशके लागू नयेत अशी अवस्था: पीक टप्प्यावर दिलेल्या सूचनेनुसार टप्प्यावर फवारणी करा, इतर कोणत्याही टप्प्यावर फवारणी करू नका.

मधमाश्या व नैसर्गिक शत्रू यांसारख्या फायदेशीर कीटकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून घ्यावयाची खबरदारी : मधमाश्यांना ते विषारी आहे, मधमाश्यांच्या आहारकाळात फवारणी करणे टाळावे. मासे, जलचर यांच्यासाठी अत्यंत विषारी असल्याने जलस्त्रोत, मत्स्यपालन किंवा मत्स्यपालनाजवळ वापरू नये.

विषबाधा होण्याची लक्षणे: चिडचिडेपण, आळशीपणा, स्नायूंचे थरथरणे, आक्षेप, अस्पष्ट दृष्टीसह डोळ्यांची सौम्य जळजळ. बाष्प श्वासोच्छवासामुळे अनुनासिक स्राव होऊ शकतो.

प्रथमोपचार उपाय: ताबडतोब डॉक्टरांना फोन करा. गिळले असल्यास: जर व्यक्ती जागरूक आणि सतर्क असेल तर पाण्याने तोंड स्वच्छ धुवा आणि १ किंवा २ ग्लास पाणी पिण्यासाठी द्या. बेशुद्ध व्यक्तीला तोंडाने काहीही देऊ नका. डॉक्टरांना फोन करा. उपस्थित डॉक्टरांच्या इच्छेशिवाय उलट्या करू नका किंवा काढू नका. श्वासवाटे आत घेतल्यास: रुग्णाला ताज्या हवेत घेऊन जा आणि शरीराच्या तापमानाची काळजी घ्या. जर रुग्ण श्वास घेत नसेल किंवा श्वास घेण्यास त्रास होत असेल तर कृत्रिम श्वसन करा. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. त्वचेच्या संपर्कात आल्यास: शरीराचा प्रभावित भाग साबणाने आणि केसांसह भरपूर पाण्याने आणि नखांच्या खाली चांगल्या प्रकारे धुवा. वेदना, लालसरपणा किंवा चिडचिड कायम राहिल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सर्व दूषित कपडे वेगळे करून वापरण्यापूर्वी साबण आणि पाण्याने स्वतंत्रपणे स्वच्छ धुवावेत. डोळ्यांच्या संपर्कात आल्यास: कमीतकमी १५ मिनिटे भरपूर पाण्याने हळूवारपणे धुवा. वेदना, चिडचिड, लालसरपणा किंवा प्रकाशामुळे भयगंड किंवा त्रास वाढल्यास किंवा कायम राहिल्यास नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

उतारा विधान: ज्ञात उतारा नाही लक्षणात्मक उपचार द्या

सुरक्षा खबरदारी: १. उत्पादन वापरताना खाऊ, पिऊ नका, धूम्रपान करू नका किंवा पान चघळू नका. २. उत्पादन हाताळताना लांब बाह्यांचे शर्ट, लांब पॅंट, केमिकल रोधक हातमोजे, मास्क, गॉगल आणि झाकलेले शूज घाला. ३. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करून फवारणी करणाऱ्या व्यक्तीवर फवारणी करणे टाळावे. ४. स्प्रे नॉझल तोंडाने उडवू नका, ब्लॉक केलेले नॉझल पातळ खोड किंवा ब्रशने स्वच्छ करा. ५. शरीराचे सांडल्यास उघडे भाग साबणाने व भरपूर पाण्याने धुवावे. ६. हाताळल्यानंतर आणि खाणे, पिणे किंवा धूम्रपान करण्यापूर्वी हात आणि शरीराचे असुरक्षित भाग व्यवस्थित धुवा. वापरानंतर दूषित कपडे काढून स्वतंत्रपणे धुवा.

स्टोरेज अटी: १) ते अशा प्रकारे साठवले पाहिजे की ते लहान मुले, पाळीव प्राणी, खाद्यपदार्थ आणि पशुखाद्य दूषित होणार नाहीत. २) कीटकनाशक त्यांच्या मूळ कंटेनरमध्ये अन्न आणि पशुखाद्यापासून दूर ठेवा. संकलनाची जागा कोरडी, थंड आणि व्यवस्थित बांधलेली असावी. जागा पुरेशी लांब, रुंद, हवेशीर आणि प्रकाशमय असावी. ३) याच्या संकलनाच्या किंवा वाहतुकीच्या वेळी जर वनस्पती वाढ नियंत्रक खाली पडत असेल किंवा पसरत असेल त्यामुळे जमीन आणि पाणी विषबाधा किंवा प्रदूषित होण्यापासून रोखण्यासाठी त्वरीत आवश्यक उपाययोजना करा. लहान मुलांपासून दूर ठेवा.

सावध विधान: १) लेबल आणि पत्रकांवर वर्णन केलेल्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही हेतूसाठी वापरले जाऊ नये. २) पत्रकावरील निर्देशानुसार वापरल्यानंतर कंटेनर नष्ट करा. **३) हे उत्पादन मासे, जलचर अपृष्ठवंशी आणि मधमाशांसाठी विषारी असल्याची नोंद आहे. याचा वापर पाणवठ्याभोवती आणि मधमाशांच्या सक्रिय चारा कालावधी दरम्यान केला जाऊ नये.**

वापरलेल्या कीटकनाशकांच्या डब्यांची, उपकरणांच्यातील धुणी आणि अतिरिक्त कीटकनाशकाची विल्हेवाट : १) पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त साहित्य आणि वॉशिंगची सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावणे हे कीटकनाशकांचे उत्पादक, ऑपरेटर आणि फॉर्म्युलेटर यांचे कर्तव्य असेल. पर्यावरण किंवा जल प्रदूषण रोखण्यासाठी २) वापरलेले पॅकेज त्यांचा पुन्हा वापर टाळण्यासाठी उघड्यावर सोडले जाऊ नये. ३) पॅकेजेस तोडून लोकवस्तीपासून दूर जमिनीखाली गाडून टाका.

रासायनिक संरचना:

फिप्रोनिल स.त.	१५.०% व/प्र
क्लोरान्ट्रानिलिप्रोल स.त.	५.०% व/प्र
पॉलीमिथाइल मेथाक्रिलेट पॉलीथिलीन ग्लायकोल ग्राफ्ट कॉपोलीमर	३.०% व/प्र
नॉनआयनिक प्रोप्रायटरी सर्फॅक्टंट मिश्रण, पॉलिमरिक	२.०% व/प्र
प्रोपलीन ग्लायकोल	६.५% व/प्र
झेंथन गम	०.५% व/प्र
१,२-बेंझिसोथियाझोलिन –३– एक चे २०%	०.५% व/प्र
जलीय डायप्रोपाइलीन ग्लायकोल द्रावण	
सिलिकॉन इमल्शन	०.५% व/प्र
खनिजरहित पाणी	पर्याप्त मात्रा
एकूण:	**१००.००% व/प्र**

" रिकामे कंटेनर पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे."

उत्पादक आणि विपणन: **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**
कार्यालय: घरडा हाऊस, ४८ हिल रोड, वांद्रे (प.) मुंबई – ४०००५०
कारखाना: इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, फेज २, सांबा, जि. सांबा,
पिन १८४ १२१, जम्मू आणि काश्मीर

એક્સ–ફેક્ટર

ફિપ્રોનિલ 15% + ક્લોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 5% વ/વ એસ.સી.
(કીટકનાશક)

વાપરતાં પહેલાં પત્રિકા વાંચો.

ફોર્મ્યુલેશનનું નામ: ફિપ્રોનિલ 15% + ક્લોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 5% વ/વ એસ.સી.

રચનાનો પ્રકાર: 2

ટાર્ગેટ જીવાતના નિયંત્રણ માટે વપરાય છે: ચોખાના પાકમાં સ્ટેમ બોરર લીફ ફોલ્ડરને નિયંત્રિત કરવા માટે વપરાય છે.

પાકનું નામ: ચોખા

ભલામણ:

ક્રમાંક	પાક નું નામ	ટાર્ગેટ જીવાત નું સામાન્ય નામ	છેલ્લા સ્પ્રેથી લણણી સુધીની રાહ જોવાનો સમયગાળો (દિવસોમાં)	સક્રિય ઘટકો (ગ્રામ)	ફોર્મ્યુલેશન (મી. લિ)	પાણીમાં મિશ્રણ (લિટર)
1	ચોખા	સ્ટેમ બોરર, લીફ ફોલ્ડર	49	75 + 25	500	500

ઉપયોગ કરતા પહેલા સારી રીતે હલાવો

જંતુનાશકના છંટકાવની ટેકનિક્સ સંબંધી ઉત્તમ વ્યવહારો:

ઉપયોગની દિશા: ઉત્પાદનના જરૂરી જથ્થાને માપો અને તેને થોડી માત્રામાં પાણી સાથે સારી રીતે ભેળવી દો. યોગ્ય સ્પ્રેયર વડે પાકના ફુલ કવરેજ માટે સંપૂર્ણ રીતે નિર્દિષ્ટ કરેલ પાણીનો બાકીનો જથ્થો ઉમેરો.

હવામાનની સ્થિતિ (સામાન્ય રીતે) : મુખ્યત્વે સવારે અને સાંજના સમયે સ્પ્રે કરો.

માટી અને પાણી (જ્યાં પણ લાગુ હોય): માત્ર પર્ણસમૂહ તરીકે ઉપયોગ થાય છે.

સ્પ્રે માટે પાકનો તબક્કો: જંતુઓના પ્રારંભિક દેખાવ દરમિયાન પ્રથમ છંટકાવ કરો અને જંતુની તીવ્રતાના આધારે ૧૦ દિવસના અંતરે એક અથવા બે સ્પ્રેનું પુનરાવર્તન કરો.

એપ્લિકેશન તકનીકો: હોલો કોન નોઝલ સાથે ફીટ કરેલ નેપસેક સ્પ્રેયરનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. ઉપયોગ કરતા પહેલા બોટલને સારી રીતે હલાવો. ઉત્પાદનનો માપેલ જથ્થો લો અને તેમાં થોડી માત્રામાં પાણી ઉમેરો, સારી રીતે મિક્સ કરો અને પછી બાકીનું પાણી ઉમેરો, ઉપયોગ કરતા પહેલા સારી રીતે હલાવો. એકસરખી રીતે સ્પ્રે કરો અને છોડ પર સ્પ્રેના યોગ્ય કવરેજની ખાતરી કરો.

સાધનોનો પ્રકાર: નેપસેક સ્પ્રેયર

નોઝલનો પ્રકાર: હોલો શંકુ નોઝલ

માત્રા: ડોઝની વિગતો માટે કૃપા કરીને ઉપરોક્ત ભલામણ કોષ્ટકનો સંદર્ભ લો.

મિશ્રણ માટે સૂચના: ઉત્પાદનની જરૂરી માત્રાને માપો અને તેને થોડી માત્રામાં પાણી સાથે સારી રીતે ભળી દો. હોલો કોન નોઝલ સાથે ફીટ કરેલ યોગ્ય નેપસેક સ્પ્રેયર સાથે પાકના ફુલ કવરેજ માટે સંપૂર્ણ રીતે નિર્દિષ્ટ કરેલ પાણીનો બાકીનો જથ્થો ઉમેરો.

પુનઃપ્રવેશ અવધિ: ૪૮ કલાક.

લણણી પૂર્વે નો સમયગાળો (PHI): ૪૯

સ્પ્રે કરવાની રીત અને સમય: બપોરના સમયે સ્પ્રે કરવાનું ટાળો. સ્પ્રે કરવા માટેનો આદર્શ સમય સવાર અને સાંજનો છે. પવન સામે છંટકાવ કરશો નહીં.

સ્પ્રે કરવાનો સમય: જંતુઓના પ્રારંભિક દેખાવ દરમિયાન પ્રથમ સ્પ્રે કરો અને જંતુઓની તીવ્રતાના આધારે ૧૫ દિવસના અંતરે એક અથવા બે સ્પ્રેનું પુનરાવર્તન કરો. વધુમાં વધુ બે સ્પ્રે કરો. પ્રાધાન્ય સવારે અને સાંજના સમયે સ્પ્રે કરો. પવન હોય ત્યારે અથવા વરસાદ દરમિયાન સ્પ્રે કરશો નહીં.

સ્પ્રેની મહત્તમ સંખ્યા સહિતની આવર્તન: જંતુઓના પ્રારંભિક દેખાવ દરમિયાન પ્રથમ સ્પ્રે કરો અને જંતુની તીવ્રતાના આધારે ૧૫ દિવસના અંતરે એક અથવા બે સ્પ્રેનું પુનરાવર્તન કરો. વધુમાં વધુ ત્રણ સ્પ્રે કરો.

કોઈ પણ પાક પર જંતુનાશકોનો ઉપયોગ નહીં કરવાના તબક્કા: છંટકાવના પાકના તબક્કામાં સૂચિત તબક્કામાં જ છંટકાવ કરો. કોઈ પણ અન્ય તબક્કામાં છંટકાવ નહીં કરો.

મધમાખીઓ અને કુદરતી દુશ્મનો જેવા ફાયદાકારક જંતુઓને નુકસાન ન થાય તે માટે લેવાતી સાવચેતીઓ: તે મધમાખીઓ માટે ઝેરી છે, મધમાખીઓના ઘાસચારાના સમયગાળા દરમિયાન સ્પ્રેનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ. માછલી, જળચર જીવો માટે અત્યંત ઝેરી છે તેથી તેનો ઉપયોગ જળાશયો, જળચરઉછેર અથવા મત્સ્યઉછેરની નજીક થવો જોઈએ નહીં.

ઝેરના લક્ષણો: ચીડિયાપણું, સુસ્તી, સ્નાયુઓમાં ધ્રુજારી, આંચકી, અસ્પષ્ટ દ્રષ્ટિ સાથે આંખમાં હળવા બળતરા. વરાળ ઈન્હેલેશન અનુનાસિક સ્ત્રાવમાં પરિણમી શકે છે.

પ્રથમ સહાયતા માપદંડ: તરત જ ડૉક્ટરને બોલાવો. જો પીવામાં આવે તો: જો વ્યક્તિ સભાન અને સચેત હોય, તો પાણીથી મોં ધોઈ નાખો અને પીવા માટે ૧ કે ૨ ગ્લાસ પાણી આપો. બેભાન વ્યક્તિને ક્યારેય મોઢેથી કંઈ ન આપો. ડૉક્ટરને બોલાવો. હાજરી આપનાર ડૉક્ટર ઈચ્છા વિરુદ્ધ ઉલટી માટે પ્રેરિત કરશો નહીં. જો શ્વાસ લેવામાં આવે તો: દર્દીને તાજી હવામાં લઈ જાઓ અને શરીરના તાપમાનનું ધ્યાન રાખો. જો દર્દીને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ ન પડી રહી હોય અથવા શ્વાસ લેવામાં તકલીફ હોય તો કૃત્રિમ શ્વાસોચ્છવાસ આપો ડૉક્ટરની સલાહ લો. ત્વચાના સંપર્કના કિસ્સામાં: શરીરના અસરગ્રસ્ત ભાગને સાબુ અને પુષ્કળ પાણીથી વાળ અને નખની નીચે સારી રીતે ધોઈ લો. જો દુખાવો, લાલાશ અથવા બળતરા ચાલુ રહે, તો ડૉક્ટરની સલાહ લો. બધા દૂષિત કપડાંને અલગ-અલગ રાખવા જોઈએ અને ઉપયોગ કરતા પહેલા સાબુ અને પાણીથી અલગથી સારી રીતે ધોવા જોઈએ. આંખના સંપર્કના કિસ્સામાં: ઓછામાં ઓછા ૧૫ મિનિટ માટે પુષ્કળ પાણીથી હળવા હાથે કોગળા કરો. જો પીડા, બળતરા, લાલાશ અથવા ફોટોફોબિયા ચાલુ રહે છે. આંખના નિષ્ણાતની સલાહ લો.

મારણ વિધાન: જાણીતા કોઈ ચોક્કસ મારણ નથી લાક્ષણિક સારવાર આપો

સુરક્ષા સાવચેતીઓ: ૧. ખાદ્યપદાર્થો, ખાદ્યપદાર્થોના ખાલી પાત્રો અને પ્રાણીઓના ખોરાકથી દૂર રાખો. ૨. મોં, આંખો અને ત્વચા સાથે સંપર્ક ટાળો. ૩. સ્પ્રે મિસ્ટને શ્વાસમાં લેવાનું ટાળો. ૪. સ્પ્રે કર્યા પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરના ભાગોને સારી રીતે ધોઈ લો. ૫. છંટકાવ કરતી વખતે ધૂમ્રપાન, પીવું, ખાવું અને ચાવવું નહીં. ૬. મિશ્રણ અને છંટકાવ કરતી વખતે સંપૂર્ણ રક્ષણાત્મક કપડાં પહેરો. ૭. બપોરના કલાકોમાં સ્પ્રે કરવાનું ટાળો. સ્પ્રે કરવા માટેનો આદર્શ સમય સવાર અને સાંજનો છે. ૮. પવન સામે છંટકાવ કરશો નહીં. જ્યારે વરસાદ ન હોય અથવા આગામી ૧૨ કલાક સુધી આગાહી ન હોય ત્યારે શાંત હવામાનમાં આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ કરો. ૯. છંટકાવ કરેલા વિસ્તારને વહેતા સમયે સ્પ્રે કરશો નહીં.

સંગ્રહની સ્થિતિઓ: ૧) છોડ વૃદ્ધિ નિયામકનો સંગ્રહ અને પરિવહન એ રીતે કરવો જોઈએ કે કોઈ પણ ખાદ્યપદાર્થ અથવા પશુનો ચારો દૂષિત નહીં થાય. ૨) ઠંડી, સૂકી, સારા હવાઉજાશ, પૂરતા પરિમાણ સાથે ઉત્તમ બંધાયેલી જગ્યામાં, ખાદ્યપદાર્થ અને પશુના ચારાથી દૂર મળ કન્ટેઈનરમાં સંગ્રહ કરો. ૩) જો પરિવહન અથવા સંગ્રહ દરમિયાન ગળતર અથવા ઢોળાય તો માટી અને પાણીમાં ઝેર અને દૂષિત થવાનું નિવારવા માટે જરૂરી પગલાં લેવાં જોઈએ. બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો.

ચેતવણી: ૧) લેબલ અને પત્રકો પર દર્શાવે સિવાયના કોઈ પણ અન્ય હેતુ માટે ઉપયોગ નહીં કરવો જોઈએ. ૨) ઉપયોગ પછી કન્ટેઈનર પત્રકમાં નિર્દેશ અનુસાર નાશ કરો. **૩) ઉત્પાદન માછલીઓ, સમુદ્રિ જીવો અને મધમાખીઓ માટે ઝેરી હોવાનું નોંધાયું છે. પાણીની નહેરોમાં અને આસપાસ અને મધમાખી સક્રિય હોય તે દરમિયાન ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ.**

ખાલી પાત્રોનો નિકાલ: ૧) ધોવાણનો કચરો અને વધારાની સામગ્રીઓનો નિકાલ પર્યાવરણીય અથવા જળ પ્રદૂષણ નહીં થાય તે રીતે સુરક્ષિત પદ્ધતિથી કરવાની જવાબદારી જંતુનાશકોના ઉત્પાદકો, રચનાકારો અને ઓપરેટરોની રહેશે. ૨) વપરાયેલાં પેકેજોનો ફરીથી ઉપયોગ ટાળવા માટે બહાર ખુલ્લામાં નહીં છોડવાં જોઈએ. ૩) પેકેજોને તોડીને માનવી વસાહતથી દૂર દાટી દેવાં જોઈએ.

રાસાયણિક રચના:

ફિપ્રોનિલ એ.આઈ	૧૫.૦% વ/વ
ક્લોરેન્ટ્રાનિલિપ્રોલ એઆઈ	૫.૦% વ/વ
પોલિમિથિલ મેથાક્રાયલેટ પોલિઈથિલિન ગ્લાયકોલ ગ્રાફ્ટ કોપોલિમરનો	૩.૦% વ/વ
નિયોનિક માલિકીનું સરફેક્ટન્ટ મિશ્રણ, પોલિમરીક	૨.૦% વ/વ
પ્રોપીલીન ગ્લાયકોલઝેનથન ગમ	૬.૫% વ/વ
	૦.૫% વ/વ
20% જલીય ડીપ્રોપીલીન ગ્લાયકોલ સોલ્યુશન	૦.૫% વ/વ
1,2-બેન્ઝીસોથિયાઝોલિન-3-એક	
સિલિકોન પ્રવાહી મિશ્રણ	૦.૫% વ/વ
ડી-મિનરલાઈઝ્ડ વોટર	Q.S
કુલ:	**100.00% વ/વ**

"ખાલી ડબ્બા ફરીથી ઉપયોગ કરવાનું અતરનાક છે."

ઉત્પાદક અને વિપણનકર્તા: **ઘરડા કેમિકલ્સ લિમિટેડ**
રજી. ઑફિસ: ઘરડા હાઉસ, ૪૮ હીલ રોડ, બાંદ્રા (પશ્ચિમ), મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૫૦.
ફેક્ટરી: ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રોથ સેન્ટર, ફેઝ II, સાંબા, જિ. સાંબા,
પિન ૧૮૪ ૧૨૧, જમ્મુ અને કાશ્મીર

ਐਕਸ-ਫੈਕਟਰ

ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ 15% + ਕਲੋਰੈਂਟਰਾਨੀਲੀਪ੍ਰੋਲ 5% ਭ/ਅ ਐੱਸ.ਸੀ.
(ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।

ਸੂਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ: ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ 15%+ਕਲੋਰੈਂਟਰਾਨੀਲੀਪ੍ਰੋਲ5%ਭ/ਅ ਐੱਸ.ਸੀ.

ਸੂਤਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ: 2

ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਕੀਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾ ਛੇਦਕ ਅਤੇ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨਾਮ: ਝੋਨਾ

ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ:

ਲੜੀ ਨੰ:	ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨਾਮ	ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਕੀਟ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ	ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਛਿੜਕਾਅ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)	ਸਰਗਰਮ ਸਮੱਗਰੀ (ਜੀ ਐੱਮ.)	ਸੂਤਰੀਕਰਣ (ਐੱਮ.ਐੱਲ.)	ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਤਲਾ ਕਰਨਾ (ਲੀਟਰ)
1	ਝੋਨਾ	ਤਣਾ - ਛੇਦਕ ਅਤੇ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ	49	75 + 25	500	500

ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸ:

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਾਪ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਛਿੜਕਾਅ ਪੰਪ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਹੋ ਸਕੇ।

ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ): ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋ।

ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ (ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): ਸਿਰਫ ਫੋਲੀਅਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫਸਲ ਦਾ ਪੜਾਅ: ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਛਿੜਕਾਅ ਦੁਹਰਾਓ।

ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਵਿਧੀਆਂ: ਹਾਲੋ ਕੋਣ ਨੋਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪਰੇ ਪੰਪ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ। ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਾਪੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ। ਇਕਸਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਕਿਸਮ: ਨੈਪਸੈਕ ਛਿੜਕਾਅ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ

ਨੋਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿਸਮ: ਹਾਲੋ ਕੋਣ ਨੋਜ਼ਲ

ਮਿਕਦਾਰ: 75 + 25

ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ: ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਾਪੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਓ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਲੋ ਕੋਣ ਵਾਲੇ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪਰੇ ਪੰਪ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਇਕਸਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਹੋ ਸਕੇ।

ਮੁੜ-ਦਾਖਲਾ ਮਿਆਦ: 48 ਘੰਟੇ

ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਕਫਾ (ਪੀ.ਐੱਚ.ਆਈ.): 49

ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ: ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਸਪਰੇਅ ਨਾ ਕਰੋ।

ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਪਰੇਅ ਦੁਹਰਾਓ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਤ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ: ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਪਰੇਅ ਦੁਹਰਾਓ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।

ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀੜਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ.ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਜਲ-ਖੇਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ.ਸੁਸਤੀ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਣ,ਕੜਵੱਲ,ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ।ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੱਕ ਦਾ ਵਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਪਾਅ : ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਜੇਕਰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੁਰਲੀ ਕਰਾਓ ਅਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਰੋਗੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਾਉਟੀ ਸਾਹ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਹੁੰਆਂ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਜਲਨ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।ਜੇਕਰ ਦਰਦ, ਜਲਣ, ਲਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਜ਼ਹਿਰਤੋੜ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਹਿਰਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ਨਾਂ ਖਾਓ, ਨਾਂ ਪੀਓ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਾ ਚਬਾਓ। ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼, ਲੰਮੀ ਪੈਂਟ, ਰਸਾਇਣ ਰੋਧਕ ਦਸਤਾਨੇ,ਮਾਸਕ,ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਢਕੇ ਹੋਏ ਬੂਟ ਪਹਿਨੋ।ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਛਿੜਕਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਨੋਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਫੂਕਾਂ ਨਾਂ ਮਾਰੋ,ਬੰਦ ਹੋਈ ਨੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਤਲੇ ਡੰਡੇ ਜਾਂ ਬਰੁਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

ਭੰਡਾਰਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ: ੧) ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ੨) ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਫੀਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਠੰਡੇ, ਸੁੱਕੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਦਾਰ, ਢੁਕਵੇਂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ੩) ਜੇਕਰ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਲੀਕ ਜਾਂ ਸਪਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।

ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼: ੧) ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ੨) ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। **੩) ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ, ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲ-ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।**

ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: ੧) ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੋਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਾਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ੨) ਵਰਤੇ ਗਏ ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਚਾਹੀਦਾ। ੩) ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਸਾਇਣਕ ਸੰਰਚਨਾ:

ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ ਏ.ਆਈ.	15.0% ਭ/ਅ
ਕਲੋਰੈਂਟਰਾਨੀਲੀਪ੍ਰੋਲ ਏ.ਆਈ.	5.0% ਭ/ਅ
ਪੋਲੀਮਿਥਾਈਲ ਮੈਥਾਕਰਾਈਲੇਟ ਪੋਲੀਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਗਰਾਫਟ ਕੋਪੋਲੀਮਰ	3.0% ਭ/ਅ
ਨੋਨਿਓਨਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰੀਟਰੀ ਸਰਫ਼ਫੈਕਟੈਂਟ ਮਿਸ਼ਰਣ.ਪੋਲੀਮੈਰਿਕ	2.0% ਭ/ਅ
ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋ	6.5% ਭ/ਅ
ਜ਼ੈਂਥਨ ਗਮ	0.5% ਭ/ਅ
20% ਐਕੁਅਸ ਡਿੱਪਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ	0.5% ਭ/ਅ
1,2- ਬੈਨਜ਼ੀਜ਼ੋਥੀਆਜ਼ੋਲਿਨ -3- ਇੱਕ	
ਸਿਲੀਕੋਨ ਈਮਲਸ਼ਨ	0.5% ਭ/ਅ
ਖਣਿਜ ਰਹਿਤ ਪਾਣੀ	Q.S
ਕੁੱਲ	**100.00% ਭ/ਅ**

"ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।"

ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ: **ਘਰਡਾ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ।**
ਰਜਿ: ਦਫ਼ਤਰ: 48. ਹਿੱਲ ਰੋਡ. ਬਾਂਦਰਾ (ਪੱਛਮੀ), ਮੁੰਬਈ-400050.
ਫੈਕਟਰੀ:ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ.ਫੇਜ਼ 2, ਸਾਂਭਾ.ਜ਼ਿਲਾ.ਸਾਂਭਾ ਪਿੰਨ -184121. (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ)

X Factor™

Fipronil 15% + Chlorantraniliprole 5% w/v SC

(Insecticide)

एक्स-फैक्टर

फिप्रोनिल १५%+
क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल ५% भा/आ एस.सी.
(कीटनाशक)

DIRECTION FOR USE

FOR AGRICULTURAL USE
कृषि उपयोग के लिए

Read Leaflet Before Use
इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

Manufactured & Marketed by:
GHARDA CHEMICALS LIMITED
Regd. Office: Gharda House, 48 Hill Road,
Bandra (W), Mumbai - 400 050.

For any complaints, contact Customer Care Executive at Gharda Chemicals Limited, Gharda House, 48, Hill Road, Bandra (W), Mumbai-400050,
Tel.: 022 66265998/66265999,
Email: consumercare@gharda.com
Website: www.gharda.com

TM - Trademark of Gharda Chemicals Limited



J.01.25-01

எக்ஸ்-பேக்டர்

பிப்ரோனில் 15% + குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 5% டபிள்யூ/வீ எஸ் சி
(பூச்சிக் கொல்லி)

உபயோகிப்பதற்கு முன்பு கீழ் கண்டதை படிக்கவும்

மருந்து உருவாக்கத்தின் பெயர்: பிப்ரோனில் 15% + குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 5% டபிள்யூ/வீ எஸ் சி

மருந்து உருவாக்கத்தின் வகை: 2

இலக்கு பூச்சியைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுகிறது: நெற்பயிரில் தண்டுத் துளைப்பான் இலை அடைப்பைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுகிறது

பயிர் பெயர்: அரிசி (நெல்)

ரசாயனக் கலவை:

பிப்ரோனில் யுஜ	15.0% டபிள்யூ/வீ
குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் யுஜ	5.0% டபிள்யூ/வீ
பாலிமெதில் மெதக்ரிலேட் பாலிஎதிலீன் கிளைகோல் கிராஃப்ட் கோபாலிமர்	3.0% டபிள்யூ/வீ
அயோனிக் தனியுரிம சர்பாக்டான்ட் கலவை, பாலிமெரிக்	2.0% டபிள்யூ/வீ
புரோபிலீன் கிளைகோல்	6.5% டபிள்யூ/வீ
சாந்தன் கம்	0.5% டபிள்யூ/வீ
1,2-பென்சிசோதியாசோலின்-3- ஒன்றின் 20% அக்வஸ் டிப்ரோபிலீன் கிளைகோல் கரைசல்	0.5% டபிள்யூ/வீ
சிலிக்கான் குழம்பு	0.5% டபிள்யூ/வீ
கனிம நீக்கப்பட்ட நீர்	Q.S
மொத்தம்:	100.00% டபிள்யூ/வீ

"வெற்று கொள்கலனை பயன்படுத்துவது அபாயகரமனாது"

தயாரிப்போர் மற்றும் சந்தை படுத்துவர்: **கர்டா கெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட்**

பதிவு அலுவலகம்: கர்தாஹவுஸ், 48 ஹில்ரோட், பாந்த்ரா (மே), மும்பை- 400 050.

தொழிற்சாலை: தொழில்துறை வளர்ச்சி மையம், இரண்டாம் கட்டம், சம்பா, மாவட்டம். சம்பா, பின் 184 121, ஜம்மு & காஷ்மீர்

ఎక్స్-ఫాక్టర్

ఫిప్రోనిల్ 15% + క్లొరాంట్రానిలిప్రోల్ 5% డబ్ల్యూ/వి ఎస్‌సి
(కీటకనాశిని)

ఉపయోగించడానికి ముందు కరపత్రం చదవండి.

సూత్రీకరణ పేరు: ఫిప్రోనిల్ 15% + క్లొరాంట్రానిలిప్రోల్ 5% డబ్ల్యూ/వి ఎస్‌సి

సూత్రీకరణ రకము: 2

లక్షిత కీటకాల నియంత్రణ కొరకు ఉపయోగించబడుతుంది: వరి పంటలో కాండం తొలుచు ఆకుముడత నియంత్రణ కొరకు ఉపయోగించబడుతుంది.

పంట పేరు: వరి (ప్యాడీ)

రసాయనిక మిశ్రమము :

ఫిప్రోనిల్ ఏ.ఐ.	15.0% డబ్ల్యూ/వి
క్లొరాంట్రానిలిప్రోల్ ఏ.ఐ.	5.0% డబ్ల్యూ/వి
పాలిమిథైల్ మెథాక్రిలేట్ పాలిఇథిలీన్ గ్లైకాల్ గ్రాఫ్ట్ కోపాలిమర్	3.0% డబ్ల్యూ/వి
నోనియోనిక్ ప్రొప్రైటరీ సర్ఫెక్టెంట్ బ్లెండ్, పాలిమెరిక్	2.0% డబ్ల్యూ/వి
ప్రొపలీన్ గ్లైకాల్	6.5% డబ్ల్యూ/వి
క్సాంథన్ గమ్	0.5% డబ్ల్యూ/వి
1,2-బెంజిసోథియాజొలిన్-3-వన్ యొక్క 20% ఆక్వస్ డిప్రొపలీన్ గ్లైకాల్ ద్రావణము	0.5% డబ్ల్యూ/వి
సిలికాన్ ఇమల్షన్	0.5% డబ్ల్యూ/వి
డీ-మినరలైజ్డ్ నీరు	Q.S
మొత్తం:	100.00% డబ్ల్యూ/వి

"ఖాళీ డబ్బాలని తిరిగి ఉపయోగించడం ప్రమాదం"

తయారుచేసినది & మార్కెట్ చేసినది: **ఘర్దా కెమికల్స్ లిమిటెడ్**

రిజిస్టర్డ్ కార్యాలయము: ఘర్దా హౌస్, 48 హిల్ రోడ్, బాంద్రా (డ), ముంబై – 400050

కర్మాగారము: ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ సెంటర్, ఫేజ్ II, సాంబ, జిల్లా సాంబ, పిన్ 184121, జమ్ము & కాశ్మీర్

ಎಕ್ಸ್-ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್

ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 15% + ಕ್ಲೋರಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 5% ಡಬ್ಲ್ಯು/ವಿ ಎಸ್ಸಿ
(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಬಳಸುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿರಿ.

ಸೂತ್ರೀಕರಣದ ಹೆಸರು: ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 15% - ಕ್ಲೋರಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 5% ಡಬ್ಲ್ಯು/ವಿ ಎಸ್ಸಿ

ಸೂತ್ರೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ: 2

ಗುರಿಯ ಕೀಟದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಎಲೆಗಳ ಮಡಚುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಬೆಳೆಯ ಹೆಸರು: ಭತ್ತ

ರಾಸಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ :

ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ ಸ.ಘ.	15.0% ಡಬ್ಲ್ಯು/ವಿ
ಕ್ಲೋರಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ ಸ.ಘ.	5.0% ಡಬ್ಲ್ಯು/ವಿ
ಪಾಲಿಮಿಥೈಲ್ ಮೆಥಾಕ್ರಿಲೇಟ್ ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೋಪಾಲಿಮರ್	3.0% ಡಬ್ಲ್ಯು/ವಿ
ಅಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲದ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸರ್ಫ್ಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಮಿಶ್ರಣ, ಪಾಲಿಮರಿಕ್	2.0% ಡಬ್ಲ್ಯು/ವಿ
ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್	6.5% ಡಬ್ಲ್ಯು/ವಿ
ಕ್ಸಾಂಥನ್ ಗಮ್	0.5% ಡಬ್ಲ್ಯು/ವಿ
1,2-ಬೆಂಜಿಸೋಥಿಯಾಜೋಲಿನ್-3-ಒಂದು 20% ಜಲೀಯ ಡಿಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್ ದ್ರಾವಣ	0.5% ಡಬ್ಲ್ಯು/ವಿ
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಎಮಲ್ಷನ್	0.5% ಡಬ್ಲ್ಯು/ವಿ
ಖನಿಜರಹಿತ ನೀರು	Q.S
ಒಟ್ಟುಮೊತ್ತ:	100.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ವಿ

"ಬರಿದಾದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳನ್ನು ಪುನ: ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ."

ತಯಾರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದ : **ಘರ್ಡಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್**

ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಛೇರಿ: ಘರ್ಡಾ ಹೌಸ್, 48 ಹಿಲ್ ರೋಡ್, ಬಾಂದ್ರಾ (ಪ), ಮುಂಬೈ – 400 050.

ಕಾರ್ಖಾನೆ: ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ, ಹಂತ II, ಸಾಂಬಾ, ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಂಬಾ, ಪಿನ್ 184 121, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ

എക്സ്-ഫാക്ടർ

ഫിപ്രോനിൽ 15% + ക്ലോറൻട്രാനിലിപ്രോൾ 5% ഡബ്ല്യു / വി എസ്.സി
(കീടനാശിനി)

ഉപയോഗത്തിനു മുമ്പ് ലഘുലേഖ വായിക്കുക

ഫോർമുലേഷന്റെ പേര്: ഫിപ്രോനിൽ 15% + ക്ലോറൻട്രാനിലിപ്രോൾ 5% ഡബ്ല്യു / വി എസ്.സി

ഫോർമുലേഷന്റെ തരം: 2

ടാർഗെറ്റ് കീടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു: നെൽകൃഷിയിലെ തണ്ടുതുരപ്പൻ ഇല ഫോൾഡർ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു

വിളയുടെ പേര്: നെല്ല്

രാസഘടനം:

ഫിപ്രോണിൽ എ.ഐ.	15.0% ഡബ്ല്യു/വി
ക്ലോറൻട്രാനിലിപ്രോൾ എ.ഐ.	5.0% ഡബ്ല്യു/വി
പോളിമീഥൈൽ മെത്തക്രൈലേറ്റ് പോളിയെത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് കോപോളിമർ	3.0% ഡബ്ല്യു/വി
നോൺ-അയോണിക് പ്രൊപ്രൈറ്ററി സർഫക്റ്റന്റ് മിശ്രിതം, പോളിമെറിക്	2.0% ഡബ്ല്യു/വി
പ്രൊപ്പിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ	6.5% ഡബ്ല്യു/വി
സാന്തൻ ഗം	0.5% ഡബ്ല്യു/വി
1,2-ബെൻസിസോത്തിയസോലിൻ -3- ഒന്നിന്റെ 20% അക്വസ് ഡൈപ്രൊപ്പിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ലായനി	0.5% ഡബ്ല്യു/വി
സിലിക്കൺ എമൽഷൻ	0.5% ഡബ്ല്യു/വി
ഡീ മിനറലൈസ്ഡ് വാട്ടർ	Q.S
ആകെ	100.00% ഡബ്ല്യു/വി

"ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആപത്കരമാണ്"

നിർമ്മിച്ചതും വിപണനം ചെയ്യുന്നതും: **ഘർദ കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ്**

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഫീസ്: ഘർദ ഹൗസ്, 48 ഹിൽ റോഡ്, ബാന്ദ്ര (ഡബ്ല്യു), മുംബൈ – 400 050.

ഫാക്ടറി: ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് സെന്റർ, ഫേസ് II, സാംബ, ജില്ല, സാംബ, പിൻ 184 121, ജമ്മു & കാശ്മീർ

এক্স-ফ্যাক্টর

ফিপ্রোনিল 15% + ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল 5% ডাব্লু / ভি এসসি
(কীটনাশক)

ব্যবহারের পূর্বে লিফলেট পড়ে নিন।

ফর্মুলেশনের নাম: ফিপ্রোনিল 15% + ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল 5% ডাব্লু / ভি এসসি

ফর্মুলেশনের ধরণ: 2

যে কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়: ধানের ফসলে স্টেম বোরার লিফ ফোল্ডার নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়

ফসলের নাম: ধান

রাসায়নিক গঠন ও উপাদান:

ফিপ্রোনিল এ.আই.	15.0 % ডাব্লু/ভি
ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল এ.আই	5.0% ডাব্লু/ভি
পলিমিথাইল মেথাক্রিলেট পলিথিলিন গ্লাইকোল গ্রাফ্ট কপোলিমার	3.0% ডাব্লু/ভি
নন-আয়নিক প্রোপ্রাইটারি সার্ফ্যাক্ট্যান্ট ব্লেন্ড, পলিমারিক	2.0% ডাব্লু/ভি
প্রোপিলিন গ্লাইকোল	6.5% ডাব্লু/ভি
জ্যান্থান গাম	0.5% ডাব্লু/ভি
1,2-বেনজিসোথিয়াজোলিন -3- এক এর 20% জলীয় ডিপ্রোপিলিন গ্লাইকোল সল্যুশন	0.5% ডাব্লু/ভি
সিলিকন ইমালসন	0.5% ডাব্লু/ভি
ডি-মিনারেলাইজড ওয়াটার	Q.S
সর্বমোট:	100.00% ডাব্লু/ভি

"খালি পাত্র ব্যবহার করা বিপজ্জনক"

নির্মাতা এবং বিপণনকারী: **ঘারডা কেমিক্যালস্ লিমিটেড,**

রেজিস্টার্ড অফিস: ঘারডা হাউস, 48 হিল রোড, বান্দ্রা (পশ্চিম), মুম্বই - 400 050,

ফ্যাক্টরি: ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, ফেজ 2, সাম্বা ডিস্ট্রিক্ট সাম্বা, পিন 184 121, জম্মু ও কাশ্মীর।

ایکس - فیکٹر

فپرونِل ۱۵٪ + کلورینٹرانیلیپرول ۵٪ ڈبلیو/وی ایس‌سی
(حشرات کش دوا)

استعمال سے پہلے کتابچہ پڑھیں۔

فارمولیشن کا نام: فپرونِل ۱۵٪+ کلورینٹرانیلیپرول ۵٪ ڈبلیو/وی ایس‌سی

فارمولیشن کی قسم: ۲

نشانہ بنائے گئے حشرات کو قابو کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے: دھان کی فصل میں اسٹیم بورر لیف فولڈر جیسے حشرات کو قابو کرنے کے لئے اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔

فصل کا نام: دھان

کیمیائی اجزاء:

فپرونِل اے آئی	۱۵٪ ڈبلیو/وی
کلوریٹرانیلیپرول اے آئی	۵.۰٪ ڈبلیو/وی
پولی میتھائل میتھاکرائیلیٹ پولی ایتھیلین گلائکول گرافٹ کوپولیمر	۳.۰٪ ڈبلیو/وی
نان آئیونک پروپرائیٹری سرفیکٹنٹ آمیزہ، پولی میرک	۲.۰٪ ڈبلیو/وی
پروپیلین گلائکول	۶.۵٪ ڈبلیو/وی
زیتھن گوند	۰.۵٪ ڈبلیو/وی
۱،۲-بینزانسوتھیزولن-۳- ون کا ۲۰٪ آبی ڈائی پروپیلین گلائکول محلول	۰.۵٪ ڈبلیو/وی
سلیکان ایملشن	۰.۵٪ ڈبلیو/وی
معدنیات سے پاک پانی	حسب ضرورت
کل	۱۰۰.۰۰٪ ڈبلیو/وی

خالی کنٹینر کو دوبارہ استعمال کرنا خطرناک ہے۔

تیارکردہ اور تجارت کردہ بذریعہ: **گھرڈا کیمیکلس لیمیٹیڈ**