ENGLISH

YAMAKAZI®

Pyraclostrobin 10%+Thifluzamide 10% w/v SC (Fungicide)

Read Leaflet Before Use.

Pyraclostrobin 10% + Thifluzamide 10% SC is a very effective fungicide recommended for the control of Sheath blight and Leaf blast infecting rice crop.

Recommendation:

Crop	Common Name of the Diseases	Dosage/HA		Dilution in water (Liter)	Pre harvest interval (Days)	Re-entry Period (Hours)
		A.I. (g)	Formulation (ml)			
Rice	Sheath Blight, Leaf blast	80 + 80 to 90 + 90	800 - 900	500	18	24

Shake well before use

Good Practices relating to pesticide application techniques

Direction of use: Direct spray towards the crop and ensure uniform and proper coverage. It is recommended to use Knapsack sprayer of high volume sprayer fitted with hollow cone nozzle against the target diseases in rice as indicated in the table.

Weather condition (In general): Spray preferably during morning and evening hours. Do not apply on a windy day or before a rain.

Soil and water (where ever applicable): No specific soil & water conditions are prescribed.

Crop stage for Application: May be applied in the recommended crop at any stage of crop growth when the incidence of diseases is observed to cause economic loss.

Application Techniques: It is recommended to use Knapsack sprayer of high volume sprayer fitted with hollow cone nozzle. Shake the bottle well before use. Take the measured quantity of product and add to it a small quantity of water, mix thoroughly and then add remaining quantity of water, stir well before the use. Spray uniformly and ensure proper coverage of the spray on the plant.

Equipment Type: Knapsack sprayer.

Nozzle Type: Hollow cone nozzle.

Dosage: Please refer above recommendation table for dosage details.

Instruction for Mixing: Measure required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop with suitable knapsack sprayer fitted with hollow cone nozzle.

Re-entry Period: 24 hours.

Pre harvest interval: 18 days.

Manner & Time of application: May be applied to the above crops at the interval of 10-15 days when the incidence of diseases observed in the field.

Application Timings: Spray preferably during morning and evening hours. Do not apply on a windy day or during rain.

Frequency including max number of sprays: 1-2 sprays at 10-15 days interval may be applied at the recommended dose. Repeat application, if necessary.

Stages during which pesticides should not be applied on any crop: Apply only on stage as instructed in crop stage for Application. Do not applied any other stage.

Symptoms of Poisoning: If ingested, the early symptoms may be a combination of nausea, vomiting, Eye and Skin irritation, diarrhea and abdominal pain.

First Aid Measures: Call the doctor immediately. If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration. Consult a physician. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. Consult eye specialist.

Antidote: There is no specific antidote. Treat symptomatically.

Phytotoxicity: Non phytotoxic at the recommended dose.

Storage Conditions: 1. Storage and transportation of the product should be done in such a way that no foodstuff and animal feed are contaminated. 2. Store in a cool, dry, well-ventilated, well-built room of sufficient dimensions and in its original containers, away from foodstuff and animal feeds. 3. If leakage or spillage occurs during transportation or storage, necessary measure should be taken to prevent poisoning and pollution of soil and water. Keep out of reach of children.

Safety Precautions: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animal food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation of the spray mist. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. 7. Do not spray against the wind.

Cautionary Statement: 1. Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. 2. Destroy the container after use as directed on leaflet. 3. This product is very toxic to aquatic organism therefore not to be used in and around aquaculture.

Disposal of used containers, washing from equipment and surplus material: 1. It shall be the duty of manufactures, formulators of fungicides and operators to dispose packages or surplus material and washings in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Chemical Composition:

Pyraclostrobin Technical A.I.	10.0% w/w
Thifluzamide Technical A.I.	10.0% w/w
Polyethyl methacrylatepolyethylene glycol graft copolymer	3.0% w/w
Styrenated phenol 54 moles	1.0% w/w
Sodium alkyl naphthalene sulfonate condensate	1.5% w/w
Sodium di-2-ethylhexyl sulphosuccinate aqueous soln	0.8% w/w
Propylene Glycol	6.5% w/w
Xanthum Gum	0.5% w/w
20% aqueous dipopylene glycol solution of 1,2-benzisothiazolin-3-one	0.5% w/w
Polydimethylsiloxane antifoam emulsion	0.3% w/v
De-ionized water	Q.S.
Total	**100.00% w/v**

Density = 1.06 - 1.12 " DANGEROUS TO RE USE EMPTY CONTAINER "

Manufactured & Marketed by: **GHARDA CHEMICALS LIMITED**

Regd. Office: 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400 050.

Factory: Plot No. C-4/1, Kherdi M.I.D.C. Village: Kherdi, Taluka: Chiplun. District: Ratnagiri, State: Maharashtra, Pincode- 415604.

HINDI

यामाकाजी

पायराक्लोस्ट्रोबिन 10% + थाईफ्लूझामाइड 10% भा/आ एस.सी.
(फफूंदीनाशक)

इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़े ।

पायराक्लोस्ट्रोबिन 10% + थाईफ्लूझामाइड 10% भा/आ एस.सी. की सिफारिश वावल की फसल को शीथबिट करनेवाला पानीबेट ऑगसी और पत्ती झुलसा के नियंत्रन के लिए अनुशंषित एक बहुत प्रभावी फफूंदीनाशक की तौर पर की जाती है।

सिफारिश:

फसल	रोगों के सामान्य नाम	खुराक प्रति हेक्टर		पानी की मात्रा (ली.)	फसल कटाई से पूर्व का अंतराल (दिन)	पुन: प्रवेश की अवधि (घंटे)
		सक्रीय तत्व (ग्रा.)	संरचना (मिली)			
धान	पर्णछेद ऑगसी, पत्ती झुलसा	८० + ८० से ९० + ९०	८०० - ९००	५००	१८	२४

उपयोग करने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिलायें

कीटनाशक अनुप्रयोग तकनीकी से संबंधित अच्छी अभ्यास

उपयोग के लिए निर्देश: फसल की ओर सीधा छिड़काव करें और एक समान और उचित कवरेज सुनिश्चित करें। टेक्टर में दिए गए सिफारिश के अनुसार धान में लगनेवाले रोगों के नियंत्रन में होलो कोन नोजल के साथ लगे हुए नेपसैक स्प्रेयर या हाइ वोल्यूम स्प्रेयर का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

मौसम की स्थिति: विशेषतः सुबह और शाम के घंटों के दौरान छिड़काव करें। बारिश या तेज़ हवा हो तब छिड़काव न करें।

मिट्टी और पानी: (जिस्से कभी जरूरी भी) मिट्टी और पानी की कोई विशिष्ट स्थिति निर्धारित नहीं है।

फसल अवस्था: खर रों रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर फसल वृद्धि के किसी भी चरण में उपरोक्त फसलों में लागू किया जा सकता है।

आवेदन तकनीक: रोगों के नियंत्रन में होलो कोन नोजल के साथ लगे हुए नेपसैक स्प्रेयर या हाइ वोल्यूम स्प्रेयर का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। उपयोग से पहले बोतल को अच्छी तरह हिलाएँ। उत्पाद की नापी गई मात्रा लें और इसमें थोड़ी मात्रा में पानी डालें, अच्छी तरह से मिलाएँ और फिर शेष मात्रा में पानी जोड़ें, उपयोग से पहले अच्छी तरह से हिलाएँ। फसल की ओर सीधा, एकसमान और उचित कवरेज से छिड़काव करें।

उपकरण प्रकार: नेपसैक स्प्रेयर

नोजल प्रकार: होलो कोन नोजल

खुराक: खुराक विवरण के लिए कृपया उपरोक्त तालिका देखें।

मिश्रण के लिए निर्देश: उत्पाद की मापित मात्रा लें और इसमें थोड़ी मात्रा में पानी डालें, फिर शेष मात्रा में पानी डालें। पौधों की कवरेज के लिए फिर किसी एक नेपसैक स्प्रेयर से फसल की समान रूप से, एकसमान और उचित कवरेज से छिड़काव करें।

पुन: प्रवेश अवधि: २४ घंटे

फसल कटाई से पूर्व का अंतराल: १८ दिन

आवेदन का समय और तरीका: सिफारिश किए गए फसलों पर रोगों का प्रकोप दरकार १०-१५ दिनों के बीच के अंतराल में छिड़काव कर सकते हैं।

आवेदन का समय: विशेषतः सुबह और शाम के घंटों के समय छिड़काव करें। तेज़ हवा या बारिश के दौरान छिड़काव न करें।

अधिक से अधिक कुल संख्या आवृत्ति: उपरोक्त तालिका में बताई गई खुराक खेत में पौध का प्रकोप ज्ञान पर १०-१५ दिनों के अंतराल पर १-२ छिड़काव लागू किया जा सकता है। परामर्शों में आवश्यकता होने पर अंतराल दोहराएँ।

चरम प्रतिबंध दौरान किसी भी फसल पर कीटनाशक नहीं लगाया जाना चाहिएँ: फसल अवस्था में दिए गये निर्देशानुसार ही मौष पर छिड़काव करें, किसी अन्य चरण में छिड़काव न करें।

विष के लक्षण: प्राथमिक लक्षण हो जी मिचलाना, उल्टी आना, आँख व त्वचा में जलनाहट, जुकाम और पेट में दर्द।

प्राथमिक उपचार: अगर गुंह में निगल लिया है: यदि व्यक्ति सचेत और सतर्क है, तो पानी से मुँह कुल्ला कराएँ और पानी के लिए १ या २ गिलास पानी दें। तब चेहरा व्यक्ति को मुँह से कुछ भी नहीं दें। डॉक्टर की सुलाहें। किसी उपस्थित चिकित्सक की सलाह उल्टी न कराने। यदि साँस में लिए जाने पर: रोगी को ताजी हवा में ले जाएँ और शरीर के तापमान का ख्याल रखें। यदि रोगी साँस नहीं ले पाता है या कठिनाई से साँस ले रहा है, तो कृत्रिम श्वसन दें, एक चिकित्सक को बुलाएँ। त्वचा के संपर्क के मामले में: शरीर के प्रभावित हिस्से को अच्छी तरह से साबुन से धोएँ और तालुकों सहित पानी का खुब इस्तेमाल करें। यदि दर्द, जलिमा या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श करें। सभी दूषित कपड़ों को अलग किया जाना चाहिएँ और उपयोग से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए। आँखों के संपर्क के मामले में: कम से कम ५ मिनट के लिए बहुत सारे पानी से धीरे-धीरे धोएँ। यदि दर्द, जलन, जलिमा या फोटोफोबिया बनी रहती है, तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें।

विषनाशक: कोई विशिष्ट उतारा नहीं, लक्षणात्मक इलाज करें।

पादप आविषाक्तता: सिफारिश के अनुसार उपयोग करने पर कोई फायतोटॉक्सिक नहीं।

भंडारण की शर्तें: १. इसका संचित तथा परिवहन इस तरह से किया जाए जिससे कोई खाद्य, घरेलू जानवरों, खाने-पीने के सामान तथा पशुआहार दूषित न हो। २. फफूंदीनाशक को इसके असली डिब्बे में खाद्य पदार्थ और पशुआहार से दूर रखें। संचित की जगह सूखी, ठंडी हो जिसका निर्माण सही ढंग से किया गया हो। जगह पर्याप्त लम्बी, चौड़ी हवादार और रोशनीदार हो। ३. इसक संचित व परिवहन के समय यदि फफूंदीनाशक गिर या फैल रहा हो तो जमीन और पानी को दूषित होने से रोकने के लिए जरूरी उपाय करें। बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

सुरक्षा के लिए सावधानियाँ: १. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुँह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचायें। ३. छिड़काव की धोंध को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएँ। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़ पहनें। ७. हवा के विपरीत दिशा में छिड़काव न करें।

सावधानियाँ कथन: १. लेबल और पत्रक पर जो वर्णित है, उसके सिवा उद्देश्य या उपयोग के लिए नहीं। २. पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात आद्यान को नष्ट करें। ३. यह उत्पाद जलीय जीवों के लिए बहुत ही विषैला होता है इसलिए जलीय कृषि में और इसके आस-पास उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

कीटनाशक के प्रयोग किये गए डिब्बों, उपकरणों से धुलाई और बचे हुए कीटनाशकों तथा घोलों के संचयन का निपटारा: १. यह कीटनाशकों के निर्माताओं, फॉरमूलेटरों फंगीसाइड की कार्यरत संस्था की पर्यावरणीय या जल प्रदूषण को रोकने की लिए एक सुरक्षित तरीके से पैकेज या अतिशेष सामग्री और धोवन का निपटान करें। २. उपयोग किए हुए पैकेज को खुले में न छोड़े ताकि उनका पुनरुपयोग ना किया जा सके। ३. पैकेज को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में दबा दिया गया है।

रासायनिक संरचना:

पायराक्लोस्ट्रोबिन टेक्निकल स.घ.	१०.०% भा/आ
थाईफ्लूझामाइड टेक्निकल स.घ.	१०.०% भा/आ
पोलीमिथाइल मेथाक्रीलेटपोलीइथिलीन ग्लाइकोल ग्राफ्ट कोपोलिमर	३.०% भा/आ
स्टायरीनेटेड फेनोल ५४ मोल्स	१.०% भा/आ
सोडियम अल्काइल नेफ्थालिन सल्फोनेट कन्डेंसेट	१.५% भा/आ
सोडियम डी-२-इथीलहेक्सील सल्फोसक्सीनेट एक्विएस सोल्यूशन	०.८% भा/आ
प्रोपिलीन ग्लाइकोल	६.५% भा/आ
क्सेंथियम गम	०.५% भा/आ
२०% एक्विएस डिपोपीलीन ग्लाइकोल सोल्यूशन ऑफ १,२-बेन्ज़ीसोथिआज़ोलिन-३-वन	०.५% भा/आ
पोलीडायमेथिलिलसिलॉक्सेन ऐंटिफॉम इमल्शन	०.३% भा/आ
डी-आयोनाइज्ड वॉटर	पर्याप्त मात्रा
कुल	१००.००% भा/आ

डेन्सिटी= १.०६-१.१२ " खाली कंटेनर का दोबारा उपयोग करना खतरनाक है । "

निर्माता और विक्रेता: **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**

पंजी. कार्यालय: ४८ हिल रोड बांद्रे (प.), **मुंबई - ४०० ०५०.**

फैक्टरी: प्लॉट नं.- सी-४/१, खेरडी एम.आय.डी.सी., गाँव: खेरडी, तालुका: चिपळुन, जिला: रत्नागिरी, राज्य: महाराष्ट्र, पिनकोड : ४१५६०४.

MARATHI

यामाकाझी

पायरॅक्लोस्ट्रोबिन १०% + थायफ्लुझामाइड १०% व/प्र एस.सी
(बुरशीनाशक)

वापरण्यापूर्वी माहिती पत्रक वाचा.

पायरॅक्लोस्ट्रोबिन १०% + थायफ्लुझामाइड १०% एस.सी.ही भात पिकाला संक्रमित करणारे शीथ ब्लाइट आणि लीफ ब्लास्टच्या नियंत्रणाचाठी शिफारस केलेले एक अतिशय प्रभावी बुरशीनाशक आहे.

शिफारस:

पीक	रोगाचे सामान्य नाव	प्रमाण प्रती हेक्टर		पाण्याची मात्रा (लिटर)	शाकीयांच्या कापणीच्या दरम्यानचा कालावधी (दिवस)	प्रत्येक फवारणीनंतर पुन्हा प्रवेशाचा कालावधी (तास)
		सक्रिय (ग्रा.)	सूत्रण (मि.ली.)			
भात	शिथ ब्लाइट, लीफ ब्लास्ट	८० + ८० ते ९० + ९०	८०० - ९००	५००	१८	२४

उपयोग करता पहेला सारी हीते हलावो

कीटकनाशक वापरतांची तांत्रीकी संबंधित चांगल्या पद्धती

वापरासाठी निर्देश: पिकावर थेट फवारणी करावी न एकसमान फवारणी करावी. तसेच्यात प्रदर्शिव्यापाणात नातापरील लक्षित रोगांविरुध्द होतो कोन नॉझल असलिलेल्या उच्च व्हॉल्यूम स्प्रेअरचे नेपसॅक स्प्रेअर वापरण्याची शिफारस केली जाते.

हवामानविषयी (सर्वसाधारण): शक्यतो सकाळ आणि संध्याकाळच्या वेळेत फवारणी करावी. वारे असताना व पावसापूर्वी फवारणी करू नये.

माती आणि पाणी (जिथे कधी जरूर असेल तिथे): माती आणि पाण्याची कोणतीही विशिष्ट परिस्थिती निर्धारित करलेली नाही.

फवारणीची पीक अवस्था: पिकांच्या वाढीच्या कोणत्याही टप्प्यावर रोगांचा प्रादुर्भाव होऊन आर्थिक नुकसान होत असल्यास निरुपीसाव आल्यास शिफारस केलेल्या पिकात फवारणी करता येते.

फवारणीचे तंत्र: रोगांचे कोन नॉझल बसविलेल्या उच्च व्हॉल्यूम स्प्रेअरचे नेपसॅक स्प्रेअर वापरण्याची शिफारस केली जाते. वापरण्यापूर्वी बाटली नीट हलवा. उत्पादनाचे मोजलेले प्रमाण घ्या आणि त्यात थोडा पाण्याचा प्रमाणात पाणी घाला, चांगले मिसळा आणि नंतर उरलेले पाणी घाला. वापरण्यापूर्वी चांगले ढवळा. एकसारखे फवारणी करावी व रोपावर फवारणीची योग्य व्याप्ती निश्चित करावी.

उपकरणाचा प्रकार: नेपसॅक स्प्रेअर

नोजलचा प्रकार: होलो कोन नोजल

मात्रा: डोज़ची विगतो साठे कृपा इथले उपरोक्त भलामण शेण्डकांसोबत संदर्भ लो.

मिश्रण साठे सूचना: उत्पादनाची फवारी मात्रेचे मापी घ्या आणि तिचे थोडी मात्रामधे पाणी साथे स्प्रारी सीते ढवाळी ला. होलो कोन नोजल साथे हीत ठेवेल अशा नेपसॅक स्प्रेअर साथे पाऊन कुल कव्हरेज साठे आवश्यक असेल तसे पाणी घालीतो पाखीतो पुरवी ओरो.

पुनःप्रवेश अवधि: २४ तास.

लागणी पहेलाची कापणीचाची: 18 दिवस

भरा करायची रीत आणे वेळ: भेतरमां रोगनो उपद्रव जोवा मळे त्यारे उपरोक्त पाकमां 10-15 दिवसना अंतरे लागू इरी शकाय.

भरणची वेळ: मुख्यपणे सवारे आणे संध्याच समये स्प्रे इरो. पवनना दिवसे अथवा वरसाद इरीमयान भरण इरवो नहीं.

स्प्रेनी महत्तम संख्या सहित आवर्तन: भलामण इरेल मात्रामां 10-15 दिवसना अंतरे 1-2 स्प्रे लागू इरी शकाय छे. जो जरूरी होय तो, भेटिडेसेनुं पुनरावर्तन इरो.

लागणनो ते पेहेलाना डोसथी पाछा पड़ वाळी वाळु न इरवा भोळीये: भरण माटे पाकना तबक्कामां सूचना मुजब स्प्रेरनुं पर्य भरण इरो. अन्य डोसथी भलामण भरण इरवी नहीं.

ओरमा लागवो: जो कोई व्यक्तिए गळी, तो सरूआतना लक्षणोमां ओकारी, उलटी, आंख अने चामडीमां ब्लास्टरा, जाडाना अने पेटमां दुःखावो होई शके छे.

प्राथमिक उपचार: जगर गुंह में निगल लिया है: यदि व्यक्ति सचेत और सतर्क है, तो पानी से मुँह कुल्ला कराएँ और पानी के लिए १ या २ गिलास पानी दें। तब चेहरा व्यक्ति को मुँह से कुछ भी नहीं दें। डॉक्टर की सुलाहें। किसी उपस्थित चिकित्सक की सलाह उल्टी न कराने। यदि साँस में लिए जाने पर: रोगी को ताजी हवा में ले जाएँ और शरीर के तापमान का ख्याल रखें। यदि रोगी साँस नहीं ले पाता है या कठिनाई से साँस ले रहा है, तो कृत्रिम श्वसन दें, एक चिकित्सक को बुलाएँ। त्वचा के संपर्क के मामले में: शरीर के प्रभावित हिस्से को अच्छी तरह से साबुन से धोएँ और तालुकों सहित पानी का खुब इस्तेमाल करें। यदि दर्द, जलिमा या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श करें। सभी दूषित कपड़ों को अलग किया जाना चाहिएँ और उपयोग से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए। आँखों के संपर्क के मामले में: कम से कम ५ मिनट के लिए बहुत सारे पानी से धीरे-धीरे धोएँ। यदि दर्द, जलन, जलिमा या फोटोफोबिया बनी रहती है, तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें।

विषनाशक: कोई विशिष्ट उतारा नहीं, लक्षणात्मक इलाज करें।

पादप आविषाक्तता: सिफारिश के अनुसार उपयोग करने पर कोई फायतोटॉक्सिक नहीं।

भंडारण की शर्तें: १. इसका संचित तथा परिवहन इस तरह से किया जाए जिससे कोई खाद्य, घरेलू जानवरों, खाने-पीने के सामान तथा पशुआहार दूषित न हो। २. फफूंदीनाशक को इसके असली डिब्बे में खाद्य पदार्थ और पशुआहार से दूर रखें। संचित की जगह सूखी, ठंडी हो जिसका निर्माण सही ढंग से किया गया हो। जगह पर्याप्त लम्बी, चौड़ी हवादार और रोशनीदार हो। ३. इसक संचित व परिवहन के समय यदि फफूंदीनाशक गिर या फैल रहा हो तो जमीन और पानी को दूषित होने से रोकने के लिए जरूरी उपाय करें। बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

सुरक्षा के लिए सावधानियाँ: १. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुँह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचायें। ३. छिड़काव की धोंध को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएँ। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़ पहनें। ७. हवा के विपरीत दिशा में छिड़काव न करें।

सावधानियाँ कथन: १. लेबल और पत्रक पर जो वर्णित है, उसके सिवा उद्देश्य या उपयोग के लिए नहीं। २. पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात आद्यान को नष्ट करें। ३. यह उत्पाद जलीय जीवों के लिए बहुत ही विषैला होता है इसलिए जलीय कृषि में और इसके आस-पास उपयोग नहीं किया जाना चाहिएँ।

कीटनाशक के प्रयोग किये गए डिब्बों, उपकरणों से धुलाई और बचे हुए कीटनाशकों तथा घोलों के संचयन का निपटारा: १. यह कीटनाशकों के निर्माताओं, फॉरमूलेटरों फंगीसाइड की कार्यरत संस्था की पर्यावरणीय या जल प्रदूषण को रोकने की लिए एक सुरक्षित तरीके से पैकेज या अतिशेष सामग्री और धोवन का निपटान करें। २. उपयोग किए हुए पैकेज को खुले में न छोड़े ताकि उनका पुनरुपयोग ना किया जा सके। ३. पैकेज को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में दबा दिया गया है।

रासायनिक रचना:

पायरक्लोस्ट्रोबिन टेक्निकल स.घ.	१०.०% व/व
थाइफ्लूझामाइड टेक्निकल स.घ.	१०.०% व/व
पोलीमिथाइल मेथाक्रीलेटपोलीइथिलीन ग्लाइकोल ग्राफ्ट कोपोलिमर	३.०% व/व
स्टायरेनेटेड फेनोल ५४ मोल्स	१.०% व/व
सोडियम अल्किल नेफ्थालिन सल्फोनेट कन्डेंसेट	१.५% व/व
सोडियम डी-२-इथीलहेक्सील सल्फोसक्सीनेट एक्विएस सोल्यूशन	०.८% व/व
प्रोपिलीन ग्लाइकोल	६.५% व/व
जैंथ्यूम गम	०.५% व/व
२०% जैव्हीयस डाइपोपीलिन ग्लायकोल सोल्युशन १,२-बेन्झीसोथिआझोलिन-३-वान	०.५% व/व
पोलीडायमेथिलसिलॉक्सेन ऐंटिफोम इमल्शन	०.३% व/व
डी-आयोनाइज्ड पाणी	पुरेसा प्रमाण
एकूण:	**१००.००% व/व**

घनता = 1.06 - 1.12 " रिकाम्ये कंटेनर पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे."

उत्पादन कर्ता व विक्रेता: **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**

स्त्री. कार्यालय : ४८ हिल रोड, बांद्रे (प.), मुंबई- ४०००५०. भारत.

कंपनी: प्लॉट नं.- सी-४/१, खेरडी एम.आय.डी.सी., गाव : खेरडी, तालुका: चिपळुण, जिल्हा : रत्नागिरी, राज्य : महाराष्ट्र, पिनकोड : ४१५६०४. भारत.

GUJARATI

ચામાકાઝી

પાયરાકલોસ્ટ્રોબિન 10% + થીફ્લુઝામાઈડ 10% વ/વ એસ.સી,
(ફૂગનાશક)

વાપરતાં પહેલાં પત્રિકા વાંચો.

પાયરાકલોસ્ટ્રોબિન 10% + થીફ્લુઝામાઈડ 10% એસ.સી. એ ખૂબ જ અસરકારક ફૂગનાશક છે જે ચોખાના પાકને સંક્રમિત કરતા શીથ બ્લાઈટ અને લીફ બ્લાસ્ટના નિયંત્રણ માટે ભલામણ કરેલ છે.

ભલામણ:

પાક	રોગનું સામાન્ય નામ	ડોઝ/હેક્ટર		પાણીમાં મિશ્રણ (લિટર)	લણણી પહેલાંનો સમયમર્યાદા (દિવસ)	ફરીથી પ્રવેશ માટે નો સમયમર્યાદા (કલાક)
		એક્ટિવ (ગ્રામ)	ફોર્મ્યુલેશન (મિલી)			
ચોખા	શીથ બ્લાઈટ, લીફ બ્લાસ્ટ	૮૦ ૮૦ થી 90 - 90	800- 900	500	18	24

ઉપયોગ કરતા પહેલા સારી રીતે હલાવો

કીટકનાશક વપરાશની તકનીકી સંબંધિત સારી પદ્ધતિઓ

ઉપયોગની દિશા: પાક તરફ સીધો સ્પ્રે કરો અને એકસમાન અને યોગ્ય કવરેજની ખાતરી કરો. કાખઝક્ષ ફ્રાઈવ્સ મુજબ ચોખામાં લક્ષિત રોગો સામે ફોલો કોન નોઝલ સાથે હીટ કરેલ ઉચ્ચ વોલ્યુમ સ્પ્રેયરનો નેપસેક સ્પ્રેયરનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

હવામાનની સ્થિતિ (સામાન્ય રીતે): મુખ્યપણે સવારે અને સાંજના સમયે સ્પ્રે કરો. પવનના દિવસે અથવા વરસાદ પહેલાં ખરાબ કરશો નહીં.

માટી અને પાણી (જ્યાં પણ લાગુ હોય): કોઈ ચોક્કસ માટી અને પાણીની સ્થિતિ સૂચવવામાં આવી નથી.

અરજી માટે પાકનો તબક્કો: ભલામણ કે રોગ. પાકની વૃદ્ધિના કોઈપણ તબક્કે લાગુ કરી શકાય છે જ્યારે રોગોના ઉપદ્રવને આર્થિક નુકસાન થાય છે.

એપ્લિકેશન તકનીકો: હોલો કોન નોઝલ સાથે હીટ કરેલ ઉચ્ચ વોલ્યુમ સ્પ્રેયરના નેપસેક સ્પ્રેયરનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. ઉપયોગ કરતા પહેલા બોટલને સારી રીતે હલાવો. ઉત્પાદનની માપેલ જથ્થો લો અને તેમાં થોડી માત્રામાં પાણી ઉમેરો, સારી રીતે મિક્સ કરો અને પછી બાકીનું પાણી ઉમેરો. ઉપયોગ કરતા પહેલા સારી રીતે હલાવો. બરાબરખી રીતે સ્પ્રે કરો અને છોડ પર સ્પ્રેનો યોગ્ય કવરેજની ખાતરી કરો.

સાધનોનો પ્રકાર: નેપસેક સ્પ્રેયર

નોઝલનો પ્રકાર: હોલો શંકુ નોઝલ

માત્રા: ડોઝની વિગતો માટે કૃપા કરીને ઉપરોક્ત ભલામણ કોષ્ટકનો સંદર્ભ લો.

મિશ્રણ માટે સૂચનાઓ: ઉત્પાદનની જરૂરી માત્રાને માપો અને તેને થોડી માત્રામાં પાણી સાથે સારી રીતે ભળી લો. હોલો કોન નોઝલ સાથે હીટ કરેલ યોગ્ય નેપસેક સ્પ્રેયર સાથે પાકના કુલ કવરેજ માટે સ્પેક્ટર્સ દિશી મુજબ કરેલ પાણીની બાકીનો પુરવો ઉમેરો.

પુનઃપ્રવેશ અવધિ: 24 કલાક.

લણણી પહેલાની સમયમર્યાદા: 18 દિવસ

અરજી કરવાની રીત અને સમય : ખેતરમાં રોગનો ઉપદ્રવ જોવા મળે ત્યારે ઉપરોક્ત પાકમાં 10-15 દિવસના અંતરે લાગુ કરી શકાય.

અરજીનો સમય : મુખ્યપણે સવારે અને સાંજના સમયે સ્પ્રે કરો. પવનના દિવસે અથવા વરસાદ દરમિયાન અરજી કરશો નહીં.

સ્પ્રેની મહત્તમ સંખ્યા સહિત આવર્તન: ભલામણ કરેલ માત્રામાં 10-15 દિવસના અંતરે 1-2 સ્પ્રે લાગુ કરી શકાય છે. જો જરૂરી હોય તો, એપ્લિકેશનનું પુનરાવર્તન કરો.

લગાડતો કે ન કરવાનાં દશેયાન કીટનાશક પાક પર જંતુનાશકો લાગુ ન કરવા જોઈએ: અરજી માટે પાકના તબક્કામાં સૂચના મુજબ સ્પ્રેનો જ અરજી કરો, અન્ય કોઈપણ તબક્કામાં અરજી કરશો નહીં.

ઝેરના લક્ષણો: જો ગળી જવામાં આવે, તો શરૂઆતના લક્ષણોમાં ઉબકા, ઉલટી, આંખ અને ચામડીમાં બળતરા, ઝાડા અને પેટમાં દુખાવો હોઈ શકે છે.

પ્રાથમિક ઉપચાર: અગર ગુંહ માં નિગલ લિયા કે: યદિ વ્યક્તિ સચેત અને સતર્ક છે, તો પાની સે મુંહ કુલ્લા કરાયેં ઔર પાની કે લિએ ૧ યા ૨ ગિલાસ પાની દેં। તબ ચેહરા વ્યક્તિ કો મુંહ સે કુછ ભી નહીં દેં। ડોક્ટર કી સુલાહેં। કિસી ઉપસ્થિત ચિકિત્સક કી સલાહ ઉલ્ટી ન કરાને। યદિ સાંસ મેં લિએ જાને પર: રોગી કો તાજી હવા મેં લે જાઈં ઔર શરીર કે તાપમાન કા ખ્યાલ રખેં। યદિ રોગી સાંસ નહીં લે પ્રતા હૈ યા કઠિનાઈ સે સાંસ લે રહા હૈ, તો કૃત્રિમ શ્વસન દેં, એક ચિકિત્સક કો બુલાએં। ત્વચા કે સંપર્ક કે મામલે મેં: શરીર કે પ્રભાવિત હિસ્સે કો અચ્છી તરહ સે સાબુન સે ધોએં ઔર તાલુકોં સહિત પાની કા ખુબ ઇસ્તેમાલ કરેં। યદિ દર્દ, લાલિમા યા જલન બની રહતી હૈ, તો ડોક્ટર સે પરામર્શ કરેં। સભી દૂષિત કપડોં કો અલગ કિયા જાના ચાહિએં ઔર ઉપયોગ સે પહલે સાબુન ઔર પાની સે અચ્છી તરહ સે ધોના ચાહિએ। આંખોં કે સંપર્ક કે મામલે મેં: કમ સે કમ ૫ મિનટ કે લિએ બહુત સારે પાની સે ધીરે-ધીરે ધોએં। યદિ દર્દ, જલન, લાલિમા યા ફોટોફોબિયા બની રહતી હૈ, તો નેત્ર રોગ વિશેષજ્ઞ સે સલાહ લેં।

વિષનાશક: કોઈ વિશિષ્ટ ઉતારા નહીં, લક્ષણાત્મક ઇલાજ કરો.

વનસ્પતિ વિષાક્તતા: ભલામણ કરેલ ડોઝ પર બિન ફાયટોટોક્સિક.

સ્ટોરેજ શરતો: ૧. ઉત્પાદનનો સંગ્રહ અને પરિવહન એવી રીતે થવો જોઈએ કે કોઈ પણ ખાદ્ય સામગ્રી અને પશુ આહાર દૂષિત ન થાય. ૨. ફાયટોલોજી તોડાં અને પ્રાણીઓના ખોરાકથી દૂર, ઠંડા, સૂકા, સારી રીતે વેન્ટિલેટેડ, પર્યાપ્ત પરિમાણમાં સારી રીતે બંધાયેલા રૂમમાં અને તેના મૂળ કન્ટેનરમાં સ્ટોર કરો. ૩. જો પરિવહન અથવા સંગ્રહ દરમિયાન લીકેજ અથવા ફેલાવેજ થાય છે, તો જમીન અને પાણીને ઝેર અને પ્રદૂષણને રોકવા માટે જરૂરી પગલાં લેવા જોઈએ. બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો.

સુરક્ષા સાવચેતીઓ: ૧. ખાદ્યપદાર્થો, ખાલી પાત્રો અને પ્રાણીઓના ખોરાકથી દૂર રાખો. ૨. મોં, આંખ અને

TAMIL

யமகாசி

பைராக்ஸோஸ்ட்ரோபின் 10% + இப்ஃப்ளுசுஜமைடு 10% டபிள்யூ/வி எஸ்சி

உயரியசிப்பூஞ்சக்கொல்லி (முன்பு கீழ் கண்டவை பயன்கள்)

பைராக்ஸோஸ்ட்ரோபின் 10% - இப்ஃப்ளுசுஜமைடு 10% எஸ்சி தொடர்பயிர்களுக்கு தாக்கம் இல்லைஎன்றாலும் மற்றும் குறைவு நோய் ஆபியல்புகளைக் கட்டுப்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. பயன்பாடு: பயறுவகை பூஞ்சாணக் கொல்லி மற்றது ஆகும்.

பரிந்துரை:

பயிர்	நோய்களின் பொதுவான பெயர்	மருந்தளவு/ஹெக்டேர்		தெளிப்பு நீரின் அளவு (லி)	முன் கலப்பறுப்பு இடைவெளி (நாட்கள்)	மருந்துவழங்கு காலம் (நாட்கள்)
		எ.மு (கி)	உருவாக்கம் (எம்எல்)			
நெலவி	தெல் இலைபுள்ளி கருகல் தோடு குலை தேய்வு	80 + 80 to 90 + 90	800 - 900	500	18	24

TELUGU

యమకాజి

పైరాక్స్త్రాబిన్ 10% + భయప్లుజామైడ్ 10% డబ్ల్యూ/వి ఎస్సి

ఉపయోగించదగిన ముందు కనుక్కుంద చదవండి. (శిలీంధ్రనాశిని)

పైరాక్స్త్రాబిన్ 10% + భయప్లుజామైడ్ 10% ఎస్సి యు పంట్లకు వర్తించుకోవడం జరిగింది, ఇవి పప్పుధాన్యాల శిలీంధ్రనాశిని. మరియు అగ్రికల్చర్ వినియోగం కొరకు సిఫారసు చేయబడుతుంది.

విధానము:

పంట	తెగుళ్ళ సాధారణ పేరు	మోతాదు/హెక్టేరుకు		కలపవలసిన నీళ్ళు (లీటర్లు)	కోత ముందు కాయపక్వత (రోజులు)	ఉపసంహరణ కాలము (గంటలు)
		మి.లి (గ్రా)	మాత్రలు (ఎమ్.ఎల్)			
పప్పు	ఎండుపుడి (మూడుపు) ఆస్కొకైటస్	80 + 80 to 90 + 90	800 900	500	18	24

MALAYALAM

യമകാസി

പൈറക്സ്ട്രോബിൻ 10% + ഫ്ലുഇമാക്സാമൈഡ് 10% ഡബ്ല്യു/വി എസ്സി

ലയിക്കാവുന്ന സാന്ദ്രീകരണം (ശിലീന്ധ്രനാശിനി)

പൈറക്സ്ട്രോബിൻ 10% + ഫ്ലുഇമാക്സാമൈഡ് 10% എസ്സി യും പയറുവർഗ്ഗ കീടങ്ങൾക്കെതിരെ ശിലീന്ധ്രനാശിനി ഫലപ്രദമായ കീടനാശിനിയാണ്. ഇവയ്ക്കു ഭൂമിയുടെ മീതെ സ്പ്രേചെയ്തു ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ഉപയോഗങ്ങൾ:

ബീജ്	രോഗങ്ങളുടെ പൊതുവായ പേര്	മരുന്നിന്റെ അളവ്		ലിക്വിഡ് നിറയ്ക്കുന്ന അളവ് (ലിറ്റർ)	വിളവെടുപ്പിനു മുമ്പുള്ള കാലയളവ് (ദിവസങ്ങൾ)	പുനരുപയോഗ കാലയളവ് (മിനുക്കൾ)
		എ.മു.(ഗ്രാം)	ഫോർമുലേഷൻ (എം.എൽ)			
നെല്ല്	ഷീത്ത് ബ്ലൈറ്റ് ലീഫ് ബ്ലൈറ്റ്	80 + 80 to 90 + 90	800 - 900	500	18	24

TAMIL

ইয়ামাকাজি

পাইরাক্লোস্ট্রোবিন 10% + থাইফ্লুজ্যামাইড 10% ডব্লিউ/ভি এসসি

(ছত্রাকনাশক)

ব্যবহারের পূর্বে নিম্নলেখি পড়ে নিন।

পাইরাক্লোস্ট্রোবিন 10% + থাইফ্লুজ্যামাইড 10% এসসি হল একটি আধুনিক কার্যকরী ছত্রাকনাশক যা ধান গাছের কাণ্ড ঝলসানি দাগ ধরে যাওয়া বা শীষ ঝলসি ও শস্যের অন্যান্য বিভিন্ন রোগের ছোপ দেখা যায় যা বিভিন্ন ফসলের নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

YAMAKAZI®

Pyraclostrobin 10%+
Thifluzamide 10% w/v SC
(Fungicide)

यामाकाजी

पायराक्लोस्ट्रोबिन १०% + थाईफ्लूझामाइड १०% भा/आ एस.सी.
(फफूंदीनाशक)

DIRECTION FOR USE

FOR AGRICULTURAL USE
कृषि उपयोग के लिए
Read Leaflet Before Use
इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

Manufactured & Marketed by:
GHARDA CHEMICALS LIMITED
Regd. Office: 48 Hill Road,
Bandra (W), Mumbai - 400 050.
For any complaints, contact Customer Care Executive at Gharda Chemicals Limited, 48, Hill Road, Bandra (W), Mumbai-400050,
Tel.: 022 66265998/66265999,
Email: consumercare@gharda.com
Website: www.gharda.com

® - Registered Trademark of Gharda Chemicals Limited.

K.01.25-01

பயன்படுத்துவதற்கு முன் நன்றாக குலுக்கவும்

பூச்சிக்கொல்லியி பயன்பாட்டு குறிப்புகள்:

பயன்படுத்தும் இடம்: பயிர்கள் மேல் தெளித்தல் ஈரான மற்றும் பயிர்கள் முழுவதும் நன்கு நனைந்து செய்ய வேண்டும். அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள அளவு செறிவமிகுதியில் மருந்தினை கலந்து தெளிக்கவேண்டும். மருந்தினை கலக்கும் பொழுதும் தெளிக்கும் பொழுதும்பட்ட அதே அளவு தெளிப்பான் கொண்ட நாப்சாக் தெளிப்பான் பயன்படுத்துவதுடன் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

வானிலை நிலை (பொருட்களை: காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் தெளிக்க வேண்டும். அதிக காற்று வீசும் நாளிலோ அல்லது மழைக்கு முன்னாலோ பயன்படுத்தக் வேண்டாம்.

மண் மற்றும் நீர் பயன்படுத்தும் இடங்களில்: குறிப்பிட்ட மண் மற்றும் நீர் நிலைகளுக்கான குறிப்பு பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.

பயன்படுத்துவதற்கான பயிர் நிலை: பயிர் வளரக்கிடக்க எந்த நிலையிலும் நோய்களின் தாக்கம் தென்படும் போது இறுக்க பூச்சாணனைக் கொல்லி மறுதளவு பயன்படுத்தவும்.

பயன்பாட்டு வகுப்புகள் பயிர் நிலை: பயிர் வளரக்கிடக்க எந்த நிலையிலும் நோய்களின் தாக்கம் தென்படும் போது இறுக்க பூச்சாணனைக் கொல்லி மறுதளவு பயன்படுத்தவும்.

பயன்பாட்டு தொடர்கள் பயிர் நிலை: பயிர் வளரக்கிடக்க எந்த நிலையிலும் நோய்களின் தாக்கம் தென்படும் போது இறுக்க பூச்சாணனைக் கொல்லி மறுதளவு பயன்படுத்தவும்.

பயன்பாட்டு குறிப்புகள்: ஒவ்வொரு கூடப் நாளிலான பொருத்திப்பட்ட அதிக அளவு தெளிப்பான் கொண்ட நாப்சாக் ஸ்ப்ரேயர் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. பயிர்களுக்கு முன்பு மருந்து 1 லிட்டரை நன்றாக குலுக்கவும். பரிந்துரைக்கப்பட்ட மருந்தினை அளவிடை எடுத்து அதுடன் சிறிதளவு தண்ணீரி சேர்த்து நன்கு கலக்கவும். பின்னர் மீதமுள்ள அளவு தண்ணீரி சேர்த்து, பயன்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக நன்கு கிளறவும். பயிரின் அமைக்கிறது பகுதியிலும் பரவ படை தெளிப்பைப் உபயோகிக்கவேண்டும்.

உபகரண வகை: கை பொன் ஸ்ப்ரேயர்

நாசி வகை: வெற்ற கூம்பு நாசி

கலப்பதுக்கான வழிமுறைகள்: தேவையான அளவு மருந்தினை அளந்து ஒரு சிறிய அளவு தண்ணீரில் நன்றாக கலக்கவும். பெரிய நாசியை பின் கலந்துவைக்கப்பட்ட பொருக்கலவை ஊட்டவைக்க வெளிப்பகுதி மூலம் பயிர்களின் பொக்கை பகுதியும் மண்ணையும் வெளிக்கொள்ளவும்.

மறு தளவுகளுக்கு: 24 மணி நேரம்.

அறுவடைக்கு முந்தைய இடைவெளி: 18 நாட்கள்

பயன்படுத்தும் முறை மற்றும் நேரம்: வயலில் நோய்களின் தாக்கம் காணப்பட்டால் 10-15 நாட்கள் இடைவெளியில் மேற்கண்ட பயிர்களுக்கு இடவும்.

பயன்படுத்தும் முறை: காலை மாலை நோய்களின் தொடக்க வேளையும், காய்ந்துவிடுவதால் மாலையோ அல்லது மழைக்கு வாய்ப்பில்லா பயன்படுத்தக்கூடாது.

மருந்து பயன்படுத்தும் முறை: 10-15 நாட்கள் இடைவெளியில் ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை செய்கிறதை. வெட்டுகளை பட்டாம், பயன்பாட்டை தீண்டும் செய்யவும்.

பூச்சிக்கொல்லிகளை கந்த பயிரிலும் பயன்படுத்தக் கூடாத நிலைகள்: பயிர் மிகவும்மிக அரிய நுண்ணுயிர்களாக மேலைப்பகுதியை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும், வேறு உதவிகளைப் பயன்படுத்தக் வேண்டாம்.

நச்சுத்தன்மைமின் அறிவுறுதிகள்: உட்கொண்டால், ஆழ்ந்ப அரிஇரிங்கல் ஏற்படல், வாந்தி, கண் மற்றும் தோலுக்கு எரிச்சல், வயிற்றுப்பாதுகாக்க மற்றும் வயிறு வலி ஆகியவற்றின் கலவையாக இருக்கலாம்.

முதலுதவி முறைகள்: உடனடியாக ஏராளமான அளவுக்கு உப்பு கலந்த நீரை அருந்தினால்வலுக்கு வரிழிப்பதுடன் இறுதுதல். தண்ணீரில் வாயை கொப்பளித்து, 1 அல்லது 2 கிராம் தண்ணீரில் குடிக்க கொடுங்கள். சுயநினைவிழந்தால் ஒருவருக்கு எப்பாவது வாயால் கொடுக்கவேண்டாம் மருத்துவரை அழைக்கவும். மருத்துவரிடம் கொண்டு வரும்போதுபூச்சி மருந்தினை கொண்டு வரவும். உணவுகளிலிருந்து விலகி இருக்கவும். 3 மொத்தவுறுதிகளுக்கு அல்லது மொபிப்பின் போது கவிவு அல்லது அசிவு ஏற்படலாம். மண் மற்றும் நீர் நச்சுத்தன்மை மற்றும் பாலூட்டிகளுக்கு கடுக்க கொடுக்கப்படுவதை பட்டையாக வேண்டும். ஒருங்கிணைக்கப்பட்டபடி வைப்பாகம்.

பாதுகாப்பு ஒன்கொள்ளக்கூடிய நடவடிக்கை: 1. உணவுப் பொருட்கள், பொருள் உணவுப் பாலிப்பைகள் மற்றும் விலைகளு உணவுவைப்பிறகு விலங்கு இருக்கவும். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் தோலுடன் தொடர்பு கொள்வதைத் தவிர்க்கவும். 3. எப்போது மறுபயன்பாடு உணிமுட்பாதைத் தவிர்க்கவும். 4. அக்கத்துமாக துண்டிக்கள் மற்றும் கண்டிக்க பாகங்களை தொடர்பு பிறகு நன்கு கழுவ வேண்டும். 5. தொடர்ந்து பாதுகாப்பிக்கான, ஒருக்கான சாப்பிட வேண்டாம். செல்லாத சாப்பிட வேண்டாம். 6. கலந்தபொருளுக் தொடர்கொள்ளாமல் மறுபடி (முழு) ஏதுகளாக) உடை கலக்க அணிவிக்கவும். 7. காற்றுக்கு எதிராக தெளிக்க வேண்டாம்.

எச்சரிக்கை அறிக்கை: 1. எரிதுறுதல்கள் 2. தோல் மற்றும் பார்க்கின்ற பிரச்சினை மட்டும் கடுக்க பயன்பாட்டை வேண்டும். 3. குறிப்பிடுகிறதுதில் 4. குறிப்பிட்டுள்ளபடி பயன்படுத்திய பிறகு கொள்ளவுதை அதிக்கவும். 5. இந்த தயாரிப்பு நிர்வாண உயிரினங்களுக்கு மிகவும் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது. எனவே நிர்வாண உயிரின வாழ்விடங்களுக்கு சாரிப்பயன்படுத்தவும் பயன்படுத்தக்கூடாது.

பயன்படுத்தும் கொள்ளக்கூடிய அகற்றுதல், உபயோகங்கள் மற்றும் உபரி பொருட்களிலிருந்து கழுவுதல்: 1. காலியாகிறதுவும் அல்லது நிர் பாலப்படுவதைக் குடுக்கும் கலைப்பிற அல்லது உபரிப் பொருட்கள் மற்றும் உபரி மருந்துகளை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்துவதுடன் மருந்துகளை கொல்லிகளை உருவாக்குவதுடன் மாசுபாடு ஏற்படாமல் விடாமலிருக்க கவனமாக இருக்கவேண்டும். 2. பயன்படுத்தப்பட்ட கலங்களை மீண்டும் பயன்படுத்த கூடாது. 3. பொட்டலங்களை உடைக்கவும் துளையிடுவதுடன் பாதுகாக்கு வெளியே. 4. பொட்டலங்களை மறுபயன்பாடு செய்யக்கூடாது.

பிரபாக்ட் சிக்னல்:

ஹைட்ரோஸ்ட்ரோபின்	10.0% வெய்ட்/வி
ஃப்ளுஜுஜாமைட்	10.0% வெய்ட்/வி
பாலியுரேதிலைன் மெத்தாக்ஸாலைட் போலாக்ஸிமர்	3.0% வெய்ட்/வி
சிலிகான் கலப்பு சோர்பிடால்	1.0% வெய்ட்/வி
ஸைடூரோட்டட் பினோல் 54 மோல்கள்	1.0% வெய்ட்/வி
சோடியம் ஆல்கைல் நாப்தலீன் சல்பானேட் அமுக்கம்	1.5% வெய்ட்/வி
சோடியம் லைட் தடுப்பெறுக்கைகளை சல்பாக்சிலேட்	0.8% வெய்ட்/வி
நீரியக் கரைசல்	
சாரமிடுவதில் கிளைசரால்	6.5% வெய்ட்/வி
சாமந்தம் கம்	0.5% வெய்ட்/வி
1,2-பென்சிசோதியாஸோலின்-3-ஒன் 70% அக்டிவ் ஏ.ஐ. பாலிஸின்	0.5% வெய்ட்/வி
கிளைகளால் கரைசல்	
பாலிடைமெதிலிஸிலாக்சேன் ஆன்டிஃபோம் இமல்ஷன்	0.3% வெய்ட்/வி
அனாலிடிகலாக செய்யப்பட்ட நீர்	100.0% வெய்ட்/வி
மொத்தம்	100.00% டபிள்யூ/வி

அடர்த்தி = 1.06 - 1.12 "வெற்று கொள்கலனை பயன்படுத்துவது அபாயகரமானது"

கயாரிப்பு மற்றும் உச்சக்கை பயன்படுத்துவதுக்கான **கர்டா கெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட்.**

பதிவு அலுவலகம்: 48 ஹில் ரோடு, பாந்த்ரா (டபிள்யூ), மும்பை - 400050. இந்தியா.

தொழிற்சாலை: ரிசா - 396 411, பல்சார் மாவட்டம், குஜராத், சி.டி.ஐ.ஆர்.ஏ. பிளாட்டுகள்: ஒர்கா 1 மற்றும் 2, ஏ.ஐ.டி.ஐ.ஆர்.ஏ. பிளாட்டுகள் 2 மற்றும் 3, ஜிஐடிஸி, ஜாம்நகர் - 361004, ஜாம்நகர் மாவட்டம், குஜராத் மாநிலம், இந்தியா.

விநியோகிக்கும் முன் நன்றாக கலக்கவும்

விநியோகிக்கும் வழிமுறைகள் கலப்பதுக்கு விகிதம்

விநியோகிக்கும் நோக்கம்: பைராக்ஸோஸ்ட்ரோபின் 10% + ஃப்ளுஜுஜாமைட் 10% எஸ்சி யு பயிர்களுக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

பிரேரக் நிலையம் (ஹ்ரமெனாடு): கலப்பை மற்றும் மானால் தேர்ந்தெடுக்கி தெளிக்க வேண்டும். அதிக காற்று வீசும் நாளிலோ அல்லது மழைக்கு முன்னாலோ பயன்படுத்தக் வேண்டாம்.

மண் மற்றும் நீர் பயன்படுத்தும் இடங்களில்: குறிப்பிட்ட மண் மற்றும் நீர் நிலைகளுக்கான குறிப்பு பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.

பயன்படுத்துவதற்கான பயிர் நிலை: பயிர் வளரக்கிடக்க எந்த நிலையிலும் நோய்களின் தாக்கம் தென்படும் போது இறுக்க பூச்சாணனைக் கொல்லி மறுதளவு பயன்படுத்தவும்.

பயன்பாட்டு வகுப்புகள் பயிர் நிலை: பயிர் வளரக்கிடக்க எந்த நிலையிலும் நோய்களின் தாக்கம் தென்படும் போது இறுக்க பூச்சாணனைக் கொல்லி மறுதளவு பயன்படுத்தவும்.

பயன்பாட்டு தொடர்கள் பயிர் நிலை: பயிர் வளரக்கிடக்க எந்த நிலையிலும் நோய்களின் தாக்கம் தென்படும் போது இறுக்க பூச்சாணனைக் கொல்லி மறுதளவு பயன்படுத்தவும்.

பயன்பாட்டு குறிப்புகள்: ஒவ்வொரு கூடப் நாளிலான பொருத்திப்பட்ட அதிக அளவு தெளிப்பான் கொண்ட நாப்சாக் ஸ்ப்ரேயர் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. பயிர்களுக்கு முன்பு மருந்து 1 லிட்டரை நன்றாக குலுக்கவும். பரிந்துரைக்கப்பட்ட மருந்தினை அளவிடை எடுத்து அதுடன் சிறிதளவு தண்ணீரி சேர்த்து நன்கு கலக்கவும். பின்னர் மீதமுள்ள அளவு தண்ணீரி சேர்த்து, பயன்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக நன்கு கிளறவும். பயிரின் அமைக்கிறது பகுதியிலும் பரவ படை தெளிப்பைப் உபயோகிக்கவேண்டும்.

உபகரண வகை: கை பொன் ஸ்ப்ரேயர்

நாசி வகை: வெற்ற கூம்பு நாசி

கலப்பதுக்கான வழிமுறைகள்: தேவையான அளவு மருந்தினை அளந்து ஒரு சிறிய அளவு தண்ணீரில் நன்றாக கலக்கவும். பெரிய நாசியை பின் கலந்துவைக்கப்பட்ட பொருக்கலவை ஊட்டவைக்க வெளிப்பகுதி மூலம் பயிர்களின் பொக்கை பகுதியும் மண்ணையும் வெளிக்கொள்ளவும்.

மறு தளவுகளுக்கு: 24 மணி நேரம்.

கீக்க மும்பு காயபுக்கு: 18 நாட்கள்

பயன்படுத்தும் முறை மற்றும் நேரம்: நோய்கள் தாக்கம் காணப்பட்டால் 10-15 நாட்கள் இடைவெளியில் மேற்கண்ட பயிர்களுக்கு இடவும்.

பயன்படுத்தும் முறை: காலை மாலை நோய்களின் தொடக்க வேளையும், காய்ந்துவிடுவதால் மாலையோ அல்லது மழைக்கு வாய்ப்பில்லா பயன்படுத்தக்கூடாது.

மருந்து பயன்படுத்தும் முறை: 10-15 நாட்கள் இடைவெளியில் ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை செய்கிறதை. வெட்டுகளை பட்டாம், பயன்பாட்டை தீண்டும் செய்யவும்.

பூச்சிக்கொல்லிகளை கந்த பயிரிலும் பயன்படுத்தக் கூடாத நிலைகள்: பயிர் மிகவும்மிக அரிய நுண்ணுயிர்களாக மேலைப்பகுதியை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும், வேறு உதவிகளைப் பயன்படுத்தக் வேண்டாம்.

நச்சுத்தன்மைமின் அறிவுறுதிகள்: உட்கொண்டால், ஆழ்ந்ப அரிஇரிங்கல் ஏற்படல், வாந்தி, கண் மற்றும் தோலுக்கு எரிச்சல், வயிற்றுப்பாதுகாக்க மற்றும் வயிறு வலி ஆகியவற்றின் கலவையாக இருக்கலாம்.

முதலுதவி முறைகள்: உடனடியாக ஏராளமான அளவுக்கு உப்பு கலந்த நீரை அருந்தினால்வலுக்கு வரிழிப்பதுடன் இறுதுதல். தண்ணீரில் வாயை கொப்பளித்து, 1 அல்லது 2 கிராம் தண்ணீரில் குடிக்க கொடுங்கள். சுயநினைவிழந்தால் ஒருவருக்கு எப்பாவது வாயால் கொடுக்கவேண்டாம் மருத்துவரை அழைக்கவும். மருத்துவரிடம் கொண்டு வரும்போதுபூச்சி மருந்தினை கொண்டு வரவும். உணவுகளிலிருந்து விலகி இருக்கவும். 3 மொத்தவுறுதிகளுக்கு அல்லது மொபிப்பின் போது கவிவு அல்லது அசிவு ஏற்படலாம். மண் மற்றும் நீர் நச்சுத்தன்மை மற்றும் பாலூட்டிகளுக்கு கடுக்க கொடுக்கப்படுவதை பட்டையாக வேண்டும். ஒருங்கிணைக்கப்பட்டபடி வைப்பாகம்.

பாதுகாப்பு ஒன்கொள்ளக்கூடிய நடவடிக்கை: 1. உணவுப் பொருட்கள், பொருள் உணவுப் பாலிப்பைகள் மற்றும் விலைகளு உணவுவைப்பிறகு விலங்கு இருக்கவும். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் தோலுடன் தொடர்பு கொள்வதைத் தவிர்க்கவும். 3. எப்போது மறுபயன்பாடு உணிமுட்பாதைத் தவிர்க்கவும். 4. அக்கத்துமாக துண்டிக்கள் மற்றும் கண்டிக்க பாகங்களை தொடர்பு பிறகு நன்கு கழுவ வேண்டும். 5. தொடர்ந்து பாதுகாப்பிக்கான, ஒருக்கான சாப்பிட வேண்டாம். செல்லாத சாப்பிட வேண்டாம். 6. கலந்தபொருளுக் தொடர்கொள்ளாமல் மறுபடி (முழு) ஏதுகளாக) உடை கலக்க அணிவிக்கவும். 7. காற்றுக்கு எதிராக தெளிக்க வேண்டாம்.

எச்சரிக்கை அறிக்கை: 1. எரிதுறுதல்கள் 2. தோல் மற்றும் பார்க்கின்ற பிரச்சினை மட்டும் கடுக்க பயன்பாட்டை வேண்டும். 3. குறிப்பிடுகிறதுதில் 4. குறிப்பிட்டுள்ளபடி பயன்படுத்திய பிறகு கொள்ளவுதை அதிக்கவும். 5. இந்த தயாரிப்பு நிர்வாண உயிரினங்களுக்கு மிகவும் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது. எனவே நிர்வாண உயிரின வாழ்விடங்களுக்கு சாரிப்பயன்படுத்தவும் பயன்படுத்தக்கூடாது.

பயன்படுத்தும் கொள்ளக்கூடிய அகற்றுதல், உபயோகங்கள் மற்றும் உபரி பொருட்களிலிருந்து கழுவுதல்: 1. காலியாகிறதுவும் அல்லது நிர் பாலப்படுவதைக் குடுக்கும் கலைப்பிற அல்லது உபரிப் பொருட்கள் மற்றும் உபரி மருந்துகளை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்துவதுடன் மருந்துகளை கொல்லிகளை உருவாக்குவதுடன் மாசுபாடு ஏற்படாமல் விடாமலிருக்க கவனமாக இருக்கவேண்டும். 2. பயன்படுத்தப்பட்ட கலங்களை மீண்டும் பயன்படுத்த கூடாது. 3. பொட்டலங்களை உடைக்கவும் துளையிடுவதுடன் பாதுகாக்கு வெளியே. 4. பொட்டலங்களை மறுபயன்பாடு செய்யக்கூடாது.

பிரபாக்ட் சிக்னல்:

ஹைட்ரோஸ்ட்ரோபின்	10.0% வெய்ட்/வி
ஃப்ளுஜுஜாமைட்	10.0% வெய்ட்/வி
பாலியுரேதிலைன் மெத்தாக்ஸாலைட் போலாக்ஸிமர்	3.0% வெய்ட்/வி
ஸ்ரோபிடால் நீரின் 54 மோல்	1.0% வெய்ட்/வி
சோடியம் லவுரில் சல்ஃபேட்	1.5% வெய்ட்/வி
சோடியம் டி-2-ஆக்ஸோஹெப்டில் சல்ஃபோஸக்சினேட்	0.8% வெய்ட்/வி
ஜெல்லிங் முகவர்	6.5% வெய்ட்/வி
ஜாந்தம் கம்	0.5% வெய்ட்/வி
1,2-பென்சிசோதியாஸோலீன்-3-ஒன் 70% அக்டிவ் ஏ.ஐ.	0.5% வெய்ட்/வி
ஜெல்லிங் முகவர்	
பாலிடைமெதிலிஸிலாக்சேன் ஆன்டிஃபோம் இமல்ஷன்	0.3% வெய்ட்/வி
அனாலிடிகலாக செய்யப்பட்ட நீர்	100.0% வெய்ட்/வி
மொத்தம்	100.00% வெய்ட்/வி

அடர்த்தி = 1.06 - 1.12 "காலி டப்பாவினி திரிகி உபயோகிஂசடம் ப்ரமாதம்"

ஹாரிகி மற்றும் சரிகை பயன்படுத்துவதுக்கான **ஹர்தா கெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட்**

ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்: 48 ஹில் ரோடு, பாந்த்ரா (டபிள்யூ), மும்பை - 400050. இந்தியா.

ஃபாக்டரி: ஜுவாரி-396 411, பல்சார் மாவட்டம், குஜராத் மாநிலம், இந்தியா.

ஒரு தயாரிப்பு: 48 ஹில் ரோடு, பாந்த்ரா (டபிள்யூ), மும்பை - 400050. இந்தியா.

ஃபாக்டரி: ஜுவாரி-396 411, பல்சார் மாவட்டம், குஜராத் மாநிலம், இந்தியா.

MALAYALAM

ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായി കുലുക്കുക

കീടനാശിനി പ്രയോഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബോക്സുകളുടെ തമ്മിൽ കീടങ്ങൾ

ഉപയോഗത്തിന്റെ മേഖല: സസ്യ വിളയിലേക്കുള്ള തളിക്കുക. ഏകീകൃതവും ശരിയായ കവറേജും ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക. പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഞെട്ടിയോ ഠാരിംഗ് ഗോതമ്പിൻകീടങ്ങൾക്കെതിരെ പോളുമായോ കലർന്ന് നേരിട്ടുള്ള ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരേ സ്പ്രേയർ ഉപയോഗിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

കാലാവസ്ഥ (പൊതുവായി): രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. കാറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിലോ മഴയ്ക്കു മുമ്പോ പ്രയോഗിക്കരുത്.

മണ്ണും വെള്ളവും (ബാധകമായിടത്ത്): ഉണ്ട്ിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലുമുള്ള പ്രത്യേക അവസ്ഥകൾക്കായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

പ്രയോഗത്തിനുള്ള വിള ഘട്ടം: വിള വളർച്ചയുടെ ഏത് ഘട്ടത്തിലും രോഗലക്ഷണം കണ്ടുതുടങ്ങുമ്പോൾ ഇലകളുടെയോ ഗോതമ്പിൻകീടങ്ങളുടെയോ മുകളിലെ ഇലകളുടെയോ ഉപരിതലത്തിൽ ഫംഗസ് ബീജങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങുമ്പോൾ ഫംഗസ് ബീജങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പ്