aniloguard®

Read leaflet before use

Anilophos 30% EC
(Selective Herbicide)

Crops and Pest Groups: Anilophos 30% EC is a Herbicide used for the control of echinochloa crusgalli, echinochloa colonum, cyperus difformis, fimbristylis alba, cyperus iria, ecilpta alba, marsilia quadrifoliata, ischaemum rugosum weeds in transplanted Rice crop. **Dosage, Direction for use and Manner and time of application:** Please refer leaflet for details. **Purpose:** For agriculture use. **Re-entry:** 48 hours after spray. **Chemical Composition:** Emulsifiers (Calcium alkylaryl sulphonate and phenol ethylene oxide condensate blends) o.i. 10.0% w/w, Anilofos Technical a.i. 30.0% w/w, Solvent (Xylene) o.i. Q.S., **Total: 100.00% w/w. Safety Precautions:** Please refer leaflet for details. **Symptom of Poisoning:** Weakness, headache, muscular trembling, blurred vision, nausea, diarrhea and vomiting. **First Aid:** 1. If swallowed gastric lavage with 5% sodium bicarbonate may be given. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. 5. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. Get medical help immediately. **Antidote:** 1. Atropinize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated doses of 2 to 4 mg. of atropine sulphate intravenously at 5 to 10 minutes interval, as much as 25 to 50 mg. of atropine may be required in a day. The need for further atropine administration is guided by the continuance of symptoms. Extent of salivation is a useful criterion for dose adjustment. 2. Dissolve 1-2 gm. of 2 PAM in 10 ml distilled water and inject intravenously very slowly for 10-15 minutes. 3. Antidote requirements to be decided by medical practitioner as per the condition of the patient. **Cautionary statements:** 1. Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. 2. Destroy the container after use as directed on leaflet.

अनिलोगार्ड

उपयोग से पहले पत्रक पढें.

अनिलोफोस ३०% ई.सी. भा.भा.
(चयनात्मक खरपतवारनाशक)

फसलें और नाशक जीव समूहः अनिकेलोफ़ॉस ३०% ईसी एक खरपतवारनाशक है जिसका इस्तेमाल इकोनोक्लो क्रुस्गल्ली, इचिनोकोला कोलोनम, साइपेरस डिस्फॉर्मिस, फ़िम्ब्रिस्टिलिस अल्बा, साइपरस इरिआ, एक्लिप्टा अल्बा, मार्सिलिया क्वाड्रिफ़ोलीटा, इस्चेम रोपाई की गई धान कि फसल मे खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है। **मात्रा, उपयोग के लिए निर्देश और रीति और अनुप्रयोग का समयः** कृपया विवरण के लिए पत्रक का संदर्भ ले। **प्रयोजनः** कृषि उपयोग के लिए। **पुनः प्रविष्टिः** ४८ घंटे स्प्रे के बाद। **रासायनिक संरचनाः** इमल्सीफायर्स (कॅल्शियम अल्काइल अराईल सल्फोनेट तथा फेनोल इथीलीन ऑक्साइड कडेन्सेट का मिश्रण) अन्य घटक १०.०% भा/भा, अनिलोफोस टेक्निकल स.त. ३०% भा/भा, सोलवेन्ट (झायलीन) अन्य घटक पर्याप्त मात्रा, **योगः १००.००% भा/भा।** **सुरक्षा पूर्वाधानियाँः** कृपया विवरण के लिए पत्रक देखें। **विषाक्तीकरण के लक्षणः** कमजोरी, सरदर्द, झटके(मरगी), चक्कर आना, धुंधला दिखना, दस्त, मतली, उल्टी। **प्रथामिक उपचारः** १. निगलने पर ५% सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल से गैस्ट्रिक लेव्हज दिया जा सकता है। २ यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़े उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आँखें दूषित हो जाए तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि कीटनाशक साँस दवारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। ५. यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें तुरन्त डॉक्टर को बुलवाईए। **विषनाशकः** १. रोगी को तुरन्त एट्रोपिन दीजिए और इसकी २ से ४ मिग्रा. तक की खुराक ५ से १० मिनट के अन्तराल पर अन्तःशिरा दवारा लगातार देते हुए पूर्ण एट्रोपिनाइज रखिए। एक दिन में एट्रोपिन सल्फेट की अधिक से अधिक २५ से ५० मिग्रा. तक की मात्रा की आवश्यकता पड सकती है। एट्रोपिन सल्फेट की और मात्रा लक्षणों के बरकरार रहते दी जा सकती है। एट्रोपिन की कितनी खुराक देनी चाहिए इसके लिए मुंह से निकलने वाली लार एक लाभदायक कसौटी है। २. १ से २ ग्राम 2-पी.ए.एम १० मि.ली. आसुत जल में घोलकर अन्तःशिरा दवारा बहुत धीरे धीरे १० से १५ मिनट मे देना चाहिए। ३. रोगी की स्थिति के अनुसार चिकित्सको दवारा एंटीडोट आवश्यकताओं का निर्णय लिया जाता है। **सावधानियाँ कथनः** १. लेबल और पत्रक पर जो वर्णित है, उससे भिन्न फसल और नाशकजीव पर उपयोग के लिए नही। २. पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात आद्यान को नष्ट करें।

aniloguard®

Anilophos 30% EC
(Selective Herbicide)

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

जहर
POISON

Manufactured & Marketed by :
GHARDA CHEMICALS LIMITED

Manufactured & Marketed by: **GHARDA CHEMICALS LIMITED**
Regd. Office: Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400 050. INDIA
Factory: Plot No. C-4/1, Kherdi M.I.D.C., Village: Kherdi,
Taluka: Chiplun, District: Ratnagiri, State: Maharashtra, Pincode - 415604.

निर्माता और विक्रेता: **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**
पंजी. कार्यालय: घरडा हाउस, ४८ हिल रोड, बांद्रा (प), मुंबई – ४०० ०५०. भारत
फॅक्टरी: प्लॉट नं: सी–४/१, खेरडी एम.आय.डी.सी., गाँव: खेरडी, तालुका: चिपळुन,
जिला: रत्नागिरी, राज्य: महाराष्ट्र, पिनकोड: ४१५६०४.

For any complaints, contact Customer Care Executive at
Gharda Chemicals Limited, Gharda House, 48 Hill Road,
Bandra (W), Mumbai-400050. INDIA **Tel.: 022 66265999, 66265998**
Email: consumercare@gharda.com Website: www.gharda.com

® - Registered Trademark of Gharda Chemicals Limited

Regn. No. / रजि. नं.:
CIR-11053/90-ANILOPHOS/(EC)-4

Mfg. Lic. No. / उ.ला.नं. : LCIM1120220159

Net Content / शुध्द मात्रा : **1L/१ ली**

Batch No. / बैच नं. :

Mfg. Date :
उत्पादन की तिथि :

Expiry Date :
उपयोग की अंतिम तिथि :

MRP₹(incl. of all taxes):
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹:
(सभी करों सहित)

कृषि उपयोग के लिए **FOR AGRICULTURAL USE**

KEEP IN COOL & DRY PLACE AWAY FROM HEAT & OPEN FLAME.
सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

EZ0001 K.11.24-01