CUTOX®

Copper Oxychloride
containing copper contents 50% w/w WP
(Contact Fungicide)

It is highly effective fungicide based on copper oxychloride containing 50% w/w copper content and balance adjuvants.

Recommendation:

Crop(s)	Common name of Pest / Disease	Dosage / HA		Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period (Interval between last spray to harvest in days)	Re-entry (Time gap between application to re-entry)
		Al (kg)	Formulation (kg)			
Banana	Fruit Rot	1.25	2.5	750-1000	—	—
	Leaf Spot	1.25	2.5	750-1000	—	—
	Fruit Rot	1.25	2.5	750-1000	—	—
Banana	Leaf Spot	1.25	2.5	750-1000	—	—
Betel	Foot Rot	1.25	2.5	750-1000	—	—
	Leaf Spot	1.25	2.5	750-1000	—	—
	Foot Rot	1.25	2.5	750-1000	—	—
Betel	Leaf Spot	1.25	2.5	750-1000	—	—
Cardamom	Leaf Rot	1.25	2.5	750-1000	—	—
	Leaf Spot	1.25	2.5	750-1000	—	—
	Clump Rot	1.87 - 3.75	3.75 - 5.5	750-1000	—	—
	Leaf Rot	1.25	2.5	750-1000	—	—
	Clump Rot	1.87 - 3.75	3.75 - 5.5	750-1000	—	—
Cardamom	Clump Rot	1.87 - 3.75	3.75 - 5.5	750-1000	—	—
Chillies	Leaf Spot	1.25	2.5	750-1000	—	—
	Fruit Rot	1.25	2.5	750-1000	—	—
	Leaf Spot	1.25	2.5	750-1000	—	—
Chillies	Fruit Rot	1.25	2.5	750-1000	—	—
Citrus	Leaf Spot	1.25	2.5	750-1000	—	—
	Canker	1.25	2.5	750-1000	—	—
	Canker	1.25	2.5	750-1000	—	—
Citrus	Canker	1.25	2.5	750-1000	—	—
Coconut	Bud Rot	1.25	2.5	750-1000	—	—
Coconut	Bud Rot	1.25	2.5	750-1000	—	—
Coffee	Rust	1.87 - 3.75	3.75 - 7.5	750-1000	—	—
	Rust	1.87 - 3.75	3.75 - 7.5	750-1000	—	—
	Black Rot	1.87 - 3.75	3.75 - 7.5	750-1000	—	—
Coffee	Black Rot	1.87 - 3.75	3.75 - 7.5	750-1000	—	—
Cumin	Blight	1.25	2.5	750-1000	—	—
Cumin	Blight	1.25	2.5	750-1000	—	—
Grapes	Downy Mildew	1.25	2.5	750-1000	—	—
Grapes	Downy Mildew	1.25	2.5	750-1000	—	—
Paddy	Brown Leaf Spot	1.25	2.5	750-1000	—	—
Paddy	Brown Leaf Spot	1.25	2.5	750-1000	—	—
Potato	Early Blight	1.25	2.5	750-1000	—	—
	Early Blight	1.25	2.5	750-1000	—	—
	Late Blight	1.25	2.5	750-1000	—	—
	Late Blight	1.25	2.5	750-1000	—	—
	Early Blight	1.25	2.5	750-1000	—	—
	Late Blight	1.25	2.5	750-1000	—	—
Tea	Black Rot	0.30	0.60	125	—	—
	Red Rust	0.30	0.60	125	—	—
	Red Rust	0.30	0.60	125	—	—
	Blister Blight	0.21	0.42	175	—	—
	Black Rot	0.30	0.60	125	—	—
Tea	Blister Blight	0.21	0.42	175	—	—
Tobacco	Downy Mildew	1.25	2.5	750-1000	—	—
	Black Shank	1.25	2.5	750-1000	—	—
	Frog Eye Leaf	1.25	2.5	750-1000	—	—
	Downy Mildew	1.25	2.5	750-1000	—	—
	Black Shank	1.25	2.5	750-1000	—	—
Tobacco	Frog Eye Leaf	1.25	2.5	750-1000	—	—
Tomato	Late Blight	1.25	2.5	750-1000	—	—
	Early Blight	1.25	2.5	750-1000	—	—
	Leaf Spot	1.25	2.5	750-1000	—	—
	Leaf Spot	1.25	2.5	750-1000	—	—
	Late Blight	1.25	2.5	750-1000	—	—
Tomato	Early Blight	1.25	2.5	750-1000	—	—

Cautionary Statement : Not to be used for any purpose and crops other than those subscribed on label and leaflets. Destroy the container after use as directed on leaflet.

Direction of Use: Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery sprayer and ASPEE-HTP power sprayer. Do not use on fruit trees without addition of sheteners e.g. cotton seed oil to avoid leaf and scorch and russetting.

Time of Application: For the best results apply prophyllatically i.e. before disease attack plants, in rain weather spraying must be repeated at shorter intervals.

Precautions: 1) Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2) Avoid contact with mouth, eyes and skin. Avoid inhalation the spray mist. 3) Spray in the direction of wind. 4) Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5) Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6) Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning: Vomiting, stomach ache, diarrhoea, metallic taste in mouth, headache, cold sweat, weak pulse may occur.

First Aid: 1) If swallowed induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2) If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3) If eyes are contaminated, flush with plenty of saline / clean water for about 10 to 15 minutes. 4) If inhaled remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity: The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Anticote: Empty stomach by gastric lavage with milk or a demulcent solution of Potassium ferrocyanide. Administer egg white and other demulscents. Maintain electrolyte and fluid balance. Morphine and Pethidine may be given to control pain. If symptoms persists, give Dimercaprol or penicillamine. Penicillamine may be given in the dose of 15-40 mg/kg/day (max. 1-2 gm/day divided into four doses) for five days. Dimercaprol is given in the dose of 3mg/kg for every four hours for first 4 days and 2mg/kg every 12 hours for a total of 10 days by intravenous route. Give within first 4 hours of poisoning to obtain maximum benefit.

Disposal of Used Container: 1) It shall be the duty of manufacturers, formulators of fungicide and operators to dispose packages or surplus materials and washings from the machines and containers shall be disposed off in a safe manner, so as to prevent environmental or water pollution. 2) The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3) Packages shall be broken and burried away from habitation.

Storage Conditions: 1) The packages containing the fungicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles of or shall be kept in separate almirahs under lock and key depend upon the quantity and natire of the fungicide. 2) The rooms of premises meant for storing the fungicide shall be well-lit and ventilated and off sufficient dimensions.

Chemical Composition:

Sr. No	Ingredient	Description	Weight
1	Copper Oxychloride Tech. (containing copper contents 50.0% w/w Based upon 57.5% Cu contents in technical)		87.50% w/w
2	Suspending Agent : Carboxy methyl cellulose		2.00% w/w
3	Dispersing Agent : Alkyl naptyl sulphonate type		2.00% w/w
4	Wetting Agent : Alkyl aryl sulphonate type		3.00% w/w
5	China Clay		5.20% w/w
		Total :	100.00% w/w

" DANGEROUS TO RE USE EMPTY CONTAINER "

Manufactured & Marketed by : **Gharda Chemicals Limited**
Regd. Office: Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W). Mumbai - 400050.
Factory: Plot No. C-4/1, Khedi M.I.D.C., Village: Khedi, Taluka: Chiplun,
District: Ratnagiri, State: Maharashtra, Pincode - 415604

क्युटोक्स

कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की सरंचना
जिसमें कॉपर सक्रिय तत्व 50% भा/भा डब्ल्यू.पी.
(स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

यह कॉपर ऑक्सी क्लोराइड टेक्निकल से बनायी गयी एक फफूंदीनाशक है। जिसमे भार के हिसाब स 50 प्रतिशत तांबा तत्व है तथा बाकि अन्य सहयोगी पदार्थ है।

उपयोग:

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लीटर)	कौन कितने समय बाद खाया जा सकता है (दिन में)	पुन: खेत की सुरक्षित जानकारी के बाद (दिन)
		ए. एआ (कि.ग्रा.)	सरूपन (कि.ग्रा.)			
केला	फल विगलन	1.25	2.5	750-1000	—	—
	पर्ण धब्बी	1.25	2.5	750-1000	—	—
	फल विगलन	1.25	2.5	750-1000	—	—
केला	पर्ण धब्बी	1.25	2.5	750-1000	—	—
पान	पद विगलन	1.25	2.5	750-1000	—	—
	पर्ण धब्बी	1.25	2.5	750-1000	—	—
पान	पर्ण धब्बी	1.25	2.5	750-1000	—	—
इलायची	पर्ण विगलन	1.25	2.5	750-1000	—	—
	पर्ण धब्बी	1.25	2.5	750-1000	—	—
		1.87 - 3.75	3.75 - 5.5	750-1000	—	—
		1.25	2.5	750-1000	—	—
		1.87 - 3.75	3.75 - 5.5	750-1000	—	—
इलायची	पुंज विगलन	1.87 - 3.75	3.75 - 5.5	750-1000	—	—
मिर्च	पर्ण धब्बी	1.25	2.5	750-1000	—	—
	फल विगलन	1.25	2.5	750-1000	—	—
	पर्ण धब्बी	1.25	2.5	750-1000	—	—
मिर्च	फल विगलन	1.25	2.5	750-1000	—	—
	पद विगलन	1.25	2.5	750-1000	—	—
नींबू	कैंकर	1.25	2.5	750-1000	—	—
	कैंकर	1.25	2.5	750-1000	—	—
नींबू	कैंकर	1.25	2.5	750-1000	—	—
नारियल	कली विगलन	1.25	2.5	750-1000	—	—
नारियल	कली विगलन	1.25	2.5	750-1000	—	—
कापी	किट्ट	1.87 - 3.75	3.75 - 7.5	750-1000	—	—
	किट्ट	1.87 - 3.75	3.75 - 7.5	750-1000	—	—
	काला सिगतन	1.87 - 3.75	3.75 - 7.5	750-1000	—	—
कापी	काला सिगतन /	1.87 - 3.75	3.75 - 7.5	750-1000	—	—
जीरा	जीरा अंगमारी	1.25	2.5	750-1000	—	—
जीरा	जीरा अंगमारी	1.25	2.5	750-1000	—	—
अंगूर	मृदुरोमिल आसिता	1.25	2.5	750-1000	—	—
अंगूर	मृदुरोमिल आसिता	1.25	2.5	750-1000	—	—
धान	भूरा पर्ण धब्बी	1.25	2.5	750-1000	—	—
धान	भूरा पर्ण धब्बी	1.25	2.5	750-1000	—	—
आलू	अगेता /	1.25	2.5	750-1000	—	—
	अगेता अंगमारी	1.25	2.5	750-1000	—	—
	पछेता अंगमारी	1.25	2.5	750-1000	—	—
	पछेता अंगमारी	1.25	2.5	750-1000	—	—
	अगेता /	1.25	2.5	750-1000	—	—
	पछेता अंगमारी	1.25	2.5	750-1000	—	—
चाय	काला सिगतन	0.30	0.60	125	—	—
	लाल बिदाव	0.30	0.60	125	—	—
	लाल बिदाव	0.30	0.60	125	—	—
	सिलवर अंगमारी	0.21	0.42	175	—	—
	काला सिगतन	0.30	0.60	125	—	—
चाय	सिलवर अंगमारी	0.21	0.42	175	—	—
तम्बाकू	मृदुरोमिल आसिता	1.25	2.5	750-1000	—	—
	काला तना	1.25	2.5	750-1000	—	—
	सुडकाक्ष पर्ण धब्बी	1.25	2.5	750-1000	—	—
	मृदुरोमिल आसिता	1.25	2.5	750-1000	—	—
	काला तना	1.25	2.5	750-1000	—	—
तम्बाकू	सुडकाक्ष पर्ण धब्बी	1.25	2.5	750-1000	—	—
टमाटर	पछेता अंगमारी	1.25	2.5	750-1000	—	—
	अगेता अंगमारी	1.25	2.5	750-1000	—	—
	पर्णधब्बी	1.25	2.5	750-1000	—	—
	पर्णधब्बी	1.25	2.5	750-1000	—	—
	पछेता अंगमारी	1.25	2.5	750-1000	—	—
टमाटर	अगेता अंगमारी	1.25	2.5	750-1000	—	—

सावधानी विवरण : लेबल और पत्रक पर जो वर्णित है, उससे भिन्न उद्देश्य और फसल पर उपयोग के लिए नही पत्रक के निर्देशनुसार उपयोग के पश्चात आध्यवन को नष्ट करें।

उपयोग के लिए विधा-निर्देश: पीठ पर लादनी गहरा छिड़काव यंत्र, पैर चलित छिड़काव यंत्र, पीठ पर लादकार दबाव चलित छिड़काव यंत्र, पीठ पर लादनार बैटरी चलित छिड़काव यन्त्र, तथा शक्ति चलित ए एस पी ई ई-एच टी पी. छिड़काव तन्त्र।

प्रयोग का समय: उत्तम परिणामो मे रोग बचाव के लिए उपयोग करे अर्थात आक्रमण से पहले वर्षा काल में कम अंतराल पर छिड़काव करें।

प्रयोगकर्ताओ के लिए सावधानियां: 1) खाद्यसमग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें। 2) मुँह, त्वचा और आँखो के संपर्क से बचायें। 3) छिड़काव की वायव्य को सांस द्वारा अंदर जाने से बचाएं। हवा की दिशा में छिड़काव करें। 4) छिड़काव के बाद कपडे साबुन द्वारा अच्छी तरह धोएं। 5) छिड़काव के समय धूम्रपान, खान- पीना और कुछ चबाना -नहीं चाहिए। 6) छिड़काव करते वा मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक वस्त्रो पहनें।

विष के लक्षण : कंपनी, पेट तथा मुँह में वर्मी, वमन, मुँह में कसैला "मानिक" स्वाद, सरदर्द, ठंडा पसीना, नाड़ी कमजोर पड़ना आदि हो सकतें हैं।

प्राथमिक चिकित्सा: 1) यदि निगल लिया तो गले के पीछे गुदगुदी करके उलटी कराऐं, यह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक उलटी द्रव्य किसी पदार्थ सफ़ेद न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उलटी न कराये। 2) यदि कपडे और त्वचा को दवाई का संपर्क हुआ हो तो कपडे बदल दें और त्वचा को साबुन से धोयें। 3) यदि आँखे दूषित हो जाय तो उनको काफी मात्रा में रीठालहुआ गाढ़ा पानी से लगभग 10-15 मिनट तक धोयें। 4) यदि रोगी द्वारा अन्दर स्वास ही तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

पादपविषाक्तता: दर्शाया की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह रोगटाशक पोधविषाक्त नहीं है।

विषनाशक: रोगी को दूध या पोटेशियम फेरोसायनाराड के घोल के साथ गैस्ट्रिक लवेज द्वारा पेट खाली करे। कच्चा सफेद अंडे का सफेद भाग या अन्य डीमुलसिट या इलेक्ट्रोलाइट या अन्य सहायिका आहार दे। दर्द कम करने के लिए मार्फीन या पेथीडीन दो। जहर के लक्षण रोकने पर डायमरकेप्रोल या पेनिसिलामीन की मात्रा 15-40 मिग्रा/किग्रा/प्रति दिन अधिकतम 1-2 ग्रा प्रति दिन चार भागो मे बाँट कर पाँच दिन देनी चाहिये। जायमरकेप्रोल 3 मिग्रा/किग्रा पहले चार दिन प्रति चार घंटे पर तथा 2 मिग्रा/किग्रा हर 12 घंटे पर कुल 10 दिन तक देना चाहिये। अधिक फायदे के लिए लक्षण दखने के पहले चार घंटे के अन्दर तथा ये उपलब्धतापर यह इंजेक्शन नसद्वारा दें।

खाली डिब्बों का निपटारा : 1) फफूंदीनाशक निर्माताओ या उपयोग करों पर यह लेटटाशक पोधविषाक्त नहीं है। प्रयोग के बाद तोड़ फोड़कर आबादी से बाहर जमीन के अंदर गाड़ देना चाहिये। 2) खाली डिब्बो का दुबारा उपयोग हो सके इस हेतु बहार खुला हुआ न छोड़े। 3) खाली डिब्बे बची हुई दवाओं, खाने के बर्तनों को धोने की जगह से दूर ही गाड़ देना चाहिये।

साठान की शर्तें : 1) फफूंदीनाशक रखे हुए डिब्बों आदि एसे कमरे या अन्य वस्तुओ के रखे जाने वाले कमरे या जगह से दूर ही या अलमारी में फफूंदीनाशक का भण्डारण करना ही यह अच्छी तरह बना हुआ, पूरक, प्रकाशयुक्त, हवादार तथा पर्याप्त लम्बाई चौड़ा होना चाहिये जिसमे कि फफूंदीनाशक के माप से प्रयुक्त होने का डर न हो।

रासायनिक संरचना:

क्रमांक	संघटक	मात्रा	
1	कॉपर ऑक्सीक्लोराइड टेक. (जिसमें कॉपर तत्व 50.0% भा/भा और जो 57.5 % तांबा तत्व टेक्निकल ग्रेड पर आधारित)		87.50% भारभार
2	सस्पेंशिंग एजेंट : कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज		2.00% भारभार
3	डिस्पर्सीविंग एजेंट : एल्काइल नैफ्थेलिन सल्फोनेट		2.00% भारभार
4	वेटिंग एजेंट : एल्काइल एरिल सल्फोनेट		3.00% भारभार
5	चाइना क्ले		5.20% भारभार
		कुल :	100.00% भारभार

" खाली कंटेनर का दोबारा उपयोग करना खतरनाक है । "

उत्पादक और विक्रेता : **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**
पंजी. कार्यालय: घरडा हाउस, 48 हिल रोड, बान्द्रा (प), मुंबई – 400050
फैक्टरी : प्लॉट्स सी-4/1, खेरडी एम.आय.डी.सी., गाँव: खेरडी,
तालुका: चिपळूण, जिला: रत्नागिरी, राज्य: महाराष्ट्र, पिनकोड- 415604

ક્યુટોક્સ

કોપર ઓક્સિક્લોરાઈડ
સમાવિષ્ટ છે કોપરની માત્રા 50 % ભાર / ભાર ડબ્લ્યુપી
(સ્પર્શિય ફુગાનાશક)

આ 50 % ભાર / ભાર કોપર માત્રા અને બાકી સંપૂરકોનો સમાવેશ ધરાવતા કોપર ઓક્સિક્લોરાઈડ પર આધારિત ઉચ્ચ અસરકારક ફુગાનાશક છે.

ભલામણ:

પાક	જંતુનું સામાન્ય નામ	માત્રા, હેક્ટર		પાણીમાં માત્રા (લી)	કેટલાંકસમ કયા બાદ ખાઇ શકાય (દિવસો)	પુનઃપ્રવેશ (દિવસમાં)
		એલ.આ (કિ.ગ્રા)	સ્વરૂપ (કિ.ગ્રા)			
કેળા	ફળનો સડો	1.25	2.5	750-1000	—	—
	પાનનો ટપકા	1.25	2.5	750-1000	—	—
	ફળની સડો	1.25	2.5	750-1000	—	—
કેળા	પાનનો ટપકા	1.25	2.5	750-1000	—	—
પાન	લીલીકાંકરો સડો	1.25	2.5	750-1000	—	—
	પાનનો ટપકા	1.25	2.5	750-1000	—	—
	લીલીકાંકરો સડો	1.25	2.5	750-1000	—	—
તમાકુ	પાનનો ટપકા	1.25	2.5	750-1000	—	—
એલચી	પાનનો સડો	1.25	2.5	750-1000	—	—
	પાનનો સડો	1.87 - 3.75	3.75 - 5.5	750-1000	—	—
		1.25	2.5	750-1000	—	—
		1.87 - 3.75	3.75 - 5.5	750-1000	—	—
		1.87 - 3.75	3.75 - 5.5	750-1000	—	—
એલચી	ગુચ્છનો સડો	1.87 - 3.75	3.75 - 5.5	750-1000	—	—
મરચા	પાનનો ટપકા	1.25	2.5	750-1000	—	—
	ફળની સડો	1.25	2.5	750-1000	—	—
	પાનનો ટપકા	1.25	2.5	750-1000	—	—
મરચા	ફળની સડો	1.25	2.5	750-1000	—	—
	પાનનો ટપકા	1.25	2.5	750-1000	—	—
બાગ કામનો ફુલ	કાળોફુગનો સડો	1.25	2.5	750-1000	—	—
	કાળોફુગનો સડો	1.25	2.5	750-1000	—	—
નાળિયેળ	ફળીનો સડો	1.25	2.5	750-1000	—	—
નાળિયેળ	ફળીનો સડો	1.25	2.5	750-1000	—	—
કોફી	ગેરૂ	1.87 - 3.75	3.75 - 7.5	750-1000	—	—
	ગેરૂ	1.87 - 3.75	3.75 - 7.5	750-1000	—	—
	કાળો સડો	1.87 - 3.75	3.75 - 7.5	750-1000	—	—
કોફી	કાળો સડો	1.87 - 3.75	3.75 - 7.5	750-1000	—	—
જીરું	જીરા અંગમારી	1.25	2.5	750-1000	—	—
જીરું	જીરા અંગમારી	1.25	2.5	750-1000	—	—
દ્રાક્ષ	કેવડા ફુગી	1.25	2.5	750-1000	—	—
દ્રાક્ષ	કેવડા ફુગી	1.25	2.5	750-1000	—	—
ભાત	પાકાલ ત્રાકીલી ટિપ્પક	1.25	2.5	750-1000	—	—
ભાત	પાકાલ ત્રાકીલી ટિપ્પક	1.25	2.5	750-1000	—	—
ટમાટર	કુબ્બા	1.25	2.5	750-1000	—	—
	ધારબીજા લવચ્ય	1.25	2.5	750-1000	—	—
	ઉકિરત ગેળાકા કબ્બા	1.25	2.5	750-1000	—	—
	ઉકિરત ગેળાકા કબ્બા	1.25	2.5	750-1000	—	—
	ધારબીજા લવચ્ય	1.25	2.5	750-1000	—	—
	ઉકિરત ગેળાકા કબ્બા	1.25	2.5	750-1000	—	—
મરચા	કાકા ફુગ	0.30	0.60	125	—	—
	લાલ નંજ	0.30	0.60	125	—	—
	લાલ નંજ	0.30	0.60	125	—	—
	ચકિરિત્વર ધકારદિર	0.21	0.42	175	—	—
	કાકા ફુગ	0.30	0.42	175	—	—
મરચા	ચકિરિત્વર ધકારદિર	0.21	0.42	175	—	—
સ્થમાકુ	કેવડા ફુગી	1.25	2.5	750-1000	—	—
	મકુબ્બધ પર્ણ ફુગ	1.25	2.5	750-1000	—	—
	કેવડા ફુગી	1.25	2.5	750-1000	—	—
	કાળો ઘોકો	1.25	2.5	750-1000	—	—
સ્થમાકુ	મકુબ્બધ પર્ણ ફુગ	1.25	2.5	750-1000	—	—
દીજોટો	ઉકિરત ગેળાકા કબ્બા	1.25	2.5	750-1000	—	—
	ધારબીજા લવચ્ય	1.25	2.5	750-1000	—	—
	પાનનાપર ટિપ્પક	1.25	2.5	750-1000	—	—
	પાનનાપર ટિપ્પક	1.25	2.5	750-1000	—	—
દીજોટો	ધારબીજા લવચ્ય	1.25	2.5	750-1000	—	—

ચેતવણી: 1). લેબલ અને પત્રકો પર દર્શાવેલ સિવાયના કોઈ પાક અને હેતુ માટે ઉપયોગ નહીં કરવો જોઈએ. 2. ઉપયોગ પછી કન્ટેનરને પગલાં નિર્દેશો અનુસાર નાશ કરો.

ઉપયોગ ની રીત: નેપસેક સ્પ્રેયર, ફૂટ સ્પ્રેયર, કોમ્પ્રેશન નેપસેક સ્પ્રેયર, કોમ્પ્રેશન નેપસેક બેટરી સ્પ્રેયર અને એસ્પી-એચ.ટી.પી પાવર સ્પ્રેયર.

છંટકાવનો સમય: ઉત્તમ પરિણામો માટે પ્રોફાયલેક્ટિકની છંટકાવ કરો, એટલે કે, વરસાદી હવામાનમાં રોગ પર રોગ દુખાતો કરે તે પૂર્વે દૂંકા અંતરે છંટકાવ દીરઘતાવધી જોઈએ.

સાવચેતીઓ: 1. બાળકોથી, પશુ પાલ્યોના ખાણી પાયો અને પશુઆહારથી દૂર રાખો. 2. મોં, આંખો અને ત્વચાથી દૂર રાખો. 3. છંટકાવની ધુમ્ર શ્વાસમાં નહીં જાય તેવું ધ્યાન રાખો, પવનની દિશામાં જ છંટકાવ કરો. 4. છંટકાવ કર્યા પછી દૂષિત કપડાં અને સરીરના કોઈ પણ ભાગને ધુઓ. 5. છંટકાવ કરતા દુધપાન, મદ્યપાન, તમાકુનો વપરાશ-ખોર આદિ બધુ નહાવા. 6) મિશ્રણ અને છંટકાવ સમયે સંપૂર્ણ રક્ષણાત્મક કપડાં પહેરો.

વિષબાધાની લક્ષણો: ઉલટ્યા, ગોટપટ્ટી, ઝુલાબ, ટીંડાંના ચારૂની ચમ, ડોકેદુખી, ઘડ્ડા ાણ, હલકુવાના નાડી ધબકારા થાકે છે.

પ્રથમોપચાર: 1) ગિલ્લ્યાના ઘશાવ્યા ગાળીલ બાજૂના ગુલુત્યા વલ્લન ઉલટ્યા કરાવીલ. ઉલટ્યા સ્પષ્ટ થાય ત્યાં સુધી કરતા રહ્યા. જ્યા રોગૂણ અસલ્યાત ઉલટ્યા કરેલ્યાવ પ્રયુત્ન વલ્લ નહા. 2) કપડે આણિ ત્વચા દૂષિત અસલ્યાત, ભરપૂર સાબણ / ક્ષારીય દ્રાવણ આણિ પુષ્કળ પાણી અને સાબુવડે ધોઈ નાખો. 3) જો આંખો દૂષિત થેલ, તો પુષ્કળ સલાઈન /સ્વચ્છ પાણીથી 10 થી 15 મિનિટ સુધી છાલકા મારીને ધુઓ. 4) પીડાને ચલુ દીધા પી, દર્દીને તાજા હવામા ખસેડો.

ફાયટોટોક્સિસિટી: ક્ષેત્રભલામ ભિલામણસુસાર વાપરવ્યાસ ઉત્પાદન ફાયટોટોક્સિક નથ્યરો.

વિષબાધા: દૂધ કેવા શરબતો પોટેશિયમ ફેરોસાયનાઇડના દ્રાવણ સૌપ્રિટ્રક સોલ્યુશન વલ્લન પોટ નિકાળો કરા, ઇંડાંનો સફેદ ભાગ અને અન્ય ડિમલ્સિફાયર આપો. ઇલેક્ટ્રોલાઇટ અને પ્રવાહીનું સંતુલન જાળવી રાખો. દર્દ કાબૂમાં લેવા માટે મોર્ફાઇન અને પેથિડાઇન આપી શકાય. જો લક્ષણો તે સ્થાને રહે તો ડાયમરકેપ્રોલ અથવા પેનિસિલામાઇન આપો. પેનિસિલામાઇન પાંચ દિવસ માટે દિવસમાં ચિકા દીઠ 15–40 મિગ્રા નામાંમાં આપી શકાય (મહત્તમ માત્રા દિવસમાં 1–2 ગ્રા). ડાયમરકેપ્રોલ પ્રથમ 4 દિવસ માટે દર ચાર કલાકે 3 મિગ્રા/કિગ્રા અને ત્યારબાદ 2 મિગ્રા/કિગ્રા પ્રમાણે દર 12 કલાકે કુલ 10 દિવસ માટે આપો. ઝેરની અસર ઓછી કરવા માટે ઝેરી પદાર્થ ખાધા પછી 4 કલાકમાં આપો.

બાકી પાત્રોનો નિકાલ: .. ઘોવાણો કયારે અને વધારાની સામગ્રીઓનો સિંહાર પર્યાવરણીય અથવા જળ પ્રદૂષણ નહીં થાય તે રીતે ફૂગનીશક પ્રવૃત્તિની ઉત્પાદકો જવાબદારી ફેલાવકો, ટ્રાક્ટરોએ અને પ્રવાહીનું મંજૂર્વન જાળવી રાખો. દર્દ કાબૂમાં લેવા માટે મોર્ફાઇન અને પેથિડાઇન આપી શકાય. જો લક્ષણો તે સ્થાને રહે તો ડાયમરકેપ્રોલ અથવા પેનિસિલામાઇન આપો. પેનિસિલામાઇન પાંચ દિવસ માટે દિવસમાં ચિકા દીઠ 15–40 મિગ્રા નામાંમાં આપી શકાય (મહત્તમ માત્રા દિવસમાં 1–2 ગ્રા). ડાયમરકેપ્રોલ પ્રથમ 4 દિવસ માટે દર ચાર કલાકે 3 મિગ્રા/કિગ્રા અને ત્યારબાદ 2 મિગ્રા/કિગ્રા પ્રમાણે દર 12 કલાકે કુલ 10 દિવસ માટે આપો. ઝેરની અસર ઓછી કરવા માટે ઝેરી પદાર્થ ખાધા પછી 4 કલાકમાં આપો. 3. પીઠેપીઠ તોડીને મકાની બહારથી દૂર દાટી દેવા જોઈએ.

સંગ્રહની સ્થિતિઓ: 1) ફૂગનાશકોને સમાવતા પેકેજ રેલી માલ અને પ્રકાશને આપીરે અન્ય સંગ્રહ કોરી ીમાલોમોનો દૂર ના ફેલ અથવા સાદુરમાં પ્રકાશ કરવો જોઈએ અથવા તાળું- ચાવી આપેલા કેબાટ્સ અલગ રૂમોમાં સંગ્રહ કરવો. 2. ફૂગનાશકોની સંગ્રહ માટે પર્યાવરણ દૂષિત થવાનું ટાળવા માટે ફૂગનાશકોનો સંગ્રહ કરવા તથા પર્યાપ્ત લંબાઈ અને પહોળાઈ ધરાવતા હોવા જોઈએ.

રસાયણિક સંયોજન:

અનુક્રમ	સામગ્રીઓનો	વિવરણ	પ્રમાણ
1	કોપર ઓક્સિક્લોરાઇડ ટેક. (ટેક્નિકલમાં 57.0 % Cu માત્રા પર આધારિત સમાન 50.0 % ભાર / ભાર સાથેની ગણતરી)		87.50% ભાર/ભાર
2	સસ્પેન્શિયન એજન્ટ : કાર્બોક્સીમિથાઇલ સેલ્યુલોઝ		2.00% ભાર/ભાર
3	ડિસ્પર્સિંગ એજન્ટ: આ ક્વાર્ટર સોડીયમ સોલ્ટ પ્રકાર		2.00% ભાર/ભાર
4	વેટિંગ એજન્ટ: આલ્કાઇલ એરિલ સલ્ફોનેટ પ્રકાર		3.00% ભાર/ભાર
5	ચીની માટી		5.20% ભાર/ભાર
		કુલ	100.00% ભાર/ભાર

"આવી ડબ્બા ફરીથી ઉપયોગ કરવાનું અટકાવે છે."

ઉત્પાદક અને વિક્રેતા: **ઘરડા કેમિકલ્સ લિમિટેડ**
ઑફિસિયલ સરનેસ: ઘરડા હાઉસ, 48 હિલ રોડ, બાન્દ્રા (પ), મુંબઈ- 400 050
ફેક્ટરી: પ્લોટ નં. સી-4 / 1, ખેરડી એમ.આઈ.ડી.સી. ગામ: ખેરડી,
તાલુકો: ચિપલૂણ, જિલ્લો: રત્નાગિરી, રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર, પિનકોડ– 415 604.

CUTOX®

Copper Oxychloride
containing
copper contents 50% w/w WP
(Contact Fungicide)

क्युटोक्स

कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की
सरंचना जिसमें
कॉपर सक्रिय तत्व ५०% भा/भा डब्ल्यू.पी.
(स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

ક્યુટોક્સ

કોપર ઓક્સિક્લોરાઈડ
સમાવિષ્ટ છે કોપરની માત્રા 50 % ભાર / ભાર ડબ્લ્યુપી
(સ્પર્શિય ફુગાનાશક)

CUTOX®

Copper Oxychloride
containing
copper contents 50% w/w WP
(Contact Fungicide)

क्युटोक्स

कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की
सरंचना जिसमें
कॉपर सक्रिय तत्व ५०% भा/भा डब्ल्यू.पी.
(स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

Manufactured & Marketed by:
GHARDA CHEMICALS LIMITED
Regd. Office: Gharda House,
**48

কুটোক্স
কপার অক্সিক্লোরাইড
কপার উপাদান সমৃদ্ধ ৫০% ও/ও ডব্লিউপি
(স্পর্শগত ছত্রাকনাশক)

ಕ್ಯೂಟೊಕ್ಸ್
కాపర్ ఆక్సీక్లోరైడ్
కాపర్ కంటెంట్స్ 50% బ/బ WP కలిగి ఉంటుంది
(స్పర్శయుత శిలీంద్ర నాశిని)

ಕುಟೋಕ್ಸ್
ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್
50% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿ ಕಾಪರ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
(ಸಂಪರ್ಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

க்யூடாக்ஸ்
காப்பர் ஆக்சிகுளோரைட்
50% எ/எ WP காப்பரைக் கொண்டுள்ளது
(காண்டாக்ட் பூஞ்சைக்கொல்லி)

കുടോക്സ്
കോപ്പർ ഓക്സിക്ലോറൈഡ്
കോപ്പർ 50% ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു ഡബ്ലിയുപി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു
(സമ്പർക്ക കുമിൾനാശിനി)

"খালি পাত্র ব্যবহার করা বিপজ্জনক"

"వెన్ని డబ్బాలని తిరిగి ఉపయోగించడం ప్రమాదం"

"ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ."

"வெற்று கொள்கலனை பயன்படுத்துவது அபாயகரமானது"

"ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്"

DIRECTION FOR USE

FOR AGRICULTURAL USE
कृषि उपयोग के लिए

Read Leaflet Before Use
इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

CUTOX®

Copper Oxychloride
containing
copper contents 50% w/w WP
(Contact Fungicide)

क्युटोक्स

कॉपर ऑक्सीक्लोराइडकी
सरंचना जिसमें
कॉपर सक्रिय तत्व ५०% भा/भा डब्ल्यू.पी.
(स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

Manufactured & Marketed by:
GHARDA CHEMICALS LIMITED
Regd. Office: Gharda House,
48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400050.

For any complaints, contact Customer Care
Executive at Gharda Chemicals Limited,
Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400050.
Tel.: (022) 66265998 / 66265999,
Email: consumercare@gharda.com
Website: www.gharda.com

® Registered Trademark of Gharda Chemicals Limited

K/01/25-01