Diafenthiuron 50%WP

GAINER®

(Systemic and Contact Insecticide)

Diafenthiuron 50% WP **(GAINER)** is a Broad Spectrum Insecticide. It paralyses the pest which remain immobile on the crop until death in about 3-4 days. It is recommended for its use to control Whiteflies, Aphids, Thrips, Jassids in Cotton and Diamond Back Moth (DBM) in Cabbage, Mites in Chilli, Whitefly in Brinjal, Thrips and Capsule Borer in Cardamom crops. It contains 500 g. Diafenthiuron as an active ingredient in a kg of the product (w/w).

Recommendation :

Crop	Common name of pest	Dosage per hectare a.i. (g)	Formulation (g)	Dilution in water (lit)	Waiting period from last spray to harvest
Cardamom	Thrips Capsule borer	400	800	1000	7days
Cotton	Whiteflies Aphids Thrips Jassids	300	600	500-1000	21 days
Cabbage	Diamond Back Moth *(Plutella xytostella)*	300	600	500 -750	7days
Brinjal	Whitefly	300	600	500 -750	3days
Chilli	Mites	300	600	500 -750	3days

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

Directions for use : Measure our required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop with suitable sprayer.

Time of Application : Cotton : Apply first spray during initial appearance of pests and repeat one or two sprays at 15 days interval depending on pest intensity. **Cabbage :** First spray at 30 DAT or at the first pest appearance and repeat 2-3 sprays at 10-15 days interval depending on pest intensity. **Chilli :** First spray at 30 DAT or at the first pest appearance and repeat 2 or 4 sprays at 14-21 days interval depending on pest intensity. **Brinjal :** First spray at the time of pest appearance and repeat 2 sprays at 14-21 days interval depending on pest intensity. **Cardamom :** First spray at the time of pest appearance and repeat 2 sprays at 21-30 days interval depending on pest intensity.

Precautions: Do not use cooking utensils for preparing sprays Use stick for stirring the spray solution. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Also avoid inhalation and contact with eyes. Wear protective clothing, mask, goggles, boots, while spraying and do not expose yourself to spray drift. Do not blow nozzles with mouth. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. Do not store unused spray solution. Clean sprayers, buckets and other utensils with water daily after use. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes. Do not contaminate streams, ponds, waterways etc by discharging leftover spray materials into them or by cleaning sprayers, contaminated buckets etc. in them. Do not spray when bees are active. In case of any sign of poisoning, immediately consult the doctor.

Symptoms of Poisoning : Poisoning may cause symptoms of subdued behavior, prostration, lethargy, piloerection, headache, gidiness, vertigo, nausea, vomiting, blurred vision, sweating, excessive lacrimination & salivation.

First Aid: Remove the affected person from the danger zone to a well ventilated room or to fresh air, and protect from undercooling. IN CASE OF SUSPECTED POISONING: Immediately call a physician. IN CASE OF SKIN CONTACT: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and plenty of water. IN CASE OF EYE CONTACT: Rinse eyes with clean water for several minutes. IN CASE OF INGESTION: Repeatedly administer medicinal charcoal in a large quantity of water. NOTE: Never give anything by mouth to an unconscious person. Do not induce vomiting.

Phytotoxicity : The product is non phytotoxic when used as per field recommendation.

Antidote: No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy.

Disposal of Used container : 1. Packages or surplus materials and washings from the machines and containers should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse. 3. Packages shall be broken and buried away from inhabitation.

Storage Conditions: 1. The packages containing the insecticides should be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles, particularly, articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition:

1.	Diafenthiuron a.i.	50.00% w/w
2.	Wetting Agent Ethoxylated fatty alcohol	12.00% w/w
3.	Dispersing Agent Condensed alkyl naphthalene sulphonate. sodium salt	15.00% w/w
4.	Carrier Precipitated Silica	q. s.
	TOTAL:	100.00% w/w

डायफेन्थुरॉन 50 प्रतिशत डब्ल्यु पी

गेनर

(अंर्तप्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

डायफेन्थुरॉन 50 प्रतिशत डब्ल्यु पी **(गेनर)** एकवहुपयोगी कीटनाशक है। यह कीटको लकवाग्रस्त कर देता है। जिससे वे अपनी मृत्यु तक यानी करीब ३-४ दिन फसल पर बेबस होकर पडे रहते है। इसकी सिफारिश कपास ने लगने वाले सफेद मक्खी, माहो, चुरदा, तेला तथा पत्ता गोभी में लगने वाले हीरक पतंगे मिर्ची की मकडियां, बैंगन की सफेद म्क्खी, ईलायची की चुरदा, वृन्त छेदक की रोकथाम के लिए की जाती है। इसमे सक्रिय तत्व के रूप मे उत्पादन के एक किलो (व/व) में ५०० ग्राम डायफेन्थुरोंन है।

उपयोग :

फसल	किट का प्रचलित नाम	मात्रा प्रति हेक्टर सक्रिय तत्व (ग्राम)	संरचना (ग्राम)	पानी की मात्रा (लिटर)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच प्रतिक्षा का समय
ईलाइची	चुरदा शंकाकार छेदक	४००	८००	१०००	७ दिन
कपास	सफेद मक्खी माहो चुरदा तेला	३००	६००	५००–१०००	२१ दिन
पत्ता गोभी	हीरक पतंगा (प्लूटेला एक्जाइलोस्टेला)	३००	६००	५००–७५०	७ दिन
बैंगन	सफेद मक्खी	३००	६००	५००–७५०	३ दिन
मिर्ची	मकडिया	३००	६००	५००–७५०	३ दिन

चेतावनी : इस लेबल/पत्रिका में निर्देशित किये गये फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल ना करें।

प्रयोग के लिए निर्देश : उत्पाद की लिखित मात्रा लीजीए और उसे थोडे से पानी के साथ अच्छी तरह से मिलाइए। निर्दिष्ट मात्रा का बाकी पानी भी अच्छी तरह से हिलाक मिला लीजीए तथा किसी भी योग्य स्प्रेयर से पूरी फसल मे कीजिए।

प्रयोग का समय : कपास : पहला छिड़काव पहली बार कीटों के नजर आने पर और उसके बाद १-२ छिड़काव १५ दिनो के अन्तर से किटों की मौजूदगी के आधार पर। **पता गोभी :** रोपाई के ३० दिनो के बाद या पहली बार कीट नजर आने पर पहला छिड़काव तथा कीट आक्रमण की गंभीरता के अनुसार १०-१५ दिनों के अंतर से २-३ छिड़काव। **मिर्ची :** रोपाई के ३० दिनो के बाद या पहली बार कीट नजर आने पर पहला छिड़काव तथा कीट आक्रमण की गंभीरता के अनुसार १४-२१ दिनों के अंतर से २-४ छिड़काव। **बैंगन:** पहली बार कीट नजर आने पर पहला छिड़काव तथा कीट आक्रमण की गंभीरता के अनुसार १४-२१ दिनों के अंतर से २ छिड़काव दें। **ईलायची :** पहली बार कीट नजर आने पर पहला छिड़काव तथा कीट आक्रमण की गंभीरता के अनुसार २१-३० दिनों के अंतर से २ छिड़काव दें।

सावधानियाँ : स्प्रे तयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तनों का इस्तेमाल मत किजीए। स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकडी का प्रयोग करें। त्वचा से स्पर्श से बचाव के लिए दस्तानें पहने। सांस के साथ अंदर लेने और आंखों से सम्पर्क से भी बचे। स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक कपडें, मास्क, बुटस आदी पहने और स्प्रे कि फुहार के सामने न आएं। नोजल्स में मुंह से फुक न मारे। उठाते, रखते या प्रयोग करते समय खाना, पीना या धुम्रपान नही करना चाहिए। बाकी बचे स्प्रे घोल का भंडारण न करें। प्रति दिन प्रयोग के बाद स्प्रेयर, बाल्टियों तथा अन्य बर्तनों को पानी से धोएं। कार्य समाप्त होने के बाद हाथों को साबुन और ढेर पानी से धोइए। बची हुई स्प्रे सामग्री को झरनो, तालाबों, नहरों आदी में बहाकर या स्प्रेयर्स, दूषित बाल्टियों आदी को उनमें धोकर उनको दूषित मत कीजिए। यदि मधुमक्खियां सक्रिय हो तो स्प्रे मत कीजीए। यदि विश चढने का कोई भी चिन्ह दिखाई दे तो तुरन्त डॉक्टर से सम्पर्क करें।

विषबाधा के लक्षण : विश्बाधा के लक्षणोंमें उदासीन व्यवहार, धराशायी, सुस्ती, पाइलोइरेक्शन, सिर दर्द, चक्कर आना, डरना, जी मिचलाना, उल्टी आना, धुंधला दिखाइ देना, पसीना आना तथा मुंह से लार गिरना जैसे लक्षण देखे गये है।

प्राथमिक चिकीत्सा : प्रभावित व्यक्ति को प्रदूषित जगह से हवादार कमरे या खुली हवा में ले जाए और तापमान से बचाएं। विशबाधा के लक्षण दिखाइ देने पर: तुरंत चिकीत्सक को बुलाइंए। त्वचा में लगने पर: प्रदुषित कपडों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोए। आंखों में चले जाने पर : आंखों को कुछ देर तक पानी से अच्छी तरह छपछपाएं। निगले जाने पर : पानी में मेडिसिनल चारकोल की काफी मात्रा घोलकर बार–बार दें। सुचना : कभी भी मुर्छित मरीज को मुँह से कुछ भी नहीं देना चाहिए। उल्टी कर ने की कोशिश न करें।

पौधविशाक्तता : सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशाक्तत नहीं हैं।

विष नाशक : कोई विशेष प्रतिविष नहिं। लक्षणों के अनुसार उपचार करें।

खाली डिब्बो का निपटारा १. पर्यावरण का प्रदूषण बचाने के लिए डिब्बे, बचा हुआ घोल/ पदार्थ मशीनों की धोवन और खाली डिब्बों का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें। २. उपयोग किए गए डिब्बे/पैकेजों को वैसे ही बाहर नही छोड देना चाहिए। इस प्रकार उनका दुबारा उपयोग बचाया जा सकता है। ३. पैकेजो/डिब्बों को तोड–मोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड देना चाहिए।

संग्रहण : १. कीटनाशक के डिब्बों को अन्य सामग्री विशेषकर खाने के सामान के संग्रहण के लिए प्रयोग लिए जा रहे कमरों या इमारतों से दूर अलग कमरों या इमारतों में अथवा अलग से ताला बंद अलमारियों में रखना चाहिए। २. कीटनाशक के संग्रहण हेतु उपयोग किये जाने वाले कमरे या इमरते मजबूत, सूखी प्रकाशित तथा हवादार होनी चाहिए तथा उनमें पर्याप्त स्थान होना चाहिए ताकी बाष्प से प्रदूषण न हो सके।

रासायनिक संरचना :

१.	डायफेन्थुरॉन सक्रिय तत्व	५०.००% भार/भार
२.	भिगोनेवाले तत्व - इथोक्सिलेटे फॅटी अल्कोहोल	१२.००% भार/भार
३.	छितरानेवाले तत्व - कन्डेन्स अल्किल नैफ्थालिन सल्फोनेट, सोडीयम सॉल्ट	१५.००% भार/भार
४.	संवाहक प्रेसिपीटेड सिलिका	पर्याप्तमात्रा के लिए
	योग	१००.००% भार/भार

डायफेन्थियुरॉन ५० प्रतिशत डब्ल्यु पी

गेनर

(आंतरप्रवाही आणि स्पर्शीय कीटकनाशक)

डायफेन्थियुरॉन ५०% डब्ल्यु पी (**गेनर**) हे बहुविधकार्यकारी कीटकनाशक आहे, ते कीटकाना हतबल करते व कीटक पिकावर खिळलेल्या अवस्थेत मरेपर्यंत सुमारे ३–४ दिवस राहतात. सफेद माशा, मावा, फुलकिडे, तुडतुडे या कपाशीवरील आणि हीरकपुष्ठी पतंग (डी बी एम) या कोबीवरील, कोळी कीटक (माइट्रस) या मिरचीवरील, सफेद माशा या वांग्यावरील व फुलकिडे व कपसुल बोअरर या वेलचीवरील कीटकाच्या नियंत्रणासाठी **गेनर** ५० डब्ल्यु पी ची शिफारस करतात, त्यामध्ये ५०० ग्रॅ. डयफेन्थियुरॉन हा नियंत्रणासाठी घटक उत्पादनाच्या दर किलोग्रॅममागे व/व अंसतो.

सिफारिस :

पीक	कीटकाचे नित्याचे नाव	दर हेक्टरी मात्रा कि.घ. (ग्रॅ)	फॉर्म्युलेशन (ग्रॅ)	द्रावक पाणी (लिटर्स)	शेवटच्या फवारणीपासून कापणीपर्यंतचा प्रतीक्षा कालावधी
वेलची	फुलकिडे कॅमसुल बोअरर	४००	८००	१०००	७ दिवस
कपुस	सफेद माशी मावे फुलकिडे तुल्तुले	३००	६००	५००–१०००	२१ दिवस
कोबी	हीरकपूष्ठी पतंग (प्लुटेला झायलोस्टेला)	३००	६००	५००–७५०	७ दिवस
वांगी	सफेद माश	३००	६००	५००–७५०	३ दिवस
मिरची	कोळी कीटक	३००	६००	५००–७५०	३ दिवस

सावधगिरी : ह्या लेबल/पत्रिका वर निर्देशित पीका व्यतिरिक्त इतर पीकावर वापरु नये.

वापरासंबंधी सूचना : उत्पादनाची आवश्यक राशी मापून घ्या आणि थोड्या पाण्यात ती नीट मिसळा. निर्देशानुसार उर्वरित पाणी घालून व्यवस्थित ढवळा. व सुयोग्य फवारणीयंत्राने पिकावर पूर्ण आच्छादन होईल अशी फवारणी करा.

वापराची वेळ : कपाशी : कीट सुरवातीला दृष्टीस पडल्यावर पहिली फवारणी करावी आणी कीटप्रादुर्भाव किती प्रमाणात आहे ह्यानुसार १५ दिवसांच्या अंतराने १-२ फवारण्या पुन्हा कराव्यात. **कोबी :** पेरणीच्या ३० दिवसा नंतर किंवा पहिली फवारणी कीट सुरवातीला दृष्टीस पडल्यावर करावी आणी कीट प्रादुर्भाव किती प्रमाणात आहे त्यानुसार १०-१५ दिवसांच्या अंतराने २-३ फवारण्या पुन्हा कराव्यात. **मिर्ची :** पेरणीच्या ३० दिवसा नंतर किंवा पहिली फवारणी कीट सुरवातीला दृष्टीस पडल्यावर करावी आणी कीट प्रादुर्भाव किती प्रमाणात आहे त्यानुसार १४-२१ दिवसांच्या अंतराने २-४ फवारण्या पुन्हा कराव्यात. **वांगी :** पहिली फवारणी कीट सुरवातीला दृष्टीस पडल्यावर करावी आणी कीट प्रादुर्भाव किती प्रमाणात आह त्यानुसार १४-२१ दिवसांच्या अंतरान २ फवारण्या कराव्यात. **वेलची :** पहिली फवारणी कीट सुरवातीला दृष्टीस पडल्यावर करावी आणी कीट प्रादुर्भाव किती प्रमाणात आहे त्यानुसार २१-३० दिवसांच्या अंतराने २ फवारण्या कराव्यात.

सावधगिरी : फवारणीचे द्रावण तयार करण्यासाठी स्वयंपाकाची भांडी वापरु नयेत. फवारणीचे द्रावण ढवळण्यासाठी काठीचा वापर करावा. त्वचेशी संपर्क टाळण्यासाठी हातमोज्यांचा वापर करावा. तसेच श्वासावाटे हुंगणे आणि डोळ्यांशी संपर्क टाळावा. फवारणी करताना मुखवटा, गॉगल्स, बूट, असा संरक्षक पेहराव करावा आणि फवारणीचे धुके अंगावर घेऊ नये. नोझल्स तोंडाने फुंकू नयेत. उत्पादनाची हाताळणी किंवा फवारणी करताना खाऊ पिऊ किंवा धूम्रपान करु नये. फवारणी यंत्रे, बालद्या व इतर भांडी काम झाल्यावर दररोज पाण्याने स्वच्छ करावीत. हात साबण व भरपूर पाणी वापरुन धुवावेत आणि काम झाल्यावर कपडे बदलावेत. संसर्ग झालेले कपडेही धुवावेत. झरे, डबकी, नद्यांमध्ये धुवून पाणी प्रदूषित करु नये. मधमाशा सक्रिय असताना फवारणी करु नये. विषबाधेची कोणतीही चिन्हे आढळल्यास ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

विषबाधेची लक्षणे : विषबाधेच्या लक्षणांमध्ये मंदावलेली वर्तणूक, पडून रहेवेसे वाटणे, आळसावणे, अंगावर काटा येणे, डोकेदूखी, चक्कर, भोवळ, मळमळ, ओकारी, दृष्टी अंधूक होणे, घाम फुटणे, डोळे आणि लाळ जास्त प्रमाणात गळणे यांचा समावेश आहे.

प्रथमोपचार : विषबाधा झालेल्या व्यक्तीस धोक्याच्या भागातून मोकळ्या हवेवर न्या आणि पुरेसा थंडावा न मिळण्यापासून रक्षण करा. विषबाधा झाल्याचा संशय येताच: ताबडतोब डॉक्टरांना बोलवा. त्वचेशी संपर्क आल्यास : संसर्ग झालेले कपडे काढून टाका आणि बाधित झालेले शरीराचे भाग साबण आणि पाण्याने व्यस्थित धुवा. डोळ्यांशी संपर्क आल्यास : भरपूर मिनिटे स्वच्छ पाण्याने डोळे धुवा. गिळले गेल्यास: भरपूर पाण्यातून औषधी कोळसा पुन्हा पुन्हा द्या. टीप : शुद्ध हरपलेल्या व्यक्तीस तोंडावाटे कधीही काहीही देऊ नये. उलटी काढण्याचा प्रयत्न करु नये.

पौधविशाक्तता : नमुद केलेल्या मात्रानुसार कीटकनाशकाचा वापर केल्याने पौधविशाक्तत होत नाही.

उतारा : विवक्षित उतारा ज्ञात नाही. लक्षणांप्रमाणे उपचार करावेत.

कंटनर्सची विल्हेवाट : १. पॅकेजिस् किंवा अतिरिक्त द्रव्य आणि यंत्राचे धुवण तसेच कंटेनर्सची विल्हेवाट सुरक्षित रीतीने, पर्यावरणाचे प्रदूषण होणार नाही आशा रीतीने लावावी. २. वापरलेल्या पॅकेजिस् उघड्यावर टाकू नयेत म्हणजे त्यांचा पुनर्वापर टळेल. ३. पॅकेजिस् मोडूनतोडून वस्तीपासून दूर पुरावीत.

साठवण : १. कीटनाशक असलेली पॅकेजिस् मूळ कंटेनर्समध्ये, इतर वस्तू, विशेषत अन्नपदार्थ साठविण्याच्या खोल्या अगर वास्तूंपासून दूर असलेल्या स्वतंत्र खोल्या अगर वास्तूंमध्ये किंवा स्वतंत्र कपाटांमध्ये कडीकुलुपात ठेवावीत. २. कीटनाशक साठविण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा वास्तू पक्क्या बांधणाच्या, कोरड्या, भरपूर उजेडाच्या व खेळत्या हवेच्या आणि वाफेने दूषित न होण्यासाठी पूरेशा मोजमापाच्या असाव्यात.

संघटन :

१.	डायफेन्थियुरॉन क्रि. घ	५०.००% व/व
२.	भिजवणारे द्रव्य इथॉक्सिलेटेड फॅटी अल्कोहोल	१२.००% व/व
३.	पसरवणारे द्रव्य कन्डेन्स्ड अल्काइल नॅफ्थॅलीन सल्फोनेट, सोडीयम क्षार	१५.००% व/व
४.	वाहक सिलिकाचा साका	उर्वरित
	एकुण	१००.००% व/व

ડાયફૅન્થિયુરૉન ૫૦% ડબ્લ્યૂ પી

ગેનર

(અંતરપ્રવાહી અને સંપર્ક જંતુનાશક)

ડાયફૅન્થિયુરૉન ૫૦% ડબ્લ્યૂપી (**ગેનર**) એ બ્રોડ સ્પેક્ટ્રમ જંતુનાશક છે જે પાકની ઉપર રહી ગયેલા જંતુઓને લકવ ગ્રસ્ત, નિષ્ક્રિય કરી નાખે છે જ્યાં સુધી ૩-૪ દિવસમાં એમનું મૃત્યુ ન થાય. **ગેનરની** ભલામણ કપાસમાં સફેદ માખી, મોલોમશી, થ્રિપ્સ, લીલા ચૂસિયાં અને કોબીમાં ડાયમંડ બૅક મોથ (ડીબીએમ), મરચાંમાં થતી કથીરી, રીંગણમાં થતી સફેદ માખી તેમજ એલચીમાં થતી થ્રિપ્સ અને સીંગ કોલી ખાતી જીવાતના નિયંત્રણના તેના ઉપયોગ માટે કરવામાં આવે છે. એના ૧ કિ.ગ્રા. માં ૫૦૦ ગ્રામ ડાયફૅન્થિયુરૉન સક્રિય ઘટક તરીકે હોટ છે.

ભલામણો :

પાક	જંતુનું સામાન્ય નામ	માત્રા હેક્ટર દીઠ સ.ઘ. (ગ્રામ)	સૂત્રીકરણ (ગ્રામ)	પાણીમાં દ્રાવણ (લીટર)	છેલ્લા છંટકાવથી લણણી સુધીનો સમયગાળો
એલચી	થ્રિપ્સ, સીંગ કોલી	૪૦૦	૮૦૦	૧૦૦૦	૭ દિવસ
કપાસ	સફેદમાખી મોલોમશી થ્રિપ્સ લીલા ચૂસિયા	૩૦૦	૬૦૦	૫૦૦-૧૦૦૦	૨૧ દિવસ
કોબી	ડાયમંડ બૅક મોથ (પ્લુટેલા ઝાયલોસ્ટેલા)	૩૦૦	૬૦૦	૫૦૦-૭૫૦	૭ દિવસ
રીંગણ	સફેદમાખી	૩૦૦	૬૦૦	૫૦૦-૭૫૦	૩ દિવસ
મરચાં	કથીરી	૩૦૦	૬૦૦	૫૦૦-૭૫૦	૩ દિવસ

સાવચેતી : આ લેબલ/પત્રિકા પર દર્શાવેલા હોય તે સિવાયની ફસલો પર વાપરવું નહીં.

ઉપયોગમાં લેવાની રીત : જંતુનાશકની જરૂરી માત્રા લઈ થોડા પાણીમાં ઉમેરી, એનું મિશ્રણ તૈયાર કરો. હવે નિર્ધારિત માત્રામાં જરૂરિયાત મુજબનું વધારાનું પાણી ઉમેરો જેથી યોગ્ય સ્પ્રેયર વડે વધુમાં વધુ વિસ્તારને અને પાકને આવરી લેવાય.

વપરાશનો સમય : કપાસ: જંતુ ઊભરવાના આરંભિક તબક્કામાં પ્રથમ છંટકાવ કરો અને ત્યાર બાદ જંતુની ઘનતાને આધારે ૧૫ દિવસના અંતરે એક કે બે છંટકાવ [illegible]

డయాఫెంథియురోన్ 50% డబ్ల్యుపి

గైనర్

(స్పర్శాయుత మరియు తీవ్రమైన చర్య గల కీటకనాశిని)

[illegible]

సిఫారసులు:

పంట	కీటకముల యొక్క సామాన్య పేర్లు	స.ప.	మోతాదు/ సూత్రీకరణ (గ్రా.)	హెక్టారుకు నీటి పరిమాణం (లీ.)	చివరి దశ నుండి కోత దశవరకు ఆగవలసిన సమయం
ఏలకులు	ఆకుముడత కాయతొలుచు	400	800	1000	7 రోజులు
ప్రత్తి	తెల్ల దోమలు పేనుబంక దీపపు పురుగులు	300	600	500-1000	21 రోజులు
కాబేజీ	డైమండ్ బ్యాక్ మోత్ (ప్లుటెల్లా జైలోస్టెల్లా)	300	600	500-750	7 రోజులు
వంకాయ	తెల్లదోమలు	300	600	500-750	3 రోజులు
మిరప	ఎర్రనల్లి	300	600	500-750	3 రోజులు

జాగ్రత్త : ఈ లేబుల్/లీఫ్‌లెట్‌లో పేర్కొన్న పంటలు కాకుండా ఇతర పంటలకు వాడరాదు.

వాడుటకు సూచనలు: [illegible]

చల్లవలసిన సమయం: ప్రత్తి : మొదటి పిచికారి, తెగులు కనిపించగానే చేయాలి మరియు ఒకటి లేదా రెండు సార్లు 15 రోజుల వ్యత్యాసంలో తెగులు తీవ్రతని [illegible]

டயாஃபென்தியுரான் 50% WP

கெய்னர்

(தொடுதல் மற்றும் உடல் முழுவதும் பரவக் கூடிய பூச்சிக் கொல்லி)

[illegible]

பரிந்துரைகள்:

பயிர்	பூச்சியின் பொதுப் பெயர்	ஹெக்டேர் ஒன்றுக்கு அளவு தீமூ. (கிராம்)	கலவை (கிராம்)	நீரின் அளவு (லிட்)	கடைசி தெளிப்பிலிருந்து அறுவடைக்கு காத்திருக்க வேண்டிய காலம்
ஏலக்காய்	[illegible]	400	800	1000	7 நாட்கள்
பருத்தி	வெள்ளை ஈ அசுவினி [illegible] தத்துப் பூச்சி	300	600	500-1000	21 நாட்கள்
[illegible] கோஸ்	[illegible] (புளுட்டெல்லா சைலோஸ்டெல்லா)	300	600	500-750	7 நாட்கள்
கத்தரி	வெள்ளை ஈ	300	600	500-750	3 நாட்கள்
மிளகாய்	சிலந்தி [illegible]	300	600	500-750	3 நாட்கள்

எச்சரிக்கை : இந்த லேபில்/கையேட்டில் குறிப்பிட்டு இருக்காத பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக் கூடாது.

உபயோகிப்பதற்கான விதிமுறைகள்: [illegible]

தெளிப்பதற்கான நேரம் : பருத்தி: [illegible]

READ THE LEAFLET CAREFULLY BEFORE USE

उपयोग के पहले पर्चा ध्यानपूर्वक पढ़िये।

FOR AGRICULTURAL USE

कृषि उपयोग के लिए

Diafenthiuron 50%WP

GAINER®

(Systemic and Contact Insecticide)

डायफेन्थुरॉन 50 प्रतिशत डब्ल्यु पी

गेनर

(अंर्तप्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

डायफेन्थियुरॉन ५० प्रतिशत डब्ल्यु पी

गेनर

(आंतरप्रवाही आणिस्पर्शीय कीटकनाशक)

Manufactured & Marketed by: **GHARDA CHEMICALS LIMITED**
Regd. Office: 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai- 400 050. INDIA.
Factory: Plot No. C-4/1, Kherdi M.I.D.C., Village: Kherdi, Taluka: Chiplun, District : Ratnagiri, State: Maharashtra. Pincode : 415604. INDIA.

निर्माता एवं विक्रेता : **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**
पंजी. कार्यालय: ४८ हिल रोड, बांद्रा (प.), मुंबई–४०००५०.भारत.
फैक्टरी : प्लॉट नं. सी–४/१, खेरडी एम.आय.डी.सी., गाँव: खेरडी, तालुका: चिपळुण, जिला: रत्नागिरी, राज्य: महाराष्ट्र, पिनकोड: ४१५६०४. भारत.

उत्पादन कर्ता व विक्रेता : **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**
रजी. कार्यालय: ४८ हिल रोड, बांद्रे (प), मुंबई–४०००५०.भारत.
फॅक्टरी : प्लॅटनं: सी–४/१, खेरडी एम.आय.डी.सी., गाव: खेरडी, तालुका: चिपळुण, जिल्हा: रत्नागिरी, राज्य : महाराष्ट्र, पिनकोड: ४१५६०४. भारत.

For any complaints, contact Customer Care Executive at Gharda Chemicals Limited, 48, Hill Road, Bandra (W), Mumbai-400050, **Tel.: 022 26551988/66265999, Email: consumercare@gharda.com**

®-Registered Mark of Gharda Chemicals Limited

Caution: Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. Destroy the container after use as directed on leaflet.

सावधानी : लेबल और पर्ची पर जो अभिदत्त है, उससे भिन्न अन्य प्रयोजन में उपयोग के लिए नहीं। पर्ची के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात् आधान को नष्ट करें।

खबरदारी: लेबल आणि पत्रकांवर जो उल्लेख केला आहे, त्या व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही हेतूसाठी वापरले जाऊ नये. पत्रकाच्या निर्देशानुसार वापरानंतर कंटेनर नष्ट करा.

K.04.23-01

ಡಯಾಫೆನ್‌ಥಿಯುರಾನ್ 50% ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿ

ಗೈನರ್

(ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೀಟನಾಶಕ)

ਡਾਇਆਫ਼ੈਨਥਿਉਰਾਨ ੫੦% ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.

ਗਾਯਨੇਰ

(ਸਪਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

ਡਾਇਆਫ਼ੈਨਥਿਉਰਾਨ ੫੦% ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. (**ਗਾਯਨੇਰ**) ਇਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਟ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਿਲਜੁਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਏ-ਪਏ ੩-੪ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਮੇਨਸਟਾਰ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ, ਚੇਪਾ, ਪੱਤਾ ਜੂੰ, ਤੇਲਾ, ਬੰਦਗੋਭੀ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾਰ ਭੰਭਟ, ਮਿਰਚ ਵਿੱਚ ਮਾਈਟ ਘੁਣ, ਬੈਂਗਣ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਜੂੰ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਛੇਦਕ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਫ਼ੈਨਥਿਉਰਾਨ ...

ডায়াফেনথিউরান ৫০% ডব্লিউপি

গাইনের

(যোগাযোগ এবং পদ্ধতিগত কীটনাশক)

ডায়াফেনথিউরন ৫০ ডব্লিউপি (গাইনের) একটি বিস্তৃত কার্যক্ষম কীটনাশক। এটি কীটকে অসাড় করে দেয় বা প্রায় ৩-৪ দিনে মৃত্যু অবধি ফসলের উপর নিশ্চল হয়ে থাকে। গাইনের ৫০ ডব্লিউপি তুলোতে সাদামাছি, জাবপোকা, থ্রিপ, শ্যাম পোকা এবং বাঁধাকপিতে ডায়মণ্ড ব্যাক মথ (ডিবিএম) বা সুরুই পোকা, লঙ্কাতে মাকড়, বেগুনের সাদামাছি এবং এলাচিতে থ্রিপ ও ম্যারসুল ছিদ্রক পোকার দমনে ব্যবহার করা হয়। এতে আছে কীটনাশকের এক কেজিতে সক্রিয় উপাদান রূপে ৫০০ গ্রাম ডায়াফেনথিউরন।

ഡയാഫെൻഥിയൂനോൺ 50% ഡബ്ല്യൂപി

ഗെയ്നർ

(സ്പർശന അന്തർ വ്യാപന കീടനാശിനി)

ডায়েফেনথিউৰন ৫০% ডব্লিউপি

গায়নেৰ

(যোগাযোগ আৰু পদ্ধতিগত কীটনাশক)

ডায়েফেনথিউৰন ৫০% ডব্লিউপি গায়নেৰ হ'ল এবিধ বহু উপযোগী কীটনাশক। ই-কীট পতঙ্গবিলাকক বাতব্যাধিগ্ৰস্ত কৰি তোলে যাৰ ফলস্বৰূপে সেইবিলাক প্ৰায় ৩-৪ দিনৰ ভিতৰত নমৰালৈকে শস্যসমূহত নিশ্চল হৈ থাকে। পেজাৰ কপাহৰ বগামাখি, মোৰাপোক, থ্ৰিপচ, মাখিপোক, বন্ধাকবিৰ ডায়মণ্ড বেক মথ, জলকীয়াৰ দুণপোক, বেঙেনাৰ বগামাখি তথা ইলাচিৰ থ্ৰিপচ আৰু বীজকোষ, খোৰা পোক আদি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অনুমোদন ...

ଡାୟାଫେଣ୍ଥିୟୁରୋନ ୫୦% ଡବ୍ଲୁପି

ଗାଇନେର

(ସଂସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ଶରୀର ଭେଦୀ କୀଟନାଶକ)

ଡାୟାଫେଣ୍ଥିୟୁରୋନ ୫୦% ଡବ୍ଲୁପି ଗାଇନେର ହେଉଛି, ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବକାରୀ କୀଟନାଶକ। ଏହି କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶସ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମିତ କରୁଥିବା କୀଟମାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତେଜ ଏବଂ ଗତିହୀନ କରାଇ ଦେବା ସହିତ ୩-୪ ଦିନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୀଟମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ମେନସ୍ଟାର କୁ କପା'ର ଧଳାମାଛି, ଜଉଥା, ଉକୁଣି ଓ ହଳଦିଗୁଣ୍ଡି, ତଥା ବନ୍ଧାକୋବି'ର ଠିକିରିଆ ପୋକ, ଲଙ୍କା'ର ବରୁଥୀ, ବାଇଗଣ'ର ଧଳାମାଛି, ଅଳେଇଚ'ର କ୍ୟାପ୍ସୁଲ ବୋରର୍ ପରି ଅପକାରୀ କୀଟପୋକଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥାଏ। ୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ଉକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ...

READ THE LEAFLET CAREFULLY BEFORE USE

उपयोग के पहले पर्चा ध्यानपूर्वक पढ़िये।

FOR AGRICULTURAL USE

कृषि उपयोग के लिए

Diafenthiuron 50%WP

GAINER®

(Systemic and Contact Insecticide)

डायफेन्थुरॉन 50 प्रतिशत डब्ल्यु पी

गेनर

(अंर्तप्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

डायफेन्थियुरॉन ५० प्रतिशत डब्ल्यु पी

गेनर

(आंतरप्रवाही आणिस्पर्शीय कीटकनाशक)

Manufactured & Marketed by: **GHARDA CHEMICALS LIMITED**
Regd. Office: 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai- 400 050. INDIA.
Factory: Plot No. C-4/1, Kherdi M.I.D.C., Village: Kherdi, Taluka: Chiplun,
District : Ratnagiri, State: Maharashtra, Pincode : 415604. INDIA.

निर्माता एवं विक्रेता : **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**
पंजी. कार्यालय: ४८ हिल रोड, बांद्रा (प.), मुंबई-४०००५०.भारत.
फैक्टरी : प्लॉट नं. सी-४/१, खेरडी एम.आय.डी.सी., गाँव: खेरडी, तालुका: चिपळुण,
जिला: रत्नागिरी, राज्य: महराष्ट्र, पिनकोड: ४१५६०४. भारत.

उत्पादन कर्ता व विक्रेता : **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**
रजी. कार्यालय: ४८ हिल रोड, बांद्रे (प), मुंबई-४०००५०.भारत.
फॅक्टरी : प्लॉट नं: सी-४/१, खेरडी एम.आय.डी.सी., गाव: खेरडी, तालुका: चिपळुण,
जिल्हा: रत्नागिरी, राज्य : महाराष्ट्र, पिनकोड: ४१५६०४. भारत.

For any complaints, contact Customer Care Executive at Gharda Chemicals Limited, 48, Hill Road, Bandra (W), Mumbai-400050, **Tel.: 022 26551988/66265999, Email: consumercare@gharda.com**

®-Registered Mark of Gharda Chemicals Limited

Caution: Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. Destroy the container after use as directed on leaflet.

सावधानी : लेबल और पर्ची पर जो अभिदत्त है, उससे भिन्न अन्य प्रयोजन में उपयोग के लिए नहीं। पर्ची के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात् आधान को नष्ट करें।

खबरदारी: लेबल आणि पत्रकांवर जो उल्लेख केला आहे, त्या व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही हेतूसाठी वापरले जाऊ नये. पत्रकाच्या निर्देशानुसार वापरानंतर कंटेनर नष्ट करा.

K.04.23-01