IYE®

Thiamethoxam 25% WG

(Insecticide)

Read Leaflet Before Use.
Thiamethoxam 25 % WG is broad spectrum systemic insecticide having quick stomach and contact action and is recommended for its use to control Stem Borer, Gall Midge, Leaf Folder, Brown Plant Hopper (BHP), White Backed Plant Hopper (WBPH) Green Leaf Hopper (GLH), Thrips on rice; jassids, aphids and whiteflies in cotton; hoppers in mango; aphids in Wheat; aphids, Jassids in Okra; aphids in Mustard; Whiteflies in Tomato; Whiteflies, Jassids in Brinjal; mosquito bug in Tea & aphics in Potato, Psylla in Citrus and aphid in cumin. It contains 250g Thiamethoxam as an active in ingredient in a kg of the product (w/w).

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/Ha			Waiting Period between last spray to harvest (days)
		A.I. (gm)	Formulation (gm)	Dilution in Water (Ltr.)	
Mango	Hoppers	25	100	1000	30
Potato	Aphids, (Myzus persicae)	25 (foliar spray) 50 (Soil drench)	100 (foliar spray) 200 (Soil drench)	500	77
Cotton	Jassids, Aphids	25	100	500-750	21
	White flies	50	200	500-750	21
Wheat	Aphids	12.5	50	500	21
Tea	Mosquito bug (Helopeltis theivora)	25	100	400-500	7
Cumin	Aphid	25	100	500	15
Tomato	Whiteflies	50	200	500	5
Tomato (soil drenching)	Whiteflies	100	400	500	5
Rice	Stem borer, Gall Midge, Leaf Folder, Brown Plant, Hopper (BPH), White backed Plant Hopper (WBPH), Green leafhopper, Thrips	25	100	500-750	14
Rice (Nursery)	Whort maggot	500	2000	250m/gm	86
Citrus	Pyslla (Diaphoria C tri)	25	100	1000	20
Brinjal	Whiteflies, Jassids	50	200	500	3
Okra	Jassids, Aphids, Thrips,White flies	25	100	500-1000	5
Mustard	Aphid	12.5-25.0	50-100	500-1000	21

Direction Of Use:
Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop with suitable sprayer.

P.P. Equipment:- Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer, Compression knapsack battery sprayer, Battery operated k-power sprayer and ASPEE-HTP power sprayer.

Time of Application:
1. Mango: Hoppers (Apply first spray during initial pest appearance and repeat one or two sprays at 15 days interval depending on the level of pest intensity).
2. Potato: Foliar-application- Apply first spray during initial pest appearance and repeat 2-3 sprays at 10-15 days interval depending on the level of pest intensity. Soil drench - Apply root zone before appearance of pest as soil drench, once during the crop season.
3. Cotton: Apply first spray at 25-30 DAS or at the time of first pest appearance and repeat 2-3 sprays at 15 days interval depending on the pest intensity.
4. Wheat: Apply first spray during initial pest appearance and repeat one or two sprays at 15 days interval depending on the level of pest intensity.
5. Tea : Apply first spray during initial pest appearance and repeat 2-3 sprays at 15-21 days interval depending on the level of pest intensity.
6. Tomato: Apply first spray during initial pest appearance and repeat 2-3 sprays at 10-15 days interval depending on the level of pest intensity. Soil drench: Apply root zone before appearance of pest as soil drench, once during the crop season.
7. Rice : One spray at 25-30 DAT in the early stage of crop for control of early rice pests such as Stem Borer, Gall Midge and the other spray at the booting leaf stage (@ 50 to 55 DAT) for the control of late rice pests such as GLH, BPH, WBPH etc.
8. Brinjal : Apply first spray during initial pest appearance and repeat 2-3 sprays at 10-15 days interval depending on the level of pest intensity.
9. Okra : Apply first spray during initial pest appearance and repeat one or two sprays at 15 days interval depending on the pest intensity.
10. Mustard : Apply first spray during initial pest appearance and repeat one or two sprays at 15 days interval depending on the level of pest intensity.
11. Citrus: Apply first spray during initial pest appearance and repeat 2-3 sprays at 15-21 days interval depending on the level of pest intensity.

Precaution:
1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and Animals food.
2. Avoid contact with mouth, eyes and skin.
3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms Of Poisoning:
Decrease spontaneous movement, tonic convulsion, ptosis may occur.

First Aid:
1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious.
2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water.
3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes.
4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote:
No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal Of Used Container:
1. Packages or surplus materials and washing from machines and containers should be dispose off in a safe manner as to prevent environment and water pollution.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse.
3. packages shall be broken and burried away from habibtation.

Storage Conditions:
1. The package containing the insecticide should be stored in original containers in separate rooms or premises away from rooms or premises used for storing other article particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key.
2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition:

Thiamethoxam a.i.	25.00% w/w
Dispersing Agent-sodium Lignosulphate	5.00% w/w
Weting Agent Sodium Lauryl Sulphate	3.75% w/w
Plasticiser-Butylated polyvinyl pyrrolidoine	1.25% w/w
Carrier Diatomaceous earth	5.00% w/w
Binder corn starch	Q.S% w/w
Total	**100.00% W/W**

Caution : Not to be used on crops other than specified on this Label/leaflet.

" DANGEROUS TO RE USE EMPTY CONTAINER "

आयी

थायामेथोक्साम २५ प्रतिशत डब्ल्यू जी

(कीटनाशक)

इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़े।
थायामेथोक्साम २५ डब्ल्यू जी एक अंतर्प्रवाही कीटनाशक है जो तीव्र उदरीय तथा सम्पर्क क्रियाशीलता रखता है तथा इसकी सिफारिश धान की फसल पर लगने वाले तना छेदक, गाजू मक्खी, पत्ता मोड़क, भूरा पत्ती टिड्डा, सफेद पौधा टिड्डा, हरा पत्ती टिड्डा, चुरदा, कपास में माहू, तेला, सफेद मक्खी, आम में टिड्डे, गेहूँ में माहू, बैंगन में सफेद मक्खी व तेला, सरसों में माहू, भिंडी में माहू व तेला, टमाटर में सफेद मक्खी, चाय में मच्छर कीट तथा आलू में माहू, नींबू में सिल्ला तथा जीरे में माहू की रोकथाम के लिए किया जाता है। इसमें उत्पादन के प्रति किलो (व/व) में २५० ग्राम थायामेथोक्साम सक्रिय तत्व के रूप में किया जाता है।

उपयोग

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टर मात्रा		पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)
		स.तत्व (ग्राम)	संरचना (ग्राम)		
आम	टिड्डे	२५	१००	१०००	३०
आलू	माहू	२५ (पत्तों पर छिड़काव) ५० (मिट्टी को भिगोना)	१०० (पत्तों पर छिड़काव) २०० (मिट्टी को भिगोना)	५००	७७
कपास	माहू, तेला	२५	१००	५००-७५०	२१
	सफेद मक्खी	५०	२००	५००-७५०	२१
गेहूँ	माहू	१२.५	५०	५००	२१
चाय	चाय का मच्छर कीट	२५	१००	४००-५००	७
जीरा	माहू	२५	१००	५००	१५
टमाटर	सफेद मक्खी	५०	२००	५००	५
टमाटर (भूमि उपचार)	सफेद मक्खी	१००	४००	५००	५
धान	तना छेदक, गाजू मक्खी, पत्ता मोड़क, भूरा पत्ती टिड्डा, सफेद पौधा टिड्डा, सफेद पीठ टिड्डा, हरा पत्ती टिड्डा, चुरदा	२५	१००	५००-७५०	१४
धान (नर्सरी)	धान का हरा पत्ती फुदका, चुरदा, एवं भ्रमर मैगट	५००	२०००	२५० मि.ली./ग्राम	८६
नींबू	सिल्ला	२५	१००	१०००	२०
बैंगन	सफेद मक्खी, तेला	५०	२००	५००	३
भिंडी	माहू, तेला	२५	१००	५००-१०००	५
सरसों	माहू	१२.५-२५.०	५०-१००	५००-१०००	२१

उपयोग के लिये निर्देश
उत्पाद का लिखित मात्र लीजीए उसे थोड़े पानी के साथ अच्छी तरह मिलाइए तथा किसी भी योग्य स्प्रेयर से पूरी फसल मे कीजिए। निर्दिष्ट मात्रा का बाकी पानी भी अच्छी तरह से हिलाकर मिला लीजिए।

प्रयोग का समय :
१. आम : पहले छिड़काव पहली बार कीटों के नजर आने पर और उसके बाद १५ दिनो के अंतर से १-२ छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर।
२. आलू : पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद १०-१५ दिनों के अंतर से २-३ छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर। भूमी उपचार - कीटो के नजर आने से पहले, पौधों की जड़ की क्षेत्र को एक बार कीटनाशक से भिगो दें।
३. कपास : पहली छिड़काव बुआई के २५-३० दिनो के बाद पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद २-३ छिड़काव १५ दिनो के अंतर से कीटो की मौजूदगी के आधार पर।
४. गेहूँ : पहले छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद १५ दिनो के अंतर से १-२ छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर।
५. चाय : पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद १५-२१ दिनों के अंतर से २-३ छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर।
६. टमाटर : पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद १०-१५ दिनो के अंतर से २-३ छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर। भूमी उपचार - कीटो के नजर आने से पहले, पौधों की जड़ की क्षेत्र को एक बार कीटनाशक से भिगो दें।
७. धान : रोपाई के २५-३० दिनों के बाद एक छिड़काव फसल पर आने वाले धान के शुरुआती कीटों जैसे कि तना छेदक, गाजू मक्खी आदि की रोकथाम के लिए, तत्पश्चात रोपाई के ५०-५५ दिनों के बाद दूसरा छिड़काव धान के फसल पर बाद की अवस्था पर आने वाले कीटों जैसे कि भूरा पत्ती टिड्डा, सफेद पौधा टिड्डा, हरा पत्ती टिड्डा, आदि की रोकथाम के लिए कीटों की मौजूदगी के आधार पर।
८. बैंगन : पहले छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद १०-१५ दिनो के अंतर से २-३ छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर।
९. भिंडी : पत्ते पर छिड़काव - पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद १५ दिनो के अंतर से १-२ छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर
१०. सरसों : पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद १५ दिनों के अंतर से १-२ छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर।
११. नींबू : पहले छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद १५-२१ दिनो के अंतर मे २-३ छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर।

प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानिया :
१. खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें।
२. मुंह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचें।
३. छिड़काव की बाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें हवा की दिशा में छिड़काव करें।
४. छिड़काव के बाद दूषित कपडो और शरीर के अंग को अच्छी तरह धोएं।
५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना, और कुछ चबाना नहीं चाहिए।
६. छिड़काव करते या मिलाने समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विष के लक्षण :
विष के लक्षण से शरीर में ढीलापन, मिर्गी जैसे झटके और पोसिस हो सकते है।

प्राथमिक चिकित्सा :
१. यदि निगल जाएं तो उल्टी न करनें या कोई पदार्थ मुहँ द्वारा न दें
२. यदि निगल जाएं तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें
३. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो उनको उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं।
४. यदि आखें दूषित हो जाएं तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन साफ पानी से लगभग १०-१५ तक धोएं।
५. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

विष नाशक :
कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा :
१. पर्यावरण तथा पानी के प्रदूषण बचाने के लिए डिब्बे, बचा हुआ घोल/पदार्थ मशीनों की धोवन और खाली डिब्बों का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें
२. पैकेज/डिब्बों को तोड़-फोड़कर आबादी से दूर जमीन में गड्ढा दबा चाहिए
३. उपयोग किए गए पैकेजो/डिब्बों को बाहर न छोडे ताकि उनका दुबारा उपयोग न हो

संग्रहण की शर्ते :
१. कीटनाशक रखे हुए डिब्बों/पैकेजस को उनके कमरे या जगहें, जिनमें अन्य वस्तुएं रखी जाती हैं, उनसे दूर रखना चाहिए अलग अलमारियों में ताला-चाबी लगाकर फफूंदनाशक की प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखें।
२. जिस कमरे या अलमारी मे फंफूदनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशमय, हवादार तथा पर्याप्त आकार का होना चाहिए।

रासायनिक संरचना:

थायामेथोक्साम सक्रिय तत्व	२५.००% भार/भार
छितरानेवाले तत्व सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	५.००% भार/भार
गीले होने वाले तत्व सोडियम लॉरिल सल्फेट	३.७५% भार/भार
प्लास्टिसायजर ब्यूटीलेटेड पॉली विनाइल पायरोलिडॉन	१.२५% भार/भार
रावाहक डायएटोओगेस्अरा मिट्टी	५.००% भार/भार
बाईन्डर कॉर्न स्टार्च	पर्याप्त मात्रा % भार/भार
योग:	१००.००% भार/भार

चेतावनी: इस लेबल/लीफलेट पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल ना करें।

" खाली कंटेनर का दोबारा उपयोग करना खतरनाक है। "

आयी

थायामेथॉक्झाम २५% डब्ल्यूजी

(किटकनाशक)

वापरण्यापूर्वी माहिती पत्रक वाचा.
थायामेथॉक्झाम २५% डब्ल्यूजी हे उदर आणि स्पर्श कार्यशीलता असणारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम अंतर्प्रवाही कीटकनाशक असून त्याचा उपयोग भातावरील खोडकिडा, गादमाशी, पाने गुंडाळणारा किडा, ब्राऊन प्लँट हॉपर (बीपीएच), व्हाइट बॅक्ड प्लँट हॉपर (डब्ल्यूबीपीएच), ग्रीन लीफ हॉपर (जीएलएच), फुलकिडा, कापसावरील तुडतुडे, मावा आणि पांढरी माशी, आंब्यावरील तुडतुडे, गव्हावरील मावा, भेंडीवरील मावा, तुडतुडे आणि पांढरी माशी, मोहरीवरील मावा; टोमॅटोवरील पांढरी माशी; वांग्यावरील पांढरी माशी, तुडतुडे; चहावरील मॉस्किटो बग आणि बटाट्यावरील मावा या कीटकांच्या नियंत्रणासाठी याच्या वापराची शिफारस केली जाते. यामध्ये एक किलोच्या उत्पादनात (व/व) २५० ग्रॅ थायामेथॉक्झाम कार्यकारी घटक म्हणून असते.

शिफारस

पीक	कीटकाचे सामान्य नाव	मात्रा/हेक्टर			शेवटची फवारणी आणि कापणीच्या दरम्यान थांबण्याचा कालावधी (दिवस)
		स.घ. (ग्राम)	मिश्रण (ग्राम)	पाण्यात सौम्यीकरण (लीटर)	
आंबा	हॉपर्स	२५	१००	१००	३०
बटाटा	मावे (मायझस पेरिस्के)	२५ (पालवीवर फवारणी) ५० (माती भिजवणे)	१०० (पालवीवर फवारणी) २०० (माती भिजवणे)	५००	७७
कपाशी	तुडतुडे, मावे	२५	१००	५००-७५०	२१
	पांढऱ्या माशा	५०	२००	५००-७५०	२१
गहू	मावे	१२.५	५०	५००	२१
चहा	मास्क्विटो बग (हेलोपेल्टीस थीवोरा)	२५	१००	४००-५००	७
जिरे	मावा	२५	१००	५००	१५
टोमॅटो	पांढऱ्या माशा	५०	२००	५००	५
टोमॅटो (माती भिजवणे)	पांढऱ्या माशा	१००	४००	५००	५
भात	खोड पोखरणारा किडा, हाल मिज, पाने गुंडाळणारी अळी, ब्राउन प्लँट हॉपर (बीपीएच), पांढऱ्या पाठीचा प्लँट हॉपर (डब्ल्यूबीपीएच), हिरवा लीफ हॉपर, थ्रीप्स	२५	१००	५००-७५०	१४
सायट्रस	पायसल्ला (डायफोरिया सिट्री)	२५	१००	१०००	२०
वांगी	पांढऱ्या माशा, तुडतुडे	५०	२००	५००	३
भेंडी	तुडतुडे, मावे	२५	१००	५००-१०००	५
मोहरी	मावे	१२.५-२५.०	५०-१००	५००-१०००	२१

वापरासाठी सूचना :
आवश्यक तेवढे उत्पादन मोजून घ्या आणि थोड्याश्या पाण्यात ते चांगले मिसळा. टँकमध्ये वाढवलेले आहे तेवढे उरलेले पाणी ओता आणि चांगले ढवळा. योग्य अशा फवारणी यंत्र घेऊन संपूर्ण पिकावर फवारणी व्हावी अशी फवारणी करा.
पी. पी. उपकरण - नॅपसॅक फवारक, फूट-फवारक, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक फवारक, कंप्रेशन नॅपसॅक बॅटरी फवारक, बॅटरीवर चालणारा के-पॉवर फवारक आणि ॲस्पी-एचटीपी पॉवर फवारक.

वापरण्याची वेळ:
१. अंबा: हॉपर्स (सुरवातीला कीटक दिसल्यावर पहिली फवारणी करा आणि कीटकाच्या तीव्रतेनुसार १५ दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन फवारण्या पुन्हा करा.)
२. बटाटा: पालवीवर फवारणी: सुरवातीला कीटक दिसल्यावर पहिली फवारणी करा आणि कीटकाच्या तीव्रतेनुसार १५ दिवसांच्या अंतराने २ - ३ फवारण्या पुन्हा करा.
माती भिजवणे - पीकाच्या हंगामात एकदा, पहिल्यांदा दिसल्यावर मुळाच्या भागात माती भिजवण्यासाठी म्हणून वापरा.
३. कपाशी: २५-३० डीएएसवर किंवा सुरुवातील कीटक दिसल्यावर पहिली फवारणी करा आणि कीटकाच्या तीव्रतेनुसार १५ दिवसांच्या अंतराने २-३ फवारण्या पुन्हा करा.
४. गहू: सुरवातीला कीटक दिसल्यावर पहिली फवारणी करा आणि कीटकाच्या तीव्रतेनुसार १५ दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन फवारण्या पुन्हा करा.
५. चहा: सुरुवातीला कीटक दिसल्यावर पहिली फवारणी करा आणि कीटकाच्या तीव्रतेनुसार १५-२१ दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन फवारण्या पुन्हा करा.
६. टोमॅटो: सुरुवातील कीटक दिसल्यावर पहिली फवारणी करा आणि कीटकाच्या तीव्रतेनुसार १०-१५ दिवसांच्या अंतराने २-३ फवारण्या पुन्हा करा.
माती भिजवणे: पीकाच्या हंगामात एकदा, पहिल्यांदा दिसल्यावर मुळाच्या भागात माती भिजवण्यासाठी म्हणून वापरा.
७. भात:पीकाच्या सुरवातीच्या टप्प्यावर २५-३० डीएटीवर खोड पोखरणारा किडा, गाल मिजसारख्या भाताच्या सुरवातीच्या कीटकांच्या नियंत्रणासाठी एक फवारणी करा आणि दुसरी फवारणी बूटिंग लीफ टप्प्यावर (५० ते ५५ डीएटीवर) जीएलएच, बीपीएच, डब्ल्यूबीपीएच वगैरेसारख्या कीटकांच्या नियंत्रणासाठी करा.
८. वांगी: सुरुवातील कीटक दिसल्यावर पहिली फवारणी करा आणि कीटकाच्या तीव्रतेनुसार १०-१५ दिवसांच्या अंतराने २-३ फवारण्या पुन्हा करा.
९. भेंडी : सुरुवातील कीटक दिसल्यावर पहिली फवारणी करा आणि कीटकाच्या तीव्रतेनुसार १५ दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन फवारण्या पुन्हा करा.
१०. मोहरी: सुरुवातीला कीटक दिसल्यावर पहिली फवारणी करा आणि कीटकाच्या तीव्रतेनुसार १५ दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन फवारण्या पुन्हा करा.
११. सायट्रस: सुरुवातीला कीटक दिसल्यावर पहिली फवारणी करा आणि कीटकाच्या तीव्रतेनुसार १५-२१ दिवसांच्या अंतराने २-३ फवारण्या पुन्हा करा.

सावधगिरी
१. अन्नपदार्थांपासून, अन्नपदार्थांच्या रिकाम्या भांड्यांपासून आणि जनावरांच्या खाद्यापासून दूर ठेवा.
२. कीटकनाशक तोंडात, डोळ्यांत आणि त्वचेला लागू देऊ नका.
३. फवाऱ्याच्या बारीक कणांना श्वासावाटे आत घेऊ नका. फवारणी वाऱ्याच्या दिशेने करा.
४. फवारणी झाल्यावर कीटकनाशक लागलेले कपडे आणि शरीराचे भाग चांगले व्यवस्थित धुवा.
५. फवारणी करताना काहीही खाऊ पिऊ नका, चघळू नका, धूम्रपान करू नका.
६. मिश्रण करताना आणि फवारणी करताना संपूर्ण संरक्षक कपडे घाला.

विषबाधेची लक्षणे :
ऐच्छिक (स्पाँटेनियस) हालचाली कमी होणे, झटके येणे, टोसिस ही लक्षणे दिसू शकतात.

प्रथमोपचार:
१. जर गिळले गेले असेल तर घशाच्या पाठीमागे बोट फिरवून उलटी काढा. उलटी स्वच्छ येईपर्यंत ही क्रिया चालू ठेवा. ती व्यक्ती जर बेशुद्ध असेल तर उलटी काढू नका.
२. जर कपड्यांना आणि त्वचेला कीटकनाशक लागलेले असेल तर कपडे काढून टाका आणि भरपूर पाण्याने व साबणाने कीटकनाशक लागलेली त्वचा धुवून काढा.
३. जर डोळ्यात गेले असेल तर मीठाच्या/स्वच्छ अशा भरपूर पाण्याने डोळे चांगले १० ते १५ मिनिटे धुवा.
४. जर श्वासाद्वारे आत गेले असेल, तर त्या व्यक्तीला ताज्या हवेमध्ये न्या.

प्रतिविष:
विशिष्ट असे प्रतिविष ज्ञात नाही. लक्षणांनुसार इलाज करा.

वापरलेल्या धारकांची विल्हेवाट :
१. जलप्रदूषण आणि वातावरणाचे प्रदूषण टाळण्यासाठी पॅकेजेस, उरलेले कीटकनाशक, यंत्रणे आणि भांडी धुतलेले पाणी यांची सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावली पाहिजे.
२. वापरलेली पॅकेजेस पुन्हा वापरली जाऊ नयेत म्हणून ती बाहेर ठेवू नका.
३. पॅकेजेस मोडून तोडून टाका आणि वस्तीपासून दूर नेऊन पुरा.

साठवण:
१. कीटकनाशक भरलेली पॅकेजेस त्यांच्या मूळ धारकांमध्ये अशी स्वतंत्र खोल्यांमध्ये किंवा आवारांमध्ये ठेवली पाहिजेत, ह्या खोल्या/आवारे ही इतर गोष्टी, विशेषतः अन्नपदार्थ, साठवण्याच्या खोल्यांपासून/आवारांपासून दूर असली पाहिजेत. तसेच ही पॅकेजेस स्वतंत्र कपाटांमध्ये कुलूप लावून ठेवली पाहिजेत.
२. वाफेचे प्रदूषण होऊ नये म्हणून कीटकनाशके ठेवण्याच्या खोल्या/आवारे मजबूत, कोरड्या, चांगला प्रकाश येणाऱ्या, खेळती हवा असणाऱ्या आणि पुरेश्या मोठ्या असल्या पाहिजेत.

रासायनिक मिश्रण:

थियोमेथोक्झाम सक्रीय तत्व	२५.००० % डब्ल्यू/डब्ल्यू
तरल पाडणारे- सोडियम लिग्नोसल्फेट	५.००० % डब्ल्यू/डब्ल्यू
विरघळणारे माध्यम सोडियम लॉरिल सल्फेट	३.७५० % डब्ल्यू/डब्ल्यू
प्लास्टिसायजर – ब्युटिलेटेड पॉलीविनाईल पायरॉलीडाईन	१.२५० % डब्ल्यू/डब्ल्यू
करिअर डायटोमॅसियस अर्थ	५.००० % डब्ल्यू/डब्ल्यू
बाईंडर तथा स्टार्च	पुरेशा प्रमाणात %डब्ल्यू/डब्ल्यू
एकूण	१००.०० % डब्ल्यू/डब्ल्यू

सावधगिरी : ह्या लेबल/पत्रिका वर निर्देशित पीका व्यतिरिक्त इतर पीकावर वापरु नये.

" रिकामे कंटेनर पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे."

આયી

થિયોમેથોક્સેમ ૨૫% ડબ્લ્યુજી

(જંતુનાશક)

વાપરતાં પહેલાં પત્રિકા વાંચો.
થિયોમેથોક્સામ ૨૫% ડબ્લ્યુજી વિસ્તૃત ક્રમબદ્ધ પદ્ધતિસર કીટકનાશક છે, જેમાં ઝડપી સ્ટમક અને સંપર્ક પ્રવૃત્તિ છે. તે ભાતમાં સ્ટેમ બોરર (થડમાં છિદ્રો પાડનારા), ગાલ મિજ (વૃક્ષવણ અતિ સૂક્ષ્મ જીવડું), લીફ ફોલ્ડર (પાંદડાં વાળનાર), બ્રાઉન પ્લાન્ટ હોપર (બદામી રોપ ટિડો- બીએચપી), વ્હાઇટ બેક્ડ પ્લાન્ટ હોપર (શ્વેત પીઠ રોપ ટિડો- ડબ્લ્યુબીપીએચ), ગ્રીન લીફ હોપર (લીલ પાંદડાનો ટિડો- જીએલએચ), થ્રિપ્સ (પાંખવાળાં જીવડાં); કપાસમાં જારિદ, મદ્દપુકા અને શ્વેત માખીઓ; આંબામાં ટિડે; ઘઉંમાં મદ્દપુકા; ઓકરામાં જારિદ, મદ્દપુકા અને શ્વેત માખી; રાયમાં મદ્દપુકા; ટમેટામાં શ્વેત માખીઓ; રીંગણમાં શ્વેત માખીઓ, જારિદ; ચામાં મોસ્કયુટો બગ અને બટેટામાં મદ્દપુકાના નિયંત્રણ માટે ઉપયોગ કરવાની ભલામણ છે. તેમાં એક કિલો પ્રોડક્ટ (ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ)માં ઘટકમાં ર ક્રિય તરીકે ૨૫૦ ગ્રા થિયામેથોક્સામ હોય છે.

ભલામણ

પાક	કીટકનું સામાન્ય નામ	માત્રા/હેક્ટર			અંતિમ છંટકાવ અને લણણી વચ્ચેનો પ્રતિક્ષા-ગાળો (દિવસો)
		સ.ત. (ગ્રામ)	સંયોજન (ગ્રામ)	પાણીમાં મંદતા (લી.)	
આંબો	તીતીઘોડા	૨૫	૧૦૦	૧૦૦	૩૦
બટાકાં	ચૂસિયાં, (માયઝસ પર્સિકે)	૨૫ પાંદડાંપર છંટકાવ) ૫૦ (માટી ભીંજવવી)	૧૦૦ (પાંદડાંપર છંટકાવ) ૨૦૦ (માટી ભીંજવવી)	૫૦૦	૭૭
કપાસ	ચૂસિયાં, મોલોમશી	૨૫	૧૦૦	૫૦૦-૭૫૦	૨૧
	સફેદ માખી	૫૦	૨૦૦	૫૦૦-૭૫૦	૨૧
ઘઉં	ચૂસિયાં	૧૨.૫	૫૦	૫૦૦	૨૧
ચ	મોસ્કિટો બગ (હેલોપેલ્ટિસ થેઇવોરા)	૨૫	૧૦૦	૪૦૦-૫૦૦	૭
જીરુ	ચૂસિયાં	૨૫	૧૦૦	૫૦૦	૧૫
ટામેટાં	સફેદ માખી	૫૦	૨૦૦	૫૦૦	૫
ટામેટા (પિયત)	સફેદ માખી	૧૦૦	૪૦૦	૫૦૦	૫
ડાંગર	ડખ છેદક, ગાલ મિજ, પત્રિયાં, કથ્થઇ તીતીઘોડા (બીપીએચ), સફેદ પીઠવાળાં તીતીઘોડા (ડબ્લ્યુબીપીએચ), લીલા તીતીઘોડા, થ્રિપ્સ	૨૫	૧૦૦	૫૦૦-૭૫૦	૧૪
રસાળ ફળો	પ્યાસિલા (ડાયેફોરિયા સાઇટ્રી)	૨૫	૧૦૦	૧૦૦૦	૨૦
રીંગણ	સફેદ માખી, મોલોમશી	૫૦	૨૦૦	૫૦૦	૩
ઓકરા	ચૂસિયાં, મોલોમશી	૨૫	૧૦૦	૫૦૦-૧૦૦૦	૫
મોહરી	ચૂસિયાં	૧૨.૫-૨૫.૦	૫૦-૧૦૦	૫૦૦-૧૦૦૦	૨૧

વપરાશ સંબંધિત માર્ગદર્શન:
આવશ્યક માત્રામાં ઉત્પાદનને લઇને એને થોડા પાણીમાં ભેળવો. નિર્ધારિત માત્રામાં બાકી રહેલું પાણી સારી રીતે ભેળવીને યોગ્ય સ્પ્રેયર વડે પાકને સંપૂર્ણપણે આવરી લે એ રીતે છંટકાવ કરો.
છોડવાને સુરક્ષા અર્પતું ઉપકરણ: નેપસેક સ્પ્રેયર, પાદચાલિત સ્પ્રેયર, કંપ્રેશન નેપસેક સ્પ્રેયર, કંપ્રેશન નેપસેક બૅટરી ચાલિત સ્પ્રેયર, બૅટરી ચાલિત કે-પાવર સ્પ્રેયર અને એસપી-એચટીપી પાવર સ્પ્રેયર.

છંટકાવ કરવાનો સમય:
૧. આંબો: તીતીઘોડા (પ્રથમ છંટકાવ જ્યારે પ્રારંભિક સમયમાં જીવાત નજરે પડે ત્યારે કરો અને જીવાતની તીવ્રતાને ધ્યાનમાં રાખીને ૧૫ દિવસના અંતરાલ બાદ એક અથવા બે વાર દોહરાવો.)
૨. બટાકાં: પાંદડાં પર છંટકાવ - (પ્રથમ છંટકાવ જ્યારે પ્રારંભિક સમયમાં જીવાત નજરે પડે ત્યારે કરો અને જીવાતની તીવ્રતાને ધ્યાનમાં રાખીને ૧૦-૧૫ દિવસના અંતરાલ બાદ ૨ અથવા ૩ વાર દોહરાવો.)
પિયત - પાકની મોસમ દરમિયાન એકવાર, માટીમાં પિયત તરીકે કીટક નજરે પડે એ પહેલાં રૂટ ઝોન તરીકે વાપરો.
૩. કપાસ: પ્રથમ છંટકાવ વાવણીના ૨૫-૩૦ દિવસો પછી પહેલી વાર જીવાત દેખાય ત્યારે કરો અને કીટકની તીવ્રતા અનુસાર ૧૫ દિવસોના અંતરાળ પછી ૨-૩ વાર દોહરાવો.
૪. ઘઉં: પ્રથમ છંટકાવ જ્યારે પ્રારંભિક સમયમાં જીવાત નજરે પડે ત્યારે કરો અને જીવાતની તીવ્રતાને ધ્યાનમાં રાખીને ૧૦-૧૫ દિવસના અંતરાળ બાદ ૨ અથવા ૩ વાર દોહરાવો.)
૫. ચા: પ્રથમ છંટકાવ જ્યારે પ્રારંભિક સમયમાં જીવાત નજરે પડે ત્યારે કરો અને જીવાતની તીવ્રતાને ધ્યાનમાં રાખીને ૧૫-૨૧ દિવસના અંતરાળ બાદ ૨ અથવા ૩ વાર દોહરાવો.)
૬. ટામેટાં: પ્રથમ છંટકાવ જ્યારે પ્રારંભિક સમયમાં જીવાત નજરે પડે ત્યારે કરો અને જીવાતની તીવ્રતાને ધ્યાનમાં રાખીને ૧૦-૧૫ દિવસના અંતરાળ બાદ ૨ અથવા ૩ વાર દોહરાવો.)
પિયતઃ પાકની મોસમ દરમિયાન એકવાર, માટીમાં પિયત તરીકે કીટક નજરે પડે એ પહેલાં રૂટ ઝોન તરીકે વાપરો.
૭. ડાંગર: ડાંગરમાં લાગતી પ્રારંભિક જીવાતો જેવી કે ડખ છેદક, ગાલ મિજના નિયંત્રણ માટે ફેરરોપણીના ૨૫-૩૦ દિવસો પછી એક છંટકાવ અને ફેરરોપણીના ૫૦થી ૫૫ દિવસ પછીના બૂટીંગ લીફ તબક્કામાં ડાંગરની વિલંબિત જીવાતો જેવી કે લીલાં તીતીઘોડા, કથ્થઇ તીતીઘોડા, સફેદ પીઠવાળાં તીતીઘોડા વગેરેના નિયંત્રણ માટે અન્ય છંટકાવ કરો.
૮. રીંગણા: પ્રથમ છંટકાવ જ્યારે પ્રારંભિક સમયમાં જીવાત નજરે પડે ત્યારે કરો અને જીવાતની તીવ્રતાને ધ્યાનમાં રાખીને ૧૦-૧૫ દિવસના અંતરાળ બાદ ૨ અથવા ૩ વાર દોહરાવો.)
૯. ઓકરા: પ્રથમ છંટકાવ જ્યારે પ્રારંભિક સમયમાં જીવાત નજરે પડે ત્યારે કરો અને જીવાતની તીવ્રતાને ધ્યાનમાં રાખીને ૧૫ દિવસના અંતરાળ બાદ એક અથવા બે વાર દોહરાવો.)
૧૦. રાઇ: પ્રથમ છંટકાવ જ્યારે પ્રારંભિક સમયમાં જીવાત નજરે પડે ત્યારે કરો અને જીવાતની તીવ્રતાને ધ્યાનમાં રાખીને ૧૫ દિવસના અંતરાળ બાદ એક અથવા બે વાર દોહરાવો.)
૧૧. રસાળ ફળો: પ્રથમ છંટકાવ જ્યારે પ્રારંભિક સમયમાં જીવાત નજરે પડે ત્યારે કરો અને જીવાતની તીવ્રતાને ધ્યાનમાં રાખીને ૧૫-૨૧ દિવસના અંતરાળ બાદ ૨ અથવા ૩ વાર દોહરાવો.)

તકેદારી
૧. ખાધપદાર્થ, ખાલી ખાધપદાર્થ કન્ટેઇનરો, પશુઓના ખોરાકથી દૂર રાખો.
૨. મુખ, આંખ અને ત્વચા સાથે સંપર્ક ટાળો.
૩. છંટકાવનો ફુવારો શ્વાસમાં લેવાનું ટાળો. હવાની દિશામાં છંટકાવ કરો.
૪. છંટકાવ કર્યા પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરનો ભાગ ચોખ્ખો સાફ કરો.
૫. છંટકાવ કરતી વેળા ધૂમ્રપાન કરવું નહીં, કાંઈ પીવું કે ખાવું નહીં અને ચાવવું પણ નહીં.
૬. મિશ્રણ અને છંટકાવ કરતી વેળા સંપૂર્ણ સંરક્ષણાત્મક કપડાં પહેરો.

ઝેરનાં લક્ષણો
આંતરિક હલનચલન ઘટે છે, ટોનિક કન્વલ્શન, પાંપણ ઝૂકવું ઉદભવી શકે છે.

પ્રાથમિક ઉપચાર
૧. જો ગળી જવાય તો ગળાની પાછળ હલકી થપાટ મારીને ઊલટી કરાવો. ઊલટી પૂરેપૂરી ન થાય ત્યાં સુધી તેનું પુનરાવર્તન કરો. જો દરદી બેશુદ્ધ હોય તો ઊલટી કરવા માટે દબાણ ન કરો.
૨. જો કપડાં અને ત્વચા દૂષિત થયાં હોય તો કપડાં કાઢી નાખો અને દૂષિત ત્વચાને સાબુ તથા પાણીથી સ્વચ્છ ધોઈ નાખો.
૩. જો આંખ દૂષિત થઈ હોય તો આશરે ૧૦થી ૧૫ મિનિટ સુધી આંખ પર ભરપૂર સલાઇન/ સાફ પાણીનો મારો ચલાવો.
૪. જો શ્વાસમાં ગયું હોય તો દરદીને તાજી હવામાં બહાર લાવો.

પ્રતિકારક
કોઈ ચોક્કસ પ્રતિકારક જ્ઞાત નથી. લક્ષણ પ્રમાણે ઉપચાર કરો.

ઉપયોગ કરેલાં કન્ટેઇનરનો નિકાલ
૧. પેકેજ અથવા વધારાની સામગ્રી, વોશિંગ ફ્રોમ મશીનો, કન્ટેઇનરોનો સુરક્ષિત રીતે નિકાલ લાવવો જોઇએ, જેથી પર્યાવરણીય અને જળ પ્રદૂષણ ટળે.
૨. ઉપયોગ કરેલાં પેકેજ ફરી ઉપયોગ ન કરાય તેની તકેદારી રાખવા બહાર નધણિયાતાં નહીં રાખતાં.
૩. પેકેજને તોડી નાખવાં અને વસાહતથી દૂર દફન કરી દેવાં.

જાળવણીની સ્થિતિ
૧. કીટકનાશક ધરાવતા પેકેજને મૂળ કન્ટેઇનરમાં અલગ રૂમ અથવા ટાંકુંમાં જાળવવાં જોઇએ. તેને ખાદ્ય સામગ્રી જેવી કોઈ પણ અન્ય ચીજો રાખાઈ હોય તેનાથી અલગ રૂમ કે ભંડુલમાં રાખવું અથવા તાળાં ચાવી સાથેના અલગ કબાટમાં રાખવું.
૨. કીટકનાશક રાખવા માટેના રૂમ કે સંકુલનું બાંધકામ સારું હોવું જોઇએ, જગ્યા સૂકી હોવી જોઇએ, ઉજાશ સારો હોવો

રાસાયણિક સંમિશ્રણ:

થાયોમેથાક્ઝામ એ.આઈ.	૨૫.૦૦૦% વજન વજન
ડિસ્પર્સિંગ એજન્ટ- સોડિયમ લિગ્નોસલ્ફેટ	૫.૦૦૦% વજન વજન
વેટિંગ એજન્ટ સોડિયમ લોરિલ સલ્ફેટ	૩.૭૫૦% વજન/વજન
પ્લાસ્ટિસાઇઝર-બુટીલેટેડ પોલીવિનાઈલ પાયરોલાઇડાઇન	૧.૨૫૦% વજન વજન
કેરિયર ડાયાટોમિયસ અર્થ	૫.૦૦૦% વજન વજન
બાઇન્ડર કોર્ન સ્ટાર્ચ	પૂરતાં પ્રમાણમાં % વજન/વજન
કુલ	**૧૦૦.૦૦ % વજન/વજન**

સાવચેતી : આ લેબલ/પત્રિકા પર દર્શાવેલા હોય તે સિવાયની ફસલો પર વાપરવું નહીં.

"ખાલી ડબ્બા ફરીથી ઉપયોગ કરવાનું ખતરનાક છે."

ਆਈ

ਥਾਉਮਥੋਕਸਿਮ ੨੫% ਡਬਲਯੂਜੀ

(ਕਿਰਮਨਾਸ਼ਕ)

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਪੜ ਲਓ।
ਥਾਇਆਮੈਥੋਕਜ਼ਾਮ ੨੫% ਡਬਲਯੂ ਜੀ ਇਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਰਬਾਂਗੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਪੇਟ ਅਤੇ ਛੋਹ ਰਾਹੀਂ ਛੇਤੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਾਵਲ ਦੇ ਤਣਾਛੇਦਕ, ਚੋਰੜ, ਪੱਤੀਮੋੜ, ਪੌਦੇ ਦਾ ਭੂਰਾ ਟਿੱਡਾ (ਬੀਐਚਪੀ), ਪੌਦੇ ਦਾ ਚਿੱਟੀ ਪਿਠ ਵਾਲਾ ਟਿੱਡਾ (ਡਬਲਯੂ ਬੀ ਪੀ ਐਚ), ਹਰਾ ਪੱਤਾ ਟੱਡਾ (ਜੀ ਐਲਐਚ), ਥ੍ਰਿਪਸ; ਕਪਾਹ ਦੇ ਤੇਲੇ, ਚੇਪਾ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ; ਅੰਬ ਦੇ ਟਿੱਡੇ; ਕਣਕ ਦੇ ਤੇਲੇ; ਭਿੰਡੀ ਦੇ ਤੇਲੇ, ਚੇਪੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ; ਮਟ੍ਰ ਦੇ ਤੇਲੇ; ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ; ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ, ਚਾਹ ਦੇ ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਤੇਲੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਰੋ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿ ਕਿਲੋ (ਵ/ਵ) ੨੫੦ ਗ੍ਰਾ. ਥਾਇਆਮੈਥੋਕਜ਼ਾਮ ਸਕ੍ਰਿਆ ਤੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

ਫ਼ਸਲ	ਕੀਟ ਦਾ ਆਮ ਨਾਂ	ਖੁਰਾਕ/ ਹੇਕਟਰ			ਅੰਤਿਮ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ)
		ਏ. ਆਈ. (ਗ੍ਰਾ.)	ਸੂਤਰੀਕਰਨ (ਗ੍ਰਾ.)	ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲਿ.)	
ਅੰਬ	ਟਿੱਡੇ	੨੫	੧੦੦	੧੦੦	੩੦
ਆਲੂ	ਮਾਹੂ	੨੫ (ਪੱਤੇ ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ), ੫੦ (ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਭਿਗੋਣਾ)	੧੦੦ (ਪੱਤੇ ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ), ੨੦੦ (ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਭਿਗੋਣਾ)	੫੦੦	੭੭
ਕਪਾਹ	ਮਾਹੂ, ਤੇਲਾ,	੨੫	੧੦੦	੫੦੦-੭੫੦	੨੧
	ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ	੫੦	੨੦੦	੫੦੦-੭੫੦	੨੧
ਕਣਕ	ਮਾਹੂ	੧੨.੫	੫੦	੫੦੦	੨੧
ਚਾਹ	ਚਾਹ ਦਾ ਮੱਛਰ ਕੀਟ	੨੫	੧੦੦	੪੦੦-੫੦੦	੭
ਜੀਰਾ	ਮਾਹੂ	੨੫	੧੦੦	੫੦੦	੧੫
ਟਮਾਟਰ	ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ	੫੦	੨੦੦	੫੦੦	੫
ਟਮਾਟਰ (ਭੂਮੀ ਉਪਚਾਰ)	ਚਿੱਟੀ ਮਖੀ	੧੦੦	੪੦੦	੫੦੦	੫
ਝੋਨਾ	ਤਨਾ ਛੇਦਕ, ਮਾਹੂ ਮੱਖੀ, ਪੱਤਾ ਮੋੜਕ, ਪੱਤੇ ਦਾ ਭੂਰਾ ਟਿੱਡਾ, ਪੌਦੇ ਦਾ ਚਿੱਟੀ ਪਿੱਠ ਵਾਲਾ ਟਿੱਡਾ, ਪੱਤੇ ਦਾ ਹਰਾ ਟਿੱਡਾ, ਚੁਰਦਾ	੨੫	੧੦੦	੫੦੦-੭੫੦	੧੪
ਨਿੰਬੂ	ਸਿਲ (ਪਾਇਰਿਲਾ)	੨੫	੧੦੦	੧੦੦੦	੨੦
ਵਤਾਂਉ	ਚਿੱਟੀ ਮਖੀ, ਚੇਪਾ	੫੦	੨੦੦	੫੦੦	੩
ਭਿੰਡੀ	ਮਾਹੂ, ਤੇਲਾ	੨੫	੧੦੦	੫੦੦-੧੦੦੦	੫
ਰਾਈ	ਮਾਹੂ	੧੨.੫-੨੫.੦	੫੦-੧੦੦	੫੦੦-੧੦੦੦	੨੧

ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ :
ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੈਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਲੋ। ਫੇਰ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਕੇ ਖੂਬ ਰਲਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾਲ ਛਿੜਕੋ।
ਉਪਕਰਣ ਸਪ੍ਰੇਅਰ : ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਫੁਟ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੈਪਸੈਕ ਬੈਟਰੀ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਅਤੇ ਐਸਪੀ-ਐਚਟੀਪੀ ਪਾਵਰ ਸਪ੍ਰੇਅਰ।

ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ :
1. ਅੰਬ – ਪਹਿਲਾ ਛਿੜਕਾਅ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ 1 – 2 ਛਿੜਕਾਅ, ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ
2. ਆਲੂ – ਪਹਿਲਾ ਛਿੜਕਾਅ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ 10 – 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ 2
3. ਛਿੜਕਾਅ, ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਭੂਮੀ ਉਪਚਾਰ – ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਭਿਉਂ ਦਿਉ।
3. ਕਪਾਹ – ਪਹਿਲਾ ਛਿੜਕਾਅ ਬੀਜਾਈ ਦੇ 25 – 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰੀ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ 2 – 3 ਛਿੜਕਾਅ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਤੇ ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ
4. ਕਣਕ ਪਹਿਲਾ ਛਿੜਕਾਅ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ 1 – 2 ਛਿੜਕਾਅ, ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ
5. ਚਾਹ ਪਹਿਲਾ ਛਿੜਕਾਅ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ 15 – 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ 2 – 3 ਛਿੜਕਾਅ, ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ
6. ਟਮਾਟਰ – ਪਹਿਲਾ ਛਿੜਕਾਅ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ 10 – 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ 2 – 3 ਛਿੜਕਾਅ, ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਭੂਮੀ ਉਪਚਾਰ – ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਭਿਉਂ ਦਿਉ।
7. ਝੋਨਾ – ਬਿਜਾਈ ਦੇ 25 – 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਛਿੜਕਾਅ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਾ ਛੇਦਕ, ਮਾਹੂ ਮੱਖੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਛਿੜਕਾਅ ਬੀਜਾਈ ਦੇ 50 – 55 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਕੀਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਤੇ ਦਾ ਭੂਰਾ ਟਿੱਡਾ, ਪੌਦੇ ਦਾ ਚਿੱਟੀ ਪਿੱਠ ਵਾਲਾ ਟਿੱਡਾ, ਪੱਤੇ ਦਾ ਹਰਾ ਟਿੱਡਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ।
8. ਵਤਾਂਉ – ਪਹਿਲਾ ਛਿੜਕਾਅ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ 10 – 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ 2 – 3 ਛਿੜਕਾਅ, ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ
9. ਭਿੰਡੀ – ਪੱਤੇ ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ – ਪਹਿਲਾ ਵਾਰੀ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ 10 – 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ 1 – 2 ਛਿੜਕਾਅ, ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ
10. ਸਰ੍ਹੋਂ – ਪਹਿਲਾ ਛਿੜਕਾਅ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ 1 – 2 ਛਿੜਕਾਅ, ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ
11. ਨਿੰਬੂ ਪਹਿਲਾ ਛਿੜਕਾਅ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ 15 – 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ 2 – 3 ਛਿੜਕਾਅ, ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ :
੧. ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
੨. ਮੂੰਹ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ
੩. ਸਪ੍ਰੇ ਦੀ ਧੁੰਦ ਸਾਹ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਹਵਾ ਚਲਣ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੀ ਛਿੜਕੋ
੪. ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਬਾਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਬਦਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖੂਬ ਧੋਵੋ।
੫. ਛਿੜਕਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ, ਚਬਾਣਾ ਜਾਂ ਧੂਮਰਪਾਨ ਨਾ ਕਰੋ।
੬. ਰਲਾਂਦੇ-ਛਿੜਕਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨੋ।

ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ :
ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹਰਕਤਾਂ ਮੱਠੀਆਂ ਪੈਣਾ, ਕੜਵੱਲ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛੱਪਰ ਢਿਲਕਣੇ ਆਦਿ।

ਫੌਰੀ ਇਲਾਜ :
੧. ਜੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਲੇ ਵਿਚ ਉਂਗਲਾਂ ਫੇਰਕੇ ਉਲਟੀ ਕਰਾਓ ਜਦ ਤਕ ਉਲਟੀ ਸਾਫ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਾਓ।
੨. ਜੇ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰੋ ਅਤੇ ਬਦਨ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹਿੱਸੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਢੇਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।
੩. ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ੧੦ – ੧੫ ਮਿੰਟ ਤਕ ਸਲਾਈਨ / ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਧੋਵੋ।
੪. ਜੇ ਸਾਹ ਵਿਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਿਆਓ।

ਵਿਸ਼ਤੋੜ
ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ਤੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਖ਼ਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ :
੧. ਖ਼ਾਲੀ ਪੈਕਿਟ, ਵਾਧੂ ਘੋਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਬਰਤਨ ਧੁਆਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਐਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਓ ਕਿ ਹਵਾਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਫੈਲੇ।
੨. ਖ਼ਾਲੀ ਡੱਬੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਤਾਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ।
੩. ਖ਼ਾਲੀ ਡੱਬੇ ਤੋੜਕੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੱਬ ਛੱਡੋ।

ਮਾਲਗੁਦਾਮੀ :
੧. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਪੈਕਿਟ ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਖਰੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕ਼ਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਖਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੋ।
੨. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਅਹਾਤੇ ਪੱਕੇ ਬਣੇ, ਸੁੱਕੇ, ਠੰਢੇ, ਰੌਸ਼ਨਦਾਰ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ-ਚੌੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂਕਿ ਹਵਾੜ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਫੈਲੇ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਮਿਸ਼ਰਨ :

ਥਾਉਮਥੋਕਸਿਮ ਏ. ਆਈ.	੨੫.੦੦੦% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਡਿਸਪਰਸਿੰਗ ਏਜੰਟ - ਸੋਡੀਅਮ ਲਿਗਨੋਸਲਫੇਟ	੫.੦੦੦% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਵੈਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਸੋਡੀਅਮ ਲੌਰੀਅਲ ਸਲਫੇਟ	੩.੭੫੦% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਪਲਾਸਟੀਸਾਇਜ਼ਰ ਬੁਟਿਲੇਟਿਡ ਪੋਲੀਵਿਨਿਅਲ ਪਾਇਰਾਲੀਡਾਇਨ	੧.੨੫੦% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਵਾਹਕ ਡਾਇਆਟੋਏਸਿਯਸ ਅਰਥ	੫.੦੦੦% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਬਾਇੰਡਰ ਕੌਰਨ ਸਟਾਰਚ	ਯੋਗ ਮਾਤਰਾ
ਕੁਲ :	੧੦੦.੦੦% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ

ਸਾਵਧਾਨੀ : ਇਸ ਲੇਬਲ/ ਪਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

"ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।"

DIRECTION FOR USE

FOR AGRICULTURAL USE
कृषि उपयोग के लिए

Read Leaflet Before Use
इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

IYE®

Thiamethoxam 25% WG
Insecticide

आयी

थायामेथोक्साम २५ प्रतिशत डब्ल्यू जी
कीटनाशक

Manufactured by:
Saraswati Agro Chemicals (India) Pvt. Ltd.
Regd. Office: Village Dao Majra, Kharar Kurali Road, Distt. S.A.S. Nagar (Mohali), Punjab - 140301.
Factory: Lane-2, Phase-1, SIDCO Industrial Complex, Bari Brahmana, Distt. Jammu-181133 (J&K)

निर्माता : **सरस्वती एग्रो केमिकल्स (इंडिया) प्रा. लि.**
रजि. ऑफिस: गाँव दाव माजरा, खरड़ कुराली रोड, जिला एस.ए.एस. नगर (मोहाली), पंजाब-१४०३०१.
फैक्ट्री: लेन-२, फेस-१, सिडको इण्डस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स, बारी ब्राम्हना, जिला जम्मू-१८११३३ (जे एण्ड के)

Marketed by:
GHARDA CHEMICALS LIMITED
Regd. Office: Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400 050. INDIA

विक्रेता: घरडा केमिकल्स लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: घरडा हाउस, ४८ हिल रोड, बांद्रा (प), मुंबई - ४०० ०५०. भारत

For any complaints, contact Customer Care Executive at Gharda Chemicals Limited, Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400050. INDIA
Tel.: 022 66265998 / 66265999
Email: consumercare@gharda.com
Website: www.gharda.com

® - Registered Trademark of Gharda Chemicals Limited.



JM.02.26-01

আই

থায়ামেথোক্সাম ২৫% ডব্লু. ডি. জি.

(কীটনাশক)

ব্যবহারের পূর্বে লিফলেট পড়ে নিন।

থিয়ামিথোক্সাম ২৫% ডব্লিউজি হচ্ছে এক প্রশস্ত বর্ণচ্ছটার কীটনাশক যা পেটে গিয়ে দ্রুত সংযোগ স্থাপনে সক্ষম এবং চালে স্টেম বোরার, গল মিজ, লিফ ফোল্ডার, ব্রাউন প্ল্যান্ট হপার (বিপিএইচ), হোয়াইট ব্যাকড প্ল্যান্ট হপার (ডব্লিউবিপিএইচ), গ্রিন লিফ হপার (জিএলএইচ), থ্রিপস; তুলোর জ্যাসিড, ছিট-পোকা ও সাদা মাছি; আমে ছিট-পোকা; গমে ছিট-পোকা; ঢ্যাঁড়শে ছিট-পোকা, জ্যাসিড ও সাদা মাছি; সরষেতে ছিট-পোকা; টমেটোতে ছিট-পোকা; বেগুনে সাদা মাছি, জ্যাসিড; চায়ে মশা এবং আলুতে ছিট-পোকা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে। এক কি.গ্রা. প্রোডাক্টে সক্রিয় উপাদান হিসাবে এতে ২৫০ গ্রা থিয়ামিথোক্সাম রয়েছে।

সুপারিশ:

শস্য (গুলি)	পোকার সাধারণ নাম	মাত্রা / হেক্টর			শেষবার স্প্রে করার দিন থেকে ফসল তোলার দিন পর্যন্ত অপেক্ষার সময়কাল (দিন)
		এ.আই. (গ্রাম)	মিশ্রণ (গ্রাম)	জলের মধ্যে দ্রবণ (গ্রাম)	
আম	ফড়িং	২৫	১০০	১০০	৩০
আলু	অ্যাফিডস, (মাইজাস পার্সিসে)	২৫ (ফোলিয়ার স্প্রে) ৫০ (জমিতে জলসেচ)	১০০ (ফোলিয়ার স্প্রে) ২০০ (জমিতে জলসেচ)	৫০০	৭৭
তুলা	জ্যাসিডস, অ্যাফিডস	২৫	১০০	৫০০-৭৫০	২১
	সাদা মাছি	৫০	২০০	৫০০-৭৫০	২১
গম	অ্যাফিডস	১২.৫	৫০	৫০০	২১
চা	মশা মাছি (হেলোপেলটিস থেইভোরা)	২৫	১০০	৪০০-৫০০	৭
ঢেঁড়শ	অ্যাফিড	২৫	১০০	৫০০	১৫
টম্যাটো	সাদা মাছি	৫০	২০০	৫০০	৫
টম্যাটো (জমিতে জলসেচ)	সাদা মাছি	১০০	৪০০	৫০০	৫
ধান	স্টেম বোরার, গল মিজ, লিফ ফোল্ডার, ব্রাউন প্ল্যান্ট হপার (বিপিএইচ), সাদা পিঠওয়ালা ফড়িং (ডব্লিউবিপিএইচ), সবুজ পাতা ফড়িং, থ্রিপস	২৫	১০০	৫০০-৭৫০	১৪
সাইট্রাস	পাইলা (ডায়াফোরিয়া সাইট্রি)	২৫	১০০	১০০০	২০
বেগুন	সাদা মাছি, জ্যাসিডস	৫০	২০০	৫০০	৩
ভেন্ডি	জ্যাসিডস, অ্যাফিডস	২৫	১০০	৫০০-১০০০	৫
সরষে	অ্যাফিড	১২.৫-২৫.০	৫০-১০০	৫০০-১০০০	২১

ব্যবহারের নির্দেশ :

প্রোডাক্টের প্রয়োজনীয় পরিমাণ মেপে নিন এবং অল্প পরিমাণ জলে সেটা ভালো করে মেশান। উপযুক্ত স্প্রেয়ার দিয়ে ফসলের সম্পূর্ণ কভারেজের জন্য যেমন নির্দিষ্ট আছে সেইভাবে বাকি জলটুকু ভালো করে ঘেঁটে নিন

পি.পি. যন্ত্রপাতি : ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, কম্প্রেশন ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, কম্প্রেশন ন্যাপস্যাক ব্যাটারি স্প্রেয়ার, ব্যাটারি-চালিত পাওয়ার স্প্রেয়ার এবং অ্যাসপি-এইচটিপি পাওয়ার স্প্রেয়ার

ব্যবহারের সময় :

১. আম – ফড়িং (পোকা দেখা যাওয়া মাত্র প্রথম স্প্রে করুন এবং ১৫ দিন পরে পোকার আক্রমণের পরিমাণের উপর নির্ভর ...

...

লিগনো সালফেট	
ওয়েটিং এজেন্ট – সোডিয়াম লরাইল সালফেট	৩.৭৫০% ডব্লিউ/ডব্লিউ
প্লাস্টিসাইজার – বিউটিলেটেড পলিভিনাইল পাইরোলিডন	১.২৫০% ডব্লিউ/ডব্লিউ
ক্যারিয়ার ডায়াটোমেসিয়াস আর্থ	৫.০০০% ডব্লিউ/ডব্লিউ
বাইন্ডার কর্ন স্টার্চ	কিউ.এস.% ডব্লিউ/ডব্লিউ
মোট :	১০০.০০ % ডব্লিউ /ডব্লিউ

সাবধান: এই লেবেল / লিফলেটের উপর বর্ণনা করা নির্দিষ্ট ফসল ছাড়া অন্য ফসলের জন্যে ব্যবহার করবেন না।

"খালি পাত্র ব্যবহার করা বিপজ্জনক"

ಐ

ಥಿಯೊ ಮೆಥೊಕ್ಸಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯುಜಿ

(ಕೀಟನಾಶಕ)

... ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವನ್ನು ಕಾಂಡಕೊರಕ, ಗಾಲ್ ಮಿಡ್ಜ್, ಎಲೆ ಸುರುಳಿ, ಕಂದು ಸಸಿ ಜಿಗಿಹುಳು (BPH), ಬಿಳಿ ಬೆನ್ನಿನ ಗಿಡ ಜಿಗಿಹುಳು (WBPH), ಹಸಿರು ಎಲೆಯ ಜಿಗಿಹುಳು (GLH). ಭತ್ತಕ್ಕೆ, ಬರುವ ನುಸಿಗಳು, ಜಸಿಡ್ ಗಿಡಹೇನು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳು ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾವಿಗೆ ಬರುವ ಜಿಗಿಹುಳು, ಗೋಧಿಗೆ ಬರುವ ಗಿಡಹೇನು, ಬೆಂಡೆಗೆ ಬರುವ ಗಿಡಹೇನು, ಜಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿನೊಣಗಳು, ಸಾಸಿವೆಗೆ ಬರುವ ಗಿಡಹೇನು, ಟೊಮ್ಯಾಟೊಗೆ ಬರುವ ಬಿಳಿನೊಣಗಳು, ಬದನೆಗೆ ಬರುವ ಬಿಳಿನೊಣ ಮತ್ತು ಜಸ್ಸಿಡ್, ಚಹಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊಸ್ಕಿಟೋ ಬಗ್, ಬಟಾಟೆಗೆ ಬರುವ ಗಿಡಹೇನು ಇವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ (w/w) 250 ಗ್ರಾ. ಥಿಯೊಮೆಥೊಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಭಾವೀ ಇಂಗ್ರೆಡಿಯಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸುಗಳು :

ಬೆಳೆ(ಗಳು)	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್ / ಹೆಕ್ಟೇರ್			ಕಳೆದ ಸಿಂಪಡಣೆಯಿಂದ ಕಟಾವಿನ ನಡುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
		ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾಂ)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಗ್ರಾಂ)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವಿಕೆ (ಲೀಟರ್)	
ಮಾವಿನಹಣ್ಣು	ಜಿಗಿಹುಳು	25	100	100	30
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ	ಗಿಡಹೇನು (ಮೈಜ಼ಸ್ ಪರ್ಸಿಕೆ)	25 (ಫೋಲಿಯರ್ ಸಿಂಪಡಣೆ) 50 (ಮಣ್ಣಿನ ತೇವ)	100 (ಫೋಲಿಯರ್ ಸಿಂಪಡಣೆ) 200 (ಮಣ್ಣಿನ ತೇವ)	500	77
ಹತ್ತಿ	ಜಸಿಡ್‌ಗಳು, ಗಿಡಹೇನು	25	100	500-750	21
	ಬಿಳಿನೊಣ	50	200	500-750	21
ಗೋಧಿ	ಗಿಡಹೇನು	12.5	50	500	21
ಚಹಾ	ಸೊಳ್ಳೆತಿಗಣೆ (ಹೆಲೊಪೆಲ್ಟಿಸ್ ಥಿಯೊವೊರಾ)	25	100	400-500	7
ಬೆಂಡೆ	ಗಿಡಹೇನು	25	100	500	15
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ	ಬಿಳಿನೊಣಗಳು	50	200	500	5
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ (ಮಣ್ಣಿನ ತೇವ)	ಬಿಳಿನೊಣಗಳು	100	400	500	5
ಭತ್ತ	ಕಾಂಡಕೊರಕ, ಗಾಲ್ ಮಿಡ್ಜ್, ಎಲೆಮಡಚುವ ಹುಳು, ಕಂದು ಗಿಡ ಜಿಗಿಹುಳು (ಬಿಪಿಹೆಚ್), ಬಿಳಿಬೆನ್ನಿನ ಜಿಗಿಹುಳು (ಡಬ್ಲ್ಯುಬಿಪಿಹೆಚ್), ಹಸಿರು ಎಲೆ ಜಿಗಿಹುಳು, ಥ್ರಿಪ್ಸ್	25	100	500-750	14
ನಿಂಬೆ	ಸೈಲ್ಲಾ (ಡಿಯಾಫೊರಿನಾ ಸಿಟ್ರಿ)	25	100	1000	20
ಸಾಸಿವೆ	ಬಿಳಿನೊಣಗಳು, ಜಸಿಡ್‌ಗಳು	50	200	500	3
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ	ಜಸಿಡ್‌ಗಳು, ಗಿಡಹೇನು	25	100	500-1000	5
ಬದನೆಕಾಯಿ	ಗಿಡಹೇನು	12.5-25.0	50-100	500-1000	21

ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ :

ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅವಶ್ಯಕ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿರಿ. ಉಳಿದ ನೀರನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ಜೊತೆ ಇಡೀ ಬೆಳೆಗೆ ಹರಡಿಸಲು ಬೇಕಿರುವಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿರಿ.

ಪಿ.ಪಿ. ಉಪಕರಣಗಳು: ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫೂಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಶನ್ ನ್ಯಾಪ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಶನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರೀ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಬ್ಯಾಟರೀ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪೀ–ಎಚ್‌ಟಿಪಿ ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್.

ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಮಯ :

...

ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್–ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಗ್ನೋಸಲ್ಫೇಟ್	5.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಒದ್ದೆಮಾಡುವ ಏಜೆಂಟ್–ಸೋಡಿಯಂ ಲಾರಿಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್	3.750% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸೈಜರ್ ಬ್ಯುಟಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಪೈರೋಲಿಡೋನ್	1.250% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಡಯಾ ಟೊಮಿಯಸ್ ಅರ್ಥ್	5.000% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಬೈಂಡರ್ ಕಾರ್ನ್‌ಸ್ಟಾರ್ಚ್	ಕ್ಯೂ.ಎಸ್.% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಒಟ್ಟು	100.00 % ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೇಬಲ್/ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಲಾದುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

"ಬರಿದಾದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳನ್ನು ಪುನ: ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ."

ஐ

தயோமெத்தாக்ஸம் 25% WG

(பூச்சிக்கொல்லி)

...

தயோமெத்தாக்ஸம் a.i.	25.000% எ/எ
...	5.000% எ/எ
...	3.750% எ/எ
...	1,250% எ/எ
...	5.000% எ/எ
...	தே. அ. % எ/எ
மொத்தம்	100.00% எ/எ

கவனிக்கவும்: இந்த லேபில்/கையேட்டில் சொல்லப்பட்டிருப்பது போல் அல்லாமல் வேறு பயிர்கள் மீது இதை உபயோகிக்கக் கூடாது.

"வெற்று கொள்கலனை பயன்படுத்துவது அபாயகரமனாது"

ఐ

థయోమెథోక్సామ్ 25% డబ్ల్యూజి

(కీటకనాశని)

...

వెట్టింగ్ ఏజెంట్ సోడియం ...	3.750% డబ్ల్యూ/డబ్ల్యూ
ప్లాస్టిసైజర్–బ్యుటిలేటెడ్ ...	1.250% డబ్ల్యూ/డబ్ల్యూ
క్యారియర్ డయాటోమేషియస్ ఎర్త్	5.000% డబ్ల్యూ/డబ్ల్యూ
బైండర్ మొక్కజొన్న ...	పిండితగినంత % డబ్ల్యూ/డబ్ల్యూ
మొత్తం	100.00% బ/బ

జాగ్రత్త: ఈ లేబుల్ / లీఫ్‌లెట్‌లో పేర్కొన్న పంటలు కాకుండా ఇతర పంటలకు వాడరాదు.

"ఖాళీ డబ్బాలని తిరిగి ఉపయోగించడం ప్రమాదం"

ଆଇ

ଥିଆମେଥୋକାମ୍ 25%ଡବ୍ଲୁଜି

(କୀଟନାଶକ)

ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଲିଫଲେଟ୍‌ଟି ପଢନ୍ତୁ ।

...

ପ୍ଲାଷ୍ଟିସାଇଜର୍–ବୁଟିଲେଟେଡ୍ ପଲିଭିନାଇଲ୍ ପାଇରୋଲିଡୋନ୍	୧.୨୫% ଓଜନ/ଓଜନ
କ୍ୟାରିଅର୍ ଡାଇଟୋମାସିଅସ୍ ଆର୍ଥ	୫.୦୦% ଓଜନ/ଓଜନ
ବାଇଣ୍ଡର କର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ	ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରା % ଓଜନ/ଓଜନ
ମୋଟ:	୧୦୦.୦୦% ଓଜନ/ଓଜନ

ସତର୍କତା: ଏହି ଲେବଲ / ଲିଫ୍‌ଲେଟ୍‌ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଫସଲ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ.

"ଖାଲି କଣ୍ଟେନର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ"

آئی

تھائی میتھاکزام 25%ڈبلیوجی

(حشرات کش دوا)

...

کیمیائی اجزاء:

تھائیمیتھاکزام اے آئی	25.000%w/w
دوا پھیلانے والا مادہ-سوڈیم لگنو سلفیٹ	5.000%w/w
گیلا کرنے والا مادہ-سوڈیم لاریل سلفیٹ	3.750%w/w
ملائم کرنے والا مادہ-بیوٹی لیٹیڈ پولی وینائل پرولیڈون	1.250%w/w
دوا لے جانے والا مادہ-ڈائی ایٹماسئس مٹی	5.000%w/w
دوا باندھ کر رکھنے والا مادہ ادرک اسٹارچ	مناسب مقدار میں
کل	100.00%w/w

انتباہی بیان: ہدایات کی پرچی/لیبل میں درج فصلوں کے علاوہ کسی اور فصل پر استعمال نہ کریں۔

خالی کنٹینر کو دوبارہ استعمال کرنا خطرناک ہے۔