Maharaja®

Imidacloprid 17.8% SL

Systemic Insecticide

Imidacloprid 17.8% SL is a systemic insecticide containing imidacloprid active ingredient, balance auxillaries and inert material. It is used as a foilar spray for the control of sucking and some other insects in diffrent crops.

Recommendation :

Crop(s)	Common name of the pest	Dosage per hactre A.I. (kg)	Formulation (Ltr)	Dilution (Ltr)	Waiting period between last spray to harvest in days
Cotton	Aphid, Whitefly, Jassids, Thrips	0.020-0.025	0.10-0.125	500-700	40
Paddy	BPH, WBPH, GLH	0.020-0.025	0.10-0.125	500-700	40
Tomato	Whitefly	0.03-0.035	0.150-0.175	500	3
Sugarcane	Termite	0.07	0.350	1875	45
Mango	Hopper	0.4-0.8gm. per tree	2.0-4.0gm. per tree	10	45
Sunflower	Jassid, Thrips Whitefly	0.020	0.10	500	30
Okra	Aphid, Jassid, Thrips	0.020	0.5	500	3
Citrus	Leaf miner, Psylla	0.01%	0.05%		15
Groundnut	Aphid, Jassid	0.02-0.025	0.1-0.25	500	40
Grapes	Flea Beetle	0.06-0.08	0.300-0.400	1000	32
Chillies	Jassids, Aphids Thrips	0.025-0.05	0.125-0.250	500-700	40

Direction of Use : Plant Protection Equipment : Hand operated knapsack sprayer or foot sprayer is recommended and tractor mounted sprayer can also be used.

Storage Conditions : 1. The packages containing insecticides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock & key depending upon the quantity & nature of the insecticdes. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, well lit, dry well ventilated & of sufficient dimension, to avoid contamination with water vapour.

Disposal of used containers : 1. Package shall be broken & burried away from habitation. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages or surplus material & washing should be disposed off in safe manner so as to prevent environment or water pollution.

Precautions : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of poisoning : Apathy, Myotonia, Tremor, difficult breathing, Myospasms may occur.

First aid : 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If Clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are containinated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, removed the patient to fresh air.

Antidote : No specific antidote in known. Treat symptomatically.

Chemical Composition :

Imidacloprid a.i	17.800% w/w
Non ionic emulsifier-	
Ethoxylated Alkyl Aryl Phenol Derivative	2.500% w/w
Polyvinyl Pyrrolidone Copolymer	1.000% w/w
Dimethyl Sulfoxide	38.400% w/w
N-Methyl Pyrrolidone	Q.S to make
TOTAL	**100.000% W/W**

" DANGEROUS TO RE USE EMPTY CONTAINER "

Manufactured & Marketed by : **Gharda Chemicals Limited**
Regd. Office: 48, Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400050.
Factory: Industrial Growth Center, Phase II, Samba, (J&K) - 184121

महाराजा

इमिडैक्लोप्रीड 17.8 प्रतिशत एस.एल.

अंर्तप्रवाही कीटनाशक

इस कीटनाशक का उपयोग विभिन्न प्रकार के चूसक कीटों व अन्य महत्वपूर्ण कीटों की रोकथाम के लिए कपास, धान, मिर्च, गन्ना और आम कि फसलों पर किया जाता है।

उपयोग

फसल	किट के नाम	प्रति हेक्टर मात्रा स.तत्व (कि.ग्रा.)	संरचना (ली.)	पानी कि मात्रा (ली.)	अंतिम छिड़काव तथा फसल कटाने के बीच अंतराल (दिनों में)
कपास	माहू, तेला, चुरदा सफेद मख्खी	०.०२०–०.०२५	०.१०–०.१२५	५००–७००	४०
धान	भूरे पौधे के फुदके सफेद पीठ पौधे के फुदके हरी पत्ती के फुदके	०.०२०–०.०२५	०.१०–०.१२५	५००–७००	४०
टमाटर	सफेद मक्खी	०.०३–०.०३५	०.१५०–०.१७.५	५००	३
गन्ना	दीमक	०.०७	०.३५०	१८७५	४५
आम	फुदका	०.४–०.८ ग्र. /वृक्ष	२.०–४.० ग्र./वृक्ष	१०	४५
सूरजमुखी	तेला, चुरदा, सफेद मक्खी	०.०२०	०.१०	५००	३०
भिण्डी	माहू, तेला, चुरदा	०.०२०	०.५	५००	३
निंबू प्रजाति	पत्ती छेदक, सीला शोषक कीट	०.०१%	०.०५%		१५
मूंगफली	माहू, तेला	०.०२–०.०२५	०.१–०.२५	५००	४०
अंगूर	पिस्सू भृंग	०.०६–०.०८	०.३००–०.४००	१०००	३२
मिर्ची	तेला, माहू, चुरदा	०.०२५–०.०५	०.१२५ ०.२५०	५००–७००	४०

उपयोग के लिये निर्देश: हस्त चलित नैपसेक स्पेरयर और पेर से चलनेवाला नैपसेक स्पेरयर, ट्रेक्टर माउनटिड स्पेरयर का भी प्रयोग किया जा सकता है।

संग्रहण की शर्तें : 1. कीटनाशक के रखे हुए डिब्बों आदि ऐसे कमरे या अन्य वस्तुओं के रखे जाने वाले कमरे या जगह से दूर हो या आलमारी में ताला कुन्जी लगाकर प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखे। 2. जिस कमरे या अलमारी में कीटनाशक का भण्डारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सुखा, प्रकाशयुक्त हवादार पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिये। जिससे कि कीटनाशक के भाप से प्रदूषण होने का डर न हो।

खाली डिब्बों का निपटारा : 1. कीटनाशक निर्माताओं या उपयोग कर्ता का कर्तव्य हैं कि डिब्बों या पात्रों को तोडफोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड देना चाहिये। 2. प्रयोग किये गये डिब्बों को दुबारा प्रयोग के लिये बाहर खुला न छोड़ें। 3. डिब्बों या बची हुई कीटनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि जिससे आसपास की चीजें, पीने का पानी विषैला न हो।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ: 1. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। 2. मुंह, त्वचा और आंखो से सम्पर्क से बचायें। 3. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। 4. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। 5. छिड़काव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। 6. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें।

विष के लक्षण: विरक्त, मायटोनिया, सांस लेने में कठिनाई, कंपकंपी, मांसपेशियों की ऐठन हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा: 1. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। 2. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़े उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। 3. यदि आंखें दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग 10 से 15 मिनट तक धोएं। 4. यदि सांस द्वारा अंदर गया हो तो रोगी को शुध्द हवा में ले जायें।

विषनाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं हैं। लक्षणानुसार इलाज करें।

रासायनिक संरचना:

इमिडैक्लोप्रिड सक्रिय तत्व	17.800% भार/भार
नान आयोनिक इमल्सिफायर	
इथाक्सीलेटेड अलकाइल एराइल फिनाल	
डेरिवेटिव	2.500% भार/भार
पोलिविनायिल पाइरोलिडोन	
कोपालिमर	1.000% भार/भार
डाइमिथाइल सल्फोक्साइड	38.400% भार/भार
एन–मिथाइल पाइरोलिडोन	पर्याय मात्रा
योग :	**100.000% भार/भार**

" खाली कंटेनर का दोबारा उपयोग करना खतरनाक है। "

उत्पादक और विक्रेता : **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**
पंजी. कार्यालय : ४८, हिल रोड, बान्द्रा (प), मुंबई - ४०००५०.
फैक्टरी : इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, फेज २, साम्बा, (जम्मू - काश्मिर) - १८४१२१

महाराजा

इमिडाक्लोप्रीड 17.8% एसएल

यंत्रणांतर्गत कीटकनाशक

इमिडाक्लोप्रीड 17.8% एस.एल. हे एक दैहिक कीटकनाशक असून त्यात इमिडाक्लोप्रीड हे सक्रिय घटकद्रव्य आहे आणि उर्वरित सहायक व पूरक निष्क्रिय द्रव्य आहे. विविध पिकांवरील शोषक आणि काही इतर कीटकांना आळा घालण्यासाठी पानांवरील फवारणीच्या स्वरूपात हे वापरले जाते.

वापर आणि प्रमाणाबाबत शिफारस

पिक	किडीचे नांव	प्रति हेक्टरी प्रमाण स.तत्व (कि.ग्रा.)	तयार औषधी (लिटर)	पाणी (लिटर)	गेल्या फवारणीपासून प्रतीक्षा काळ, दिवसांमध्ये
कापूस	मावा, तुडतुडे फुलकिडे, पांढरी माशी	०.०२०–०.०२५	०.१०–०.१२५	५००–७००	४०
भात	बीपीएच, डब्लू, बीपीएच, जीएलएच	०.०२०–०.०२५	०.१०–०.१२५	५००–७००	४०
टोमॅटो	पांढरी माशी	०.०३–०.०३५	०.१५०–०.१७.५	५००	३
ऊस	वाळवी	०.०७	०.३५०	१८७५	४५
आंबा	तुडतुडे	०.४–०.८ ग्रॅ. प्रति झाड	२.०–४.० ग्रॅ. प्रति झाड	१०	४५
सूर्यफूल	तुडतुडा, फुलकिडे सफेद माशी	०.०२०	०.१०	५००	३०
भेंडी	मावा, तुडतुडा फुलकिडे	०.०२०	०.५	५००	३
संत्री	लीफ मायनर, सायल्ला	०.०१%	०.०५%		१५
भूईमूग	मावा, तुडतुडा	०.०२–०.०२५	०.१–०.२५	५००	४०
द्राक्षे	फ्ली बीटल	०.०६–०.०८	०.३००–०.४००	१०००	३२
मिरच्या	तुडतुडा, मावा फुलकिडे	०.०२५–०.०५	०.१२५ ०.२५०	५००–७००	४०

वापरासाठी सूचना: पीक संरक्षण उपकरण: पिक संरक्षण संयम–हाताने चालविण्याचा नॅपसॅक पंप अथवा पायाने चालविण्याचा पंप वापरावा. ट्रॅक्टरवर चालणारा पंपही चालतो.

साठवण: 1. औषधीचे डबे वेगळ्या खोलीत अथवा जागेत अथवा कपाटात किंवा कडी कुलूपात स्वतंत्रपणे ठेवावेत. 2. कीटकनाशक साठवण्यासाठीच्या खोल्या चांगल्या उजेडाच्या, कोरड्या आणि खेळत्या हवेच्या, पुरेशा मोजमापाच्या असाव्यात जेणेकरून पाण्याच्या वाफेशी संपर्क टळेल.

रिकाम्या डब्याची विल्हेवाट: 1. रिकामे डबे अथवा उरलेली औषधी किंवा फवारणी संयंत्र स्वच्छ केलेले पाणी याची अशी विल्हेवाट लावावी की हवा आणि पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही. 2. वापरलेले रिकामे डबे फेकून देऊ नये की जेणेकरून त्यांचा पुनर्वापर टळेल. 3. वापरलेले डबे तोडून मोडून वस्तीपासून दूर पुरावेत

वापरकर्त्यांकडून सावधगिरी: 1. खाद्यपदार्थ, खाद्यपदार्थांच्या तसेच पशुखाद्याच्या रिकाम्या डब्यांपासून दूर ठेवा. 2. तोंड, डोळे आणि त्वचा ह्यांच्या संपर्क टाळा. 3. फवारणीचे धुके श्वासावाटे आत घेणे टाळा. फवारणी वाऱ्याच्या दिशेने करा. 4. दूषित संसर्ग झालेले कपडे आणि शरीराचे भाग फवारणीनंतर व्यवस्थित धुवा. 5. फवारणी करताना धूम्रपान करू नका, खाऊ–पिऊ किंवा चघळू नका. 6. मिसळताना आणि फवारताना संरक्षक कपडे वापरा.

विषबाधेची लक्षणे: उदासिनता, शरीराला कंप येणे, श्वासोश्वासास अडचण, आचके येणे इत्यादी अशी लक्षणे दिसू शकतात.

प्रथमोपचार: 1. गिळले गेल्यास घशाच्या मागच्या बाजूस बोटे लावून उलटी काढा. स्वच्छ उलटी येईपर्यंत हे सुरू ठेवा. जर रुग्ण बेशुद्ध असेल तर उलटी काढू नका. 2. कपडे आणि त्वचा ह्यांना संसर्ग दूषित झालेला असेल तर भरपूर साबण आणि पाणी वापरून धुवा. 3. जर डोळ्यांना संसर्ग झाला असेल तर 10 ते 15 मिनिटे मिठाच्या/ साध्या पाण्याचे हबके मारून डोळे धुवा. 4. श्वासावाटे आत गेल्यास रोग्याला ताज्या मोकळ्या हवेवर न्या.

उतारा: विशिष्ट उतारा ज्ञात नाही. लक्षणानुसार उपचार करा.

रासायनिक संरचना:

इमिडाक्लोप्रीड	17.800% डब्ल्यू/डब्ल्यू
नॉन आयोनिक इमल्सीफायर्स	2.500% डब्ल्यू/डब्ल्यू
इथोक्सीलेटेड अल्कील एराइल फिनॉल डेरिवेटिव	
पॉलिव्हिनील पायरोलीडोन कोपोलीमर	1.000% डब्ल्यू/डब्ल्यू
डायमेथील सल्फोझाईड	38.400% डब्ल्यू/डब्ल्यू
एन–मेथिल पायरोलिडोन	इतर घटक मिळून
एकूण	**100.000% डब्ल्यू/डब्ल्यू**

" रिकामे कंटेनर पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे."

निर्माता व विक्रेता : **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**
रजी. कार्यालय : ४८, हिल रोड, वांद्रे (प), मुंबई - ४०००५०.
फॅक्टरी : इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, फेज २, साम्बा, (जम्मू - काश्मिर) - १८४१२१

મહારાજા

ઈમીડાકલોપ્રિડ 17.8% એસ.એલ.

આંતરપ્રવાહી કીટકનાશક

ઈમીડાકલોપ્રિડ 17.8% એસ.એલ. એ એક આંતરપ્રવાહી પ્રકારનું કીટકનાશક છે જેમાં ઈમીડાકલોપ્રિડ સક્રિય તત્વ તેમજ બાકીના સહાયક અને નિષ્ક્રિય તત્વો સામેલ છે. આનો ઉપયોગ વિવિધ પાકમાં ચૂસિયા અને અન્ય જીવાતોના નિયંત્રણ માટે પાંદડાં પર છંટકાવની રીતે કરવામાં આવે છે.

ભલામણો:

પાક	કીટકોના નામ	માત્રા પ્રતિ હેક્ટર સક્રિય તત્વ (લીટર)	દવાનું પ્રમાણ (લીટર)	પાણીનું પ્રમાણ (લીટર)	છેલ્લા છંટકાવથી લણણી વચ્ચેનો પ્રતિક્ષા સમય (દીવસો)
કપાસ	મોલોમશી, સફેદ માખી તડતડીયા, થ્રીપ્સ	0.020–0.025	0.10–0.125	500–700	૪૦
ડાંગર	ભુરા ચુસીયા, સફેદ ચુસીયા	0.020–0.025	0.10–0.125	500–700	૪૦
ટામેટાં	સફેદ માખી	0.03–0.035	0.150–0.17.5	500	3
શેરડી	ઉંધઈ	0.07	0.350	૧૮૭૫	૪૫
આંબા	મધીયો	0.૪–0.૮ ગ્રા. પ્રતિ ઝાડ	૨.0–૪.0 ગ્રા. પ્રતિ ઝાડ	૧0	૪૫
સૂર્યમુખી	લીલાં ચૂચિઇ, થ્રિપ્સ સફેદમાખી	0.020	0.10	500	30
ભીંડા	મોલોમસી, લીલાં, ચૂસિયાં, થ્રિપ્સ	0.020	0.5	500	3
રસવાળાં ફળો	પર્ણવળિયા સીલ્લા	0.01%	0.05%		૧૫
મગફળી	ચૂસિયાં, મોલોમશી	0.02–0.025	0.1–0.25	500	૪૦
દ્રાક્ષ	ચાંચડ, ભમરો	0.06–0.08	0.300–0.400	1000	૩૨
મરચાં	મોલો મસી, લીલાં ચૂસિયાં, થ્રિપ્સ	0.025–0.05	0.125 0.250	500–700	૪૦

વપરાશ માટેનાં સૂચનો: છોડ સંરક્ષક ઉપકરણોઃ હાથથી ચાલતા નૅપસેક સ્પ્રેયર અથવા પગથી ચાલતું સ્પ્રેયર (ફુટ સ્પ્રેયર) ની ભલામણ કરવામાં આવે છે. ટ્રેક્ટરથી ચાલતા સ્પ્રેયર પણ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે.

સંગ્રહ માટેની શરતો: 1.કીટકનાશક ધરાવતા પાત્રોને અન્ય પદાર્થો ખાસ કરીને ખાદ્ય પદાર્થો સંગ્રહ કરાતી ઓરડી અથવા જગ્યાથી દૂર અલગ ઓરડી કે જગ્યામાં સંગ્રહ કરવા જોઈએ અથવા કીટકનાશક પ્રકાર અને માત્રા આધારે કબાટમાં તાળું ચાવી મારીને રાખવા જોઈએ. 2. કીટકનાશકના સંગ્રહ માટેની ઓરડી કે જગ્યા યોગ્ય બાંધકામ ધરાવતી, સૂકી, પૂરતા હવા ઉજાસ ધરાવતી અને પૂરતા વિસ્તારવાળી હોવી જોઈએ જેથી પાણીની વરાળનું પ્રદૂષણ થતા ટાળી શકાય.

ખાલી પાત્રોનો નિકાલ: 1. ખાલી પાત્રોને તોડી વસતિ ધરાવતા પ્રદેશથી દૂર જમીનમાં દાટી દેવા જોઈએ. 2. ખાલી પાત્રોનો ફરી ઉપયોગ થતો ટાળવા તેને બહાર રખડતા ન રાખવા જોઈએ. 3. પૅકેજીસ અથવા વધારાના દ્રાવણનો નિકાલ તેમ જ મશીન અને કન્ટેનરોની સફાઈ જળ કે પર્યાવરણ પ્રદૂષિત ન થાય તેમ સુરક્ષિત રીતે કરવી જોઈએ.

સાવચેતીઓ: 1. ખાદ્યપદાર્થો, ખાદ્યપદાર્થોના ખાલી પાત્રો અને પશુચારાથી દૂર રાખો. 2. મોં, આંખ, ત્વચા સાથે સંપર્ક થતા ટાળો. 3. દ્રાવણની છાંટને શ્વાસમાં ન આવવા દો. પવનની દિશામાં જ છંટકાવ કરો. 4. દૂષિત કપડાં અને શરીરના ભાગો છંટકાવ કર્યા પછી બરાબર ધોઈ નાખો. 5. છંટકાવ કરતી વખતે કાંઈપણ ખાશો, પીશો કે ધૂમ્રપાન કરશો નહીં. 6. ભેળવતી અને છાંટતી વખતે સંપૂર્ણ સંરક્ષાત્મક વસ્ત્રો પહેરો.

ઝેર ચઢ્યાના લક્ષણો: સુસ્તી, માયોટોનિયા, ધ્રૂજારી, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થવી, માયોસ્પાઝમ થઈ શકે છે.

પ્રાથમિક ઉપચાર: 1 જો ગળી જવાય તો ગળામાં અંદરના ભાગમાં આંગળી નાખીને ઉલટી કરાવવા પ્રયત્ન કરો. ઉલટી સાફ ન જણાય ત્યાં સુધી વારંવાર કરતા રહો. જો દરદી બેભાન હોય તો ઉલટી કરાવવા પ્રયત્ન ન કરશો. 2. જો કપડાં અને ત્વચા દૂષિત થયા હોય તો કપડાં કાઢી નાખો અને દૂષિત ત્વચા પુષ્કળ સાબુ અને પાણીથી ધોઈ નાખો. 3. જો આંખો દૂષિત થાય તો 10 થી 15 મિનિટ સુધી પુષ્કળ સલાઈન/સાફ પાણીની છાલક મારીને સાફ કરો. 4. જો શ્વાસમાં જાય તો દરદીને તાજી હવામાં લઈ જાઓ.

વિષનાશક: કોઈ વિશિષ્ટ વિષનાશક જાણમાં નથી. લક્ષણો અનુસાર સારવાર કરો.

રાસાયણીક સરચના:

ઈમીડાકલોપ્રિડ	17.800% વ/વ
નોન આયોનીક ઈમલસીફાયર્સ	2.500% વ/વ
ઈથોકસીલેટેડ અલ્કાઈલ એરીલ	
ફીનોલ ડિરીવેટીવ	
પોલીવિનાઈલ પાયરોલોડોન કોપોલીયર	1.000% વ/વ
ડાયમીથાઈલ સલ્ફોકસાઈડ	38.400% વ/વ
એન–મીથાઈલ પાઈરોલીડોન	જરૂરત અનુસાર
કુલ	**100.000% વ/વ**

''ખાલી ડબ્બા ફરીથી ઉપયોગ કરવાનું ખતરનાક છે.''

ઉત્પાદક અને વિક્રેતા : **ઘરડા કેમિકલ્સ લિમિટેડ**
નોંધણીકૃત કાર્યાલયઃ ૪૮, હિલ રોડ, બાંદરા (પ), મુંબઈ– ૪૦૦ ૦૫૦
ફેક્ટરીઃ ઈન્ડસ્ટ્રિયલ ગ્રોથ સેન્ટર, ફેઝ–૨, સાંબા (જમ્મુ– કાશ્મીર)–૧૮૪ ૧૨૧.

মহারাজা

ইমিড্যাক্লোপ্রিড ১৭.৮% এস.এল

অন্তর্প্রবাহী কীটনাশক

ইমিড্যাক্লোপ্রিড ১৭.৮% এস.এল.হল, সক্রিট উপাদান হিসাবে ইমিড্যাক্লোপ্রিড এবং অবশিষ্টাংশ সহযোগী উপাদান এবং অক্রিয় উপাদানযুক্ত একটি অন্তর্প্রবাহী কীটনাশক। এটি ব্যবহৃত হয় চোষক কীট এবং বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত্রে অন্যান্য কয়েক প্রকার কীটের নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে।

সুপারিশ:

শস্য (গুলি)	গুল্মের সাধারণ নাম	মাত্রা / হেক্টর এ.আই. (কেজি)	প্রস্তুতি (লিটার)	জলে দ্রবণীয়তা (লিটার)	সর্বশেষ স্প্রে এবং ফসল তোলার মধ্যে অপেক্ষার সময় (দিন)
তুলো	অ্যাফিড, সাদা মাছি, জ্যাসিড, থ্রিপস	০.০২০–০.০২৫	০.১০–০.১২৫	৫০০–৭০০	৪০
ধান	বিপিএইচ, ডব্লিউবিপিএইচ, জিএলএইচ	০.০২০–০.০২৫	০.১০–০.১২৫	৫০০–৭০০	৪০
টমেটো	সাদা মাছি	০.০৩–০.০৩৫	০.১৫০–০.১৭.৫	৫০০	৩
আখ	ঘুন পোকা	০.০৭	০.৩৫০	১৮৭৫	৪৫
আম	ফড়িং	০.৪–০.৮ গ্রাম প্রতি গাছ	২.০–৪.০ গ্রাম প্রতি গাছ	১০	৪৫
সূর্যমুখী	জ্যাসিড, থ্রিপস, সাদা মাছি	০.০২০	০.১০	৫০০	৩০
ওকরা	অ্যাফিড, জ্যাসিড, থ্রিপস	০.০২০	০.৫	৫০০	৩
লেবু	পাতায় ছিদ্রকারক পোকা, সাইলা	০.০১%	০.০৫%		১৫
চিনাবাদাম	অ্যাফিড, জ্যাসিড	০.০২–০.০২৫	০.১–০.২৫	৫০০	৪০
আঙুর	গুবরে পোকা	০.০৬–০.০৮	০.৩০০–০.৪০০	১০০০	৩২
লঙ্কা	জ্যাসিড, অ্যাফিড, থ্রিপস	০.০২৫–০.০৫	০.১২৫–০.২৫০	৫০০–৭০০	৪০

ব্যবহারের নির্দেশিকা: উদ্ভিদ সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম:হাতের দ্বারা চালানো ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার অথবা ফুট স্প্রেয়ারের সুপারিশ করা হয় এবং ট্র্যাক্টরে লাগানো স্প্রেয়ার ব্যবহার করা যেতে পারে।

মজুতকরণের শর্তাবলী: ১. কীটনাশক থাকা প্যাকেজগুলিকে, পরিমাণ এবং প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলভাবে অন্যান্য উপাদান বিশেষত খাদ্য উপাদান মজুত করার স্থান থেকে দূরে একটি পৃথক ঘর অথবা বাড়িতে অথবা একটি পৃথক আলমারিতে চাবি বন্ধ অবস্থায় রাখতে হবে। ২. কীটনাশকটির মজুতকরণের জন্য ঘরটিকে, বাষ্পের কারণে দুষিত হওয়া এড়ানোর জন্য হতে হবে সুগঠিত, শুষ্ক, পর্যাপ্ত আলো–বাতাসযুক্ত এবং পর্যাপ্ত পরিমাপের।

ব্যবহৃত পাত্রগুলি নস্ট করা: ১. প্যাকেজগুলিকে ভেঙে জনবসতির থেকে দূরে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। ২. ব্যবহৃত প্যাকেজগুলির পুনর্ব্যবহার প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে বাইরে ফেলে রাখা যাবে না। ৩. পরিবেশ এবং জল দূষণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে, গুল্মনাশকটির প্রস্তুতকারক এবং ব্যবহারকারীর দায়িত্ব হবে খালি পাত্র এবং অবশিষ্ট উপাদানগুলি এবং মেশিন এবং পাত্র ধোয়া জলগুলিকে উপযুক্তভাবে বিনস্ট করতে হবে।

সাবধানতা: ১. খাদ্য উপাদান, খাবার রাখার খালি পাত্র এবং পশুখাদ্যগুলির থেকে দূরে রাখুন। ২. মুখ, চোখ এবং ত্বকের সঙ্গে স্পর্শ হওয়া এড়িয়ে যান। ৩. স্প্রে করা উপাদানের বাষ্পকণাগুলি নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করা এড়িয়ে যান। বাতাসের অভিমুখে স্প্রে করুন। ৪. স্প্রে করার পরে দূষিত পোশাক এবং শরীরে অংশগুলি ভালোভাবে ধুয়ে নিন। ৫. স্প্রে করার ধূমপান করবেন না, কোন কিছু পান করবেন না, খাবেন না এবং চিবাবেন না। ৬. মিশ্রিত করার এবং স্প্রে করার সময়ে সম্পূর্ণ সুরক্ষাদায়ক পোশাক পরুন।

বিষক্রিয়ার উপসর্গ: অনিহা, ঐচ্ছিক পেশিগুলির অসাড়তা, কম্পন, শ্বাস নিতে অসুবিধা, পেশির খিঁচুনি হতে পারে।

প্রথামিক চিকিৎসা: ১. যদি খেয়ে ফেলা হয়ে থাকে, তাহলে গলায় সুড়সুড়ি দিয়ে বমি করানোর চেষ্টা করুন। এই প্রক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি করতে থাকুন যতক্ষণ না বমি করা বস্তুগুলি পরিষ্কার হচ্ছে। রোগী যদি অচেতন থাকেন তাহলে বমি করানোর চেষ্টা করবেন না। ২. যদি পোশাক এবং ত্বক দূষিত হয়ে থাকে, তাহলে পোশার পরিবর্তন করুন এবং সাবান এবং প্রচুর পরিমাণ জলের সাহায্যে ধুয়ে দিন। ৩. যদি চোখের সংস্পর্শে আসে, তাহলে ১০ থেকে ১৫ মিনিট যাবত প্রচুর পরিমাণ লবণ / পরিষ্কার জলের ঝাপটা দিন। ৪. যদি নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তাহলে রোগীকে খোলা হাওয়ায় নিয় যান।

প্রতিষেধক: জ্ঞাত কোন নির্দিষ্ট প্রতিষেধক নাই। উপসর্গের ভিত্তিতে চিকিৎসা করুন।

রাসায়নিক গঠন :

ইমিড্যাক্লোপ্রিড এ.আই.	১৭.৮০০ % ওজন↔ওজন
নন আয়নিক ইমালসিফায়ার	
ইথক্সিলেটেড অ্যালকাইল অ্যারাইল	
ফেনল ডেরিভেটিভ	২.৫০০ % ওজন↔ওজন
পলিভিনাইল পাইরোলাইডন কোপলিমার	১.০০ % ওজন↔ওজন
ডাইমিথাইল সাল্ফক্সাইড	৩৮.৪০০ % ওজন↔ওজন
এন–মিথাইল পাইরোলাইডন	প্রস্তুতির জন্য কিউ.এস
মোট :	**১০০.০০০ % ওজন↔ওজন**

''খালি পাত্র ব্যবহার করা বিপজ্জনক''

প্রস্তুতকারী এবং বিপণনকারী : **ঘারডা কেমিক্যালস্ লিমিটেড**
পঞ্জীকৃত কার্যালয়: ৪৮, হিল রোড, বান্দ্রা (প), মুম্বই - ৪০০০৫০
ফ্যাক্টরী: ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, ফেজ্ ২, সাম্বা, (জম্মু ও কাশ্মীর) - ১৮৪১২১

ਮਹਾਰਾਜਾ

ਇਮਿਡਾਕਲੋਪ੍ਰਿਡ ੧੭.੮ % ਐਸ. ਐਲ.

ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ

ਇਮਿਡਾਕਲੋਪ੍ਰਿਡ ੧੭.੮ % ਐਸ. ਐਲ. ਇੱਕ ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਮਿਡਾਕਲੋਪ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਕ੍ਰੀਆਹੀਣ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਚੂਸਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਲਿਅਰ ਸਪ੍ਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ :

ਫਸਲ	ਕੀਟ ਦਾ ਆਮ ਨਾਂ	ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਤਿ ਹੈਕਟਰ ਏ. ਆਈ. (ਕਿ. ਗ੍ਰਾ.)	ਸੂਤਰੀਕਰਣ (ਲੀ.)	ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲੀ.)	ਅੰਤਿਮ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)
ਕਪਾਹ	ਮਾਹੂ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਤੇਲਾ, ਚੁਰਦਾ	੦.੦੨੦–੦.੦੨੫	੦.੧੦–੦.੧੨੫	੫੦੦–੭੦੦	੪੦
ਝੋਨਾ	ਪੌਦੇ ਦੇ ਭੂਰੇ ਟਿੱਡੇ, ਚਿੱਟੀ ਪਿੱਠ ਵਾਲੇ ਟਿੱਡੇ, ਪੱਤੇ ਦੇ ਹਰੇ ਟਿੱਡੇ	੦.੦੨੦–੦.੦੨੫	੦.੧੦–੦.੧੨੫	੫੦੦–੭੦੦	੪੦
ਟਮਾਟਰ	ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ	੦.੦੩–੦.੦੩੫	੦.੧੫੦–੦.੧੭.੫	੫੦੦	੩
ਕਮਾਦ	ਸਿਉਂਕ	੦.੦੭	੦.੩੫੦	੧੮੭੫	੪੫
ਅੰਬ	ਫੁਦਕਾ / ਟਿੱਡਾ	੦.੪–੦.੮ ਗ੍ਰਾ./ ਦਰੱਖਤ	੨.੦ – ੪.੦ ਗ੍ਰਿ./ ਦਰੱਖਤ	੧੦	੪੫
ਸੂਰਜਮੁਖੀ	ਤੇਲਾ, ਚੁਰਦਾ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ	੦.੦੨੦	੦.੧੦	੫੦੦	੩੦
ਭਿੰਡੀ	ਮਾਹੂ, ਤੇਲਾ, ਚੁਰਦਾ	੦.੦੨੦	੦.੫	੫੦੦	੩
ਨੀਂਬੂ	ਪੱਤਾ ਛੇਦਕ, ਸਿਲਾ	੦.੦੧%	੦.੦੫%		੧੫
ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ	ਮਾਹੂ, ਤੇਲਾ	੦.੦੨–੦.੦੨੫	੦.੧–੦.੨੫	੫੦੦	੪੦
ਅੰਗੂਰ	ਪਿੱਸੂ ਕੀੜਾ	੦.੦੬–੦.੦੮	੦.੩੦੦–੦.੪੦੦	੧੦੦੦	੩੨
ਮਿਰਚਾਂ	ਤੇਲਾ, ਮਾਹੂ ਚੁਰਦਾ	੦.੦੨੫–੦.੦੫	੦.੧੨੫–੦.੨੫੦	੫੦੦–੭੦੦	੪੦

ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ : ਪੌਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ : ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਜਾਂ ਫੁੱਟ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਉਂਟੇਡ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਭੰਡਾਰਣ ਸ਼ਰਤਾਂ : ੧. ਜਿਹੜੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਵਰੂਪ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਗ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੰਦਰਾ ਚਾਬੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ੨. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ, ਸੁੱਕੇ, ਠੰਡੇ ਰੋਸ਼ਨੀਦਾਰ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਾਇਜ਼ ਦੇ ਬਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਭਾਫ਼ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਵਰਤੇ ਗਏ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ : ੧. ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬੇ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਕੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ੨. ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਤਾਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ੩. ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਵਿਭਿੱਨ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਧੋਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ : ੧. ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖੋ । ੨. ਮੂੰਹ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਤ੍ਵਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ । ੩. ਛਿੜਕਾਅ ਦਾ ਧੂੰਆ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ । ੪. ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਦੇ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਵੋ । ੫. ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਗਰੇਟ, ਪੀਣਾ, ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚਬਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ੬. ਮਿਲਾਨ ਅਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਪੜੇ ਪਾਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।

ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਅਸਰ ਦੇ ਲੱਛਨ : ਅਪੈਥੀ, ਮਾਇਟੋਨੀਆ, ਕੰਬਨੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਾਅ (ਮਾਯੋਸਪਾਸਮ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਉਪਚਾਰ : ੧. ਜੇਕਰ ਨਿਗਲ ਲੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਦਗੁਦੀ ਕਰਕੇ ਉਲਟੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਤਦੋਂ ਤਕ ਕਰਵਾਓ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਲਟੀ ਦਾ ਤਰਲ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ । ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ । ੨. ਜੇਕਰ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਨ ਤਾਂ ਗੰਦੇ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਨ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿਓ । ੩. ਜੇਕਰ ਅਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਮਕੀਨ / ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ੧੦ ਤੋਂ ੧੫ ਮਿੰਟਾਂ ਤਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ । ੪. ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਤਾਜੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ।

ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ : ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਰਸਾਇਣਕ ਮਿਸ਼ਰਣ :

ਇਮਿਡਾਕਲੋਪ੍ਰਿਡ ਏ. ਆਈ.	੧੭.੮੦੦ % ਭਾਰ / ਭਾਰ
ਨਾੱਨ ਆਓਨਿਕ ਐਮਲਸੀਫ਼ਾਇਰ –	
ਇਥੋਕਸੀਲੇਟਿਡ ਅਲਕਾਇਲ	੨.੫੦੦ % ਭਾਰ / ਭਾਰ
ਏਰਾਇਲ ਫਿਨੋਲ ਡੇਰੀਵੇਟਿਵ	
ਪੋਲੀਵਿਨਾਇਲ ਪਾਇਰੋਲੀਡੋਨ	੧.੦੦੦ % ਭਾਰ / ਭਾਰ
ਕੋਪੋਲੀਮਰ	
ਡੀਮਿਥਾਇਲ ਸਲਫੋਕਸਾਇਡ	੩੮.੪੦੦ % ਭਾਰ / ਭਾਰ
ਐਨ– ਮਿਥਾਇਲ ਪਾਇਰੋਲੀਡੋਨ	ਪਰਿਆਪਤ ਮਾਤਰਾ
ਕੁਲ :	**੧੦੦.੦੦੦ % ਭਾਰ / ਭਾਰ**

''ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।''

ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ : **ਘਰਡਾ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ**
ਰਜਿ. ਦਫਤਰ: ੪੮, ਹਿੱਲ ਰੋਡ, ਬਾਂਦਰਾ (ਪੱਛਮ), ਮੁੰਬਈ–੪੦੦੦੫੦
ਫੈਕੀਰੀ: ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ, ਫੇਜ਼ ੨, ਸਾਂਭਾ, (ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ) – ੧੮੪੧੨੧

DIRECTION FOR USE

FOR AGRICULTURAL USE

कृषि उपयोग के लिए

Read Leaflet Before Use

इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

Maharaja®

Imidacloprid 17.8%SL

Systemic Insecticide

महाराजा

इमिडैक्लोप्रीड 17.8 प्रतिशत एस.एल.

अंर्तप्रवाही कीटनाशक

Manufactured & Marketed by:
GHARDA CHEMICALS LIMITED
Regd. Office: Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400050. INDIA.

For any complaints, contact Customer Care Executive at Gharda Chemicals Limited, Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400050. INDIA
Tel.: 022 66265998 / 66265999
Email: consumercare@gharda.com
Website: www.gharda.com

® - Registered Trademark of Gharda Chemicals Limited.



J.05.25-01

மஹாராஜா

இமிடாக்ளோப்ரிட் 17.8% எஸ்.எல்.

മഹാരാജ

ഇമിഡാക്ലോപ്രിഡ് 17.8% എസ്എൽ

మహారాజా

ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 17.8% ఎస్.ఎల్.

ಮಹಾರಾಜ

ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

ମହାରାଜା

مہاراجہ

ایمیدا کلو پرائڈ 17.8% ایس ایل

سسٹمک کیڑے مار دوا

مہاراجہ 17.8% ایس ایل ایک سسٹیمک کیڑے مار دوا ہے جس میں شامل ہیں ایمید کلو پرائڈ کے کارگر جز، متوازن معاون اور انرٹ مٹیریل۔ اسے فولیئر اسپرے (پتیوں پر چھڑکاؤ) کے طور پر چوسنے والے کیڑے اور مختلف فصلوں میں دیگر کیڑوں پر قابو پانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

سفارشات:

فصلیں	کیڑوں کے عام نام	مقدار فی ہیکٹر: اے۔ آئی۔ (کیلو گرام)	فارمولیشن	پانی میں تحلیل لیٹر	آخری چھڑکاؤ سے کٹائی کے مابین انتظار (دنوں میں)
کپاس	ایفڈ، وائٹ فلائے، جیسڈ، تھریپس	0.020-0.025	0.10 - 0.125	500 - 700	40
دھان	بی پی ایچ، ڈبلیو بی پی ایچ، جی ایل ایچ	0.020-0.025	1.10 - 0.125	500 - 700	40
ٹماٹر	وائٹ فلائی	0.03-0.035	0.150-0.175	500	3
گنا	دیمک	0.07	0.350	1875	45
آم	ہوپر	0.8 گرام-0.4 فی درخت	4.0گرام -2.0 فی درخت	10	45
سورج مکھی	جیسڈ، تھریپس وائٹ فلائے	0.020	0.10	500	30
بھنڈی	ایفڈ، جیسڈ، تھریپس	0.020	0.5	500	3
لیموں	لیف مائنر، سیلا	0.01%	0.05%		15
مونگ پھلی	ایفڈ، جیسڈ	0.02-0.025	0.1-0.25	500	40
انگور	فلی بیٹل	0.06-0.08	0.300-0.400	1000	32
مرچ	جیسڈ، ایفڈس تھریپس	0.025 - 0.05	0.125-0.250	500-700	40

استعمال کے لئے ہدایات: پلانٹ کی حفاظت کے لئے آلا جات: ہاتھوں سے چلنے والے نیپ سیک اسپریئر اور پیروں سے چلنے والے اسپریئر کی سفارش کی جاتی ہے اور ٹریکٹر ماؤنٹڈ اسپریئر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

ذخیرہ اندوزی کی صورتحال:

استعمال شدہ کنٹینروں کو ضائع کرنا:

احتیاط:

زہر چڑھنے کی علامات:

ابتدائی طبی امداد:

تریاق:

کیمیائی ترکیب:

خالی کنٹینر کو دوبارہ استعمال کرنا خطرناک ہے۔

DIRECTION FOR USE

FOR AGRICULTURAL USE

कृषि उपयोग के लिए

Read Leaflet Before Use

इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

GHARDA QUALITY

Maharaja®

Imidacloprid 17.8%SL

Systemic Insecticide

महाराजा

इमिडैक्लोप्रीड 17.8 प्रतिशत एस.एल.

अंर्तप्रवाही कीटनाशक

Manufactured & Marketed by:
GHARDA CHEMICALS LIMITED
Regd. Office: Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400050. INDIA.

For any complaints, contact Customer Care Executive at Gharda Chemicals Limited, Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400050. INDIA
Tel.: 022 66265998 / 66265999
Email: consumercare@gharda.com
Website: www.gharda.com

® - Registered Trademark of Gharda Chemicals Limited.

J.05.25-01