# POLAR®
## ACETAMIPRID 20% SP
(INSECTICIDE)

**Read Leaflet Before Use**

Acetamiprid 20% SP is a soluble powder formulation containing 20% of the active ingredient Acetamiprid. Acetamiprid 20% SP is a highly effective systemic insecticide for the control of sucking insects pests in cotton, chili, rice, cabbage and okra.

**Recommendation :**

| Crop(S) | Common Name of Pest | Dosage Per ha a.i. (gm) | Formulation (gm) | Dilution (Lit) | Waiting period between last spray to harvest |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | Aphids | 10 | 50 | 500-600 | 15 days |
| | Jassids | 10 | 50 | 500-600 | |
| | Whiteflies | 20 | 100 | 500-600 | |
| Chilli | Thrips | 10-20 | 50-100 | 500-600 | 3 days |
| Rice | Brown Plant hoppers (BPH) | 10-20 | 50-100 | 500-600 | 7 days |
| Cabbage | Aphids | 15 | 75 | 500-600 | 7 days |
| Okra | Aphids | 15 | 75 | 500-600 | 3 days |

**Caution :** Not to be use on crops other than specified on this label/leaflet. The product is toxic to honey bees so do not spray during active bee foraging period of the day.

**Direction of use:** Plant Protection equipment: Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery sprayer and ASPEE-HTP power sprayer. **Precaution :** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animal food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation of the spray mist, spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body afer sprayirng. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Phytotoxicity:** The product is not phytotoxic when used as per field recommendation. **Symptoms of poisoning :** Nausea, vomiting, headache, dizziness and stomach-ache may occur. **First Aid :**1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Antidote** : No specific antidote is known. Treat symptomatically. **Disposal of used container**: 1. Empty containers shall be broken and buried away from habitation. 2. The used containers or package shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The package or surplus material and washing should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. **Storage conditions** : 1. The packages containing the insecticides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticides shall be well lit, well built, dry, ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapours.

**Chemical composition:**

| | |
|---|---|
| Acetamiprid a.i. | 20.000 %w/w |
| Blend of sodium Dodecyl Benzene Sulfonate, Sodium Sulphate & sodium alkylate | 04.500 %w/w |
| Sodium Citrate, Dihydrate | 30.000 %w/w |
| Calcium Hydrogen phosphate Dihydrate | 00.100 %w/w |
| Clolouring agent (Brilliant Blue) | 00.050 %w/w |
| Lactose Monohydrate | Q.S. |
| **Total** | **100.000 %w/w** |

**"Dangerous to reuse empty container."**

Manufactured and Marketed by:

**GHARDA CHEMICALS LIMITED**

Regd Office : 48, Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400 050. INDIA.
Factory : Industrial Growth Centre, Phase II, Samba, (J&K) -184121.

# पोलर
## ऐसिटामिप्रिड २०% एस.पी.
(कीटनाशक)

**इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़े ।**

एसिटामिप्रिड २०% घुलनशील पाउडर कीटनाशक है जिसमें एसिटामिप्रिड सक्रिय तत्व २०% भार/भार है। यह एक अंतर्वाही किटनाशक है जिसका कपास, मिर्ची, धान, पत्तागोभी तथा भिंडी के चूसनें वाले किटों के रोकथाम के लिये प्रयोग किया जाता है।

**प्रयोग के लिए सिफारीश:**

| फसल | कीट के नाम | प्रति हेक्टर मात्रा स.तत्व (ग्रा) | संरचना (ग्रा) | पानी की मात्रा (ली.) | अंतिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनो में) |
|---|---|---|---|---|---|
| कपास | चेपा या माहू | १० | ५० | ५००-६०० | १५ |
| | हरा तेला | १० | ५० | ५००-६०० | |
| | सफेद मक्खी | २० | १०० | ५००-६०० | |
| मिर्ची | चुरदा, | १०-२० | ५०-१०० | ५००-६०० | ३ |
| धान | भुरा फुदका | १०-२० | ५०-१०० | ५००-६०० | ७ |
| पत्तागोभी | चेपा | १५ | ७५ | ५००-६०० | ७ |
| भिंडी | चेपा | १५ | ७५ | ५००-६०० | ३ |

**चेतावनी :** इस लेबल/पत्रिका में निर्देशित किये गये फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल ना करें। उत्पाद मधु मक्खियों के लिए विषाक्त है इसलिए दिने में सक्रिय फोर्जिंग अवधि के दौरान छिड़काव न करें।

**उपयोग के लिये निर्देश:** उपयोग मे आनेवाले यंत्र: नेपसेक स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, कम्प्रेशन नेपसेक स्प्रेयर, कम्प्रेशन नेपसेक बैटरी स्प्रेयर और पी. ई ई .टी.पी. पावर स्प्रेयर आदि। **प्रयोगकर्ता के लिये सावधानियाँ:** १. खाध सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा और आँखों के संम्पर्क से बचायें। ३. छिडकाव की बाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा मे छिडकाव करें। ४. छिडकाव के बाद दुषित कपडों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५.छिडकाव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नही चाहिए। ६. छिडकाव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहने। **पौध विषाक्तता:** सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौध विषाक्त नही है। **विष बाधा के लक्षण:** मितली, उल्टी, सिर-दर्द, चक्कर आना, पेट में दर्द हो सकते है। **प्राथमिक चिकित्सा:**१. यदी निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपडे उतार दे और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आँखें दूषित हो जाए तो उनको काफी मात्रा मे सैलाइन/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि कीटनाशक सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। **विष नाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नही हैं। लक्षणानुसार इलाज करें। **खाली डिब्बों का निपटारा:**१. कीटनाशक के खाली डिब्बों या पात्रों कों तोडफोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड देना चाहियें। २.प्रयोग किये गये डिब्बों को दुबारा प्रयोग के लिये बाहर न छोडें। ३. डिब्बों या बचे हुए कीटनाशक के धोवन का निपटारा इस प्रकार करें की जिससे आसपास की चीजें, पीने का पानी विषैला न हों। **संग्रहण की शर्ते:** १. कीटनाशक के डिब्बों को अलग-अलग कमरों या आलमारीयों से, जिनमें अन्य वस्तुए विशेषकर खाद्य पदार्थ या पशु आहार संग्रहित किए जाते है, उन से दूर अलग कमरों में या आलमारियों में ताला चाबी मे बंद रखे। २. जिन कमरे अथवा आलमारियों में कीटनाशक का भण्डारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सुखा, ठण्डा प्रकाश युक्त, हवादार व पर्याप्त लंबा चौंडा होना चहिये ताकी कीटनाशक भाप से वातावरण प्रदूषण होने का डर न हो।

**रासायनिक संरचना:**

| | |
|---|---|
| ऐसिटामिप्रिड स.त. | २०.०००% भार/भार |
| ब्लेंड ऑफ सोडियम डोडेसाइल बेन्झीन सल्फोनेट, सोडियाम सल्फेट तथा सोडियम एल्केलाइट का मिश्रण | ०४.५००% भार/भार |
| सोडियम साइट्रेट, डाईहाईड्रेट | ३०.००० भार/भार |
| कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डाईहाइड्रेट | ००.१०० भार/भार |
| रंग लाने वाले घटक ( ब्रिलीयन्ट ब्लू) | ००.०५०% भार/भार |
| लैक्टोज मोनोहाइड्रेट | पर्याप्त मात्रा |
| **कुल** | **१००.००० % भार/भार** |

**" खाली कंटेनर का दोबारा उपयोग करना खतरनाक है। "**

निर्माता और विक्रेता: **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**

रजि. ऑफिस : ४८ हिल रोड, बान्द्रा (प.), मुंबई-४०० ०५०. इंडिया.
फॅक्टरी : इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, फेज २, साम्बा, जम्मू-कश्मिर - १८४१२१.

# पोलर
## ॲसेटामिप्रिड २०% एसपी
(किटकनाशक)

**वापरण्यापूर्वी माहिती पत्रक वाचा.**

ॲसेटामिप्रिड २०% एसपी ही विरळघणारी पावडर मिश्रण आहे ज्यात २०% सक्रिय घटक ॲसेटामिप्रिड आहे. ॲसेटामिप्रिड २०% एसपी हे कापूस, मिरची आणि भात कोबी आणि भेंडी वरील शोषण करणाऱ्या किटकांवरील नियंत्रणासाठी अतिशय परिणामकारक सिस्टमिक किटकनाशक आहे.

**शिफारस:**

| पीक | किटकाचे सामायिक नाव | प्रति हेक्टर डोस ए.आय. (ग्रॅ) | मिश्रण (ग्रॅ) | विरघळवणे (ली.) | मागील फवारणी आणि काढणी ह्यातील वाट पाहण्याचा कालावधी |
|---|---|---|---|---|---|
| कपास | मावा | १० | ५० | ५००-६०० | १५ दिवस |
| | तुडतुडे | १० | ५० | ५००-६०० | |
| | पांढरी माशी | २० | १०० | ५००-६०० | |
| मिर्ची | चुरदा, | १०-२० | ५०-१०० | ५००-६०० | ३ दिवस |
| धान | तपकीरी तुडतुडे | १०-२० | ५०-१०० | ५००-६०० | ७ दिवस |
| कोबी | मावा | १५ | ७५ | ५००-६०० | ७ दिवस |
| भेंडी | मावा | १५ | ७५ | ५००-६०० | ३ दिवस |

**सावधगिरी :** ह्या लेबल / पत्रिका वर निर्देशित पीका व्यतिरिक्त इतर पीकावर वापरू नये. उत्पादन मधमाश्यांसाठी अतिशय विषारी आहे आणि दिवसातील मधमाश्यांच्या सक्रियपणे मध गोळा करण्याच्या वेळेमध्ये फवारणी करु नका .

**उपयोग करण्याच्या सूचना:** रोप संरक्षक उपकरण: नॅपसॅक स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, कॉप्रेशन नॅपसॅक स्प्रेयर, कॉप्रेशन नॅपसॅक बॅटरी स्प्रेयर, आणि एएसपीईई-एचटीपी पॉवर स्प्रेयर. **खबरदारी:** १. अन्नपदार्थ, अन्नाची रिकामी भांडी, प्राण्यांचे खाद्य ह्यापासून दूर ठेवा. २. तोंड, डोळे, आणि त्वचेशी संपर्क टाळा. ३. फरावणीचे धुके श्वासावाटे आत जाणे टाळा. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. ४. फवारणी नंतर संसर्गग्रस्त कपडे आणि शरीराचा भाग स्वच्छ धुवा. ५. फवारणी करताना धूम्रपान करू नका, काहीही पिऊ, खाऊ किंवा चघळू नका. ६. मिश्रण करताना आणि फवारणी करताना संपूर्ण संरक्षक कपडे घाला. **फायटोटॉक्सिसिटी:** शेतातील सूचनांनुसार वापरले असता हे उत्पादन फायटोटॉक्सिक नाही. **विषबाधेची लक्षणे:** मळमळणे, उलटी, डोकेदुखी, भोवळ येणे, आणि पोटात दुखू शकते. **प्रथमोपचार:** १. गिळल्यास, घशात बोट घालून उलटी करण्यास लावा. उलटी स्पष्ट होईपर्यंत असे करत रहा. रूग्ण बेशुद्ध असल्यास उलटी करण्यास लावू नका. २. जर कपडे आणि त्वचेला संसर्ग झाला असेल तर कपडे काढा आणि संसर्गग्रस्त भाग भरपूर पाणी आणि साबणाने स्वच्छ धुवा. ३. डोळ्यांना संसर्ग झाल्यास, १० ते १५ मिनिटे सलायन आणि भरपूर पाण्याने डोळे धुवा. ४. श्वासावाटे आत गेल्यास, रूग्णाला ताज्या हवेत घेऊन जा. **उतारा:** खास उतारा माहित नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा. **वापरलेल्या कंटनेर्सची विल्हेवाट:** १. रिकामे कंटेनर्स तोडून वस्तीपासून दूर पुरून टाकावेत. २. पुन्हा उपयोग केला जाऊ नये ह्यासाठी वापरलेले कंटेनर्स किंवा पॅकेजेस बाहेर फेकून देऊ नयेत. ३. पॅकेजेस किंवा उरलेला माल किंवा धुतलेले पाणी यांची पर्यावरण व पाण्याचे प्रदुषण होणार नाही अशा प्रकारे सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावावी. **साठवणीची स्थिती:** १. किटकनाशक असलेले पॅकेजेस स्वतंत्र खोली किंवा वास्तूत इतर वस्तू साठविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या खोल्या किंवा वास्तूपासून दूर किटकनाशकाचे प्रमाण आणि स्वरूप ह्यानुसार साठवून ठेवावीत. २. किटकनाशक साठविण्याच्या खोल्या चांगल्या उजेडाच्या, चांगल्या बांधलेल्या, कोरड्या, वायूवीजन असलेल्या आणि द्रवापासून संसर्ग होऊ नये ह्यासाठी पुरेशा आकारमानाच्या असाव्यात.

**रासायनिक मिश्रण:**

| | |
|---|---|
| ॲसेटामिप्रिड ए. आय्. | २०.०००% डब्ल्यू/डब्ल्यू |
| सोडियम डोडेसिल बेन्झाईन सल्फोनेट, सोडियम सल्फेट व सोडियम अल्कलेट यांचे मिश्रण | ०४.५००% डब्ल्यू/डब्ल्यू |
| सोडियम सायट्रेट, डिहायड्रेट | ३०.०००% डब्ल्यू/डब्ल्यू |
| कॅल्शियम हायड्रोजन फॉस्फेट डिहायड्रेट | ००.१००% डब्ल्यू/डब्ल्यू |
| रंग देणारे माध्यम (ब्रिलियन्ट ब्लू) | ००.०५०% डब्ल्यू/डब्ल्यू |
| लॅक्टोस मोनोहायड्रेट | क्यू. एस्. |
| **एकुण** | **१००.०००% डब्ल्यू/डब्ल्यू** |

**" रिकामे कंटेनर पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे."**

उत्पादनकर्ता व विक्रेता: **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**

रजि. ऑफिस : ४८ हिल रोड, बान्द्रा (प.), मुंबई-४०० ०५०. इंडिया.
फॅक्टरी : इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, फेज २, साम्बा, जम्मू-कश्मिर - १८४१२१.

# પોલર
## એસિટામિપ્રિડ ૨૦% એસપી
(જંતુનાશક)

**વાપરતાં પહેલાં પત્રિકા વાંચો.**

એસિટામિપ્રિડ ૨૦% એસપી દ્રાવ્ય પાઉડર રચના છે, જેમાં સક્રિય ઘટક એસિટામિપ્રિડના ૨૦% છે. એસિટામિપ્રિડ ૨૦% એસપી કપાસ, મરચાં અને ભાત કોબી અને ભીંડો માં ચૂસણિયા જંતુઓને નિયંત્રણમાં લેવા માટે ઉચ્ચ અસરકારક પદ્ધતિસર જંતુનાશક છે.

**ભલામણ**

| પાક(કો) | જંતુનું સામાન્ય નામ | હેક્ટર દીઠ ડોઝ એ.આઈ. (ગ્રા) | રચના (ગ્રા) | ઉમેરણ (લિ) | છેલ્લા છંટકાવથી લણણી સુધી થોભવાનો સમયગાળો |
|---|---|---|---|---|---|
| કપાસ | આફિડ | ૧૦ | ૫૦ | ૫૦૦-૬૦૦ | ૧૫ દિવસ |
| | જાસિડ | ૧૦ | ૫૦ | ૫૦૦-૬૦૦ | |
| | સફેદ માખી | ૨૦ | ૧૦૦ | ૫૦૦-૬૦૦ | |
| મરચાં | થ્રિપ્સ | ૧૦-૨૦ | ૫૦-૧૦૦ | ૫૦૦-૬૦૦ | ૩દિવસ |
| ભાત | બ્રાઉન પ્લાન્ટ હોપર (બીપીએચ) | ૧૦-૨૦ | ૫૦-૧૦૦ | ૫૦૦-૬૦૦ | ૭દિવસ |
| કોબી | આફિડ | ૧૫ | ૭૫ | ૫૦૦-૬૦૦ | ૭દિવસ |
| ભીંડો | આફિડ | ૧૫ | ૭૫ | ૫૦૦-૬૦૦ | ૩દિવસ |

**સાવચેતી : આ લેબલ/પત્રિકા પર દર્શાવેલા હોય તે સિવાયની ફસલો પર વાપરવું નહીં. ઉત્પાદન મધમાખીઓ માટે ઝેરી છે માટે જ્યારે એ પરાગનયનની ક્રિયામાં વ્યસ્ત હોય, દિવસના એ સમય દરમિયાન છંટકાવ કરશો નહીં.**

**કઈ રીતે ઉપયોગ કરવોઃ** છોડ સુરક્ષા ઉપકરણઃ નેપસેક સ્પ્રેયર, ફૂટ સ્પ્રેયર, કોમ્પ્રેશન નેપસેક સ્પ્રેયર, કોમ્પ્રેશન નેપસેક બેટરી સ્પ્રેયર અને અસ્પી- એચટીપી પાવર સ્પ્રેયર. **તકેદારીઓઃ** ૧. ખાદ્યપદાર્થ, તેના ખાલી ડબ્બાઓ અને પશુના આહારથી દૂર રાખો. ૨. મુખ, આંખ, ત્વચા સાથે સંપર્ક ટાળો. ૩. છંટકાવ વેળા શ્વાસમાં ન જાય તેનું ધ્યાન રાખો. પવનની દિશામાં છંટકાવ કરો. ૪. છંટકાવ પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરનો ભાગ સાફ ધોઈ કાઢો. ૫. છંટકાવ કરતી વેળા કશું ખાવું, પીવું, ચાવવું અને ધૂમ્રપાન કરવું નહીં. ૬. મિશ્રણ અને છંટકાવ કરતી વેળા સંપૂર્ણ સંરક્ષણાત્મક કપડાં પહેરો. **ઝેરીપણુંઃ** આ ઉત્પાદ ખેતીમાં ભલામણ અનુસાર ઉપયોગ કરાય તો ઝેરી નથી. **ઝેર લાગવાનાં લક્ષણઃ** ઊબકા, ઊલટી, માથામાં દર્દ, ચક્કર અને પેટમાં દર્દ ઉદભવી શકે છે. **પ્રાથમિક ઉપચારઃ** ૧. જો ગળી જવાય તો ગળાની પાછળ હળવી થપાટ મારીને ઊલટી કરાવો. ઊલટી સાફ થાય ત્યાં સુધી તેનું પુનરાવર્તન કરાવો. જો દરદી બેભાન હોય તો બળજબરીથી ઊલટી નહીં કરાવતા. ૨. જો ત્વચા અને કપડાં દૂષિત થયાં હોય તો કપડાં કાઢીને સ્વચ્છ પાણી અને સાબુથી ધોઈ નાખો. ૩. જો આંખ દૂષિત થાય થો ૧૦થી ૧૫ મિનિટ સુધી ભરપૂર પાણીની છાલક મારો. ૪. જો શ્વાસમાં જાય તો દરદીને સ્વચ્છ પવનમાં બહાર લાવો. **પ્રતિકારકઃ** કોઈ વિશિષ્ટ પ્રતિકારક જ્ઞાત નથી. લક્ષણ પ્રમાણે ઉપચાર કરો. **ઉપયોગ કરેલા ડબ્બાઓનો નિકાલઃ** ૧. ખાલી ડબ્બાઓ તોડી નાખવા અને માનવ વસાહતથી દૂર દાટી દેવા. ૨. ઉપયોગ કરેલા ડબ્બાઓ અથવા પેકેજોનો ફરી ઉપયોગ ટાળવા માટે તેને બહાર ખુલ્લામાં નહીં રાખવાં. ૩. પેકેજ અથવા વધારાની સામગ્રી અને ધોવાણનો નિકાલ બરોબર કરવો, જેથી પર્યાવરણીય કે જળ પ્રદૂષણ ટળે.**સંગ્રહની સ્થિતિઃ** ૧. જંતુનાશકોનો સમાવેશ ધરાવતાં પેકેજો અન્ય સામગ્રીઓ રાખવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા રૂમ અથવા સંકુલોથી દૂર અલગ રૂમ કે સંકુલોમાં રાખવાં અથવા માત્રા અને જંતુનાશકના પ્રકાર મુજબ અલગ તાળાં- ચાવી હોય તેવા કબાટમાં રાખવાં. ૨. જંતુનાશકનો સંગ્રહ કરવા માટેનો રૂમ કે સંકુલમાં સારો ઉજાશ હોવો જોઈએ. તે સારી રીતે બંધાયેલો હોવો જોઈએ. જગ્યા સૂકી અને હવાઉજાશની સારી અવરજવરવાળી હોવી જોઈએ. બાષ્પ સાથે દૂષિત થવાનું ટાળવા માટે જગ્યા પૂરતી મોટી હોવી જોઈએ.

**રાસાયણિક સંમિશ્રણઃ**

| | |
|---|---|
| એસિટામિપ્રિડ એ.આઈ. | ૨૦.૦૦૦% ડબ્લ્યુ/ ડબ્લ્યુ |
| સોડિયમ ડોડીસાઈલ બેન્ઝીન સલ્ફોનેટ, સોડિયમ સલ્ફેટ અને સોડિયમ આલ્કાયલેટનું સંમિશ્રણ | ૦૪.૫૦૦% ડબ્લ્યુ/ ડબ્લ્યુ |
| સોડિયમ સાઈટ્રેટ, ડિહાઈડ્રેટ | ૩૦.૦૦૦% ડબ્લ્યુ/ ડબ્લ્યુ |
| કેલ્શિયમ હાઈડ્રોજન ફોસ્ફેટ ડિહાઈડ્રેટ | ૦૦.૧૦૦% ડબ્લ્યુ/ ડબ્લ્યુ |
| કલરિંગ એજન્ટ (બ્રિલિયન્ટ બ્લુ) | ૦૦.૦૫૦% ડબ્લ્યુ/ ડબ્લ્યુ |
| લેક્ટોઝ મોનોહાઈડ્રેટ | |
| **કુલ** | **૧૦૦.૦૦૦% ડબ્લ્યુ/ ડબ્લ્યુ** |

**''ખાલી ડબ્બા ફરીથી ઉપયોગ કરવાનું ખતરનાક છે.''**

ઉત્પાદક અને વિક્રેતાઃ **ઘરડા કેમિકલ્સ લિમિટેડ**

નોંધણીકૃત કચેરી : ૪૮.હિલરોડ, બાંદરા (પ), મુંબઈ-૪૦૦ ૦૫૦. ભારત.
ફેક્ટરીઃ ઈન્ડસ્ટ્રિયલ ગ્રોથ સેન્ટાર, ફેઝ-૨, સાંબા, (જમ્મુ-કાશ્મીર) - ૧૮૪૧૨૧.

# ਪੋਲਾਰ
## ਐਸੀਟਾਮੀਪ੍ਰਿਡ ੨੦% ਐਸਪੀ
(ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

**ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਪੜ ਲਓ।**

ਐਸੀਟਾਮੀਪ੍ਰਿਡ ੨੦% ਐਸਪੀ ਇਕ ਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ਪਾਉਡਰ ਸੂਤਰੀਕਰਣ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀਟਾਮੀਪ੍ਰਿਡ ਦੇ ੨੦% ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੀਟਾਮੀਪ੍ਰਿਡ ੨੦% ਐਸਪੀ ਇਕ ਅਤਿ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਰਸ ਵਿਚ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਪਾਹ, ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਭਿੰਡੀ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੂਸਕ ਕਿਰਮਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

**ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ:**

| ਫਸਲ (ਾਂ) | ਕੀੜੇ ਦਾ ਆਮ ਨਾਂ | ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤਿ ਹੇਕਟੇਅਰ ਏ. ਆਈ. ਗ੍ਰਾਮ/% | ਸੂਤਰੀਕਰਣ ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ | ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ | ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ |
|---|---|---|---|---|---|
| ਕਪਾਹ | ਮਾਹੂ | ੧੦ | ੫੦ | ੫੦੦-੬੦੦ | ੧੫ ਦਿਨ |
| | ਚੇਪਾ | ੧੦ | ੫੦ | ੫੦੦-੬੦੦ | |
| | ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ | ੨੦ | ੧੦੦ | ੫੦੦-੬੦੦ | |
| ਮਿਰਚ | ਤੇਲਾ | ੧੦-੨੦ | ੫੦-੧੦੦ | ੫੦੦-੬੦੦ | ੩ ਦਿਨ |
| ਚੌਲ | ਭੂਰਾ ਪੌਦਾ ਹਾੱਪਰਸ (ਬੀਪੀਐਚ) | ੧੦-੨੦ | ੫੦-੧੦੦ | ੫੦੦-੬੦੦ | ੭ ਦਿਨ |
| ਬੰਦ ਗੋਭੀ | ਮਾਹੂ | ੧੫ | ੭੫ | ੫੦੦-੬੦੦ | ੭ ਦਿਨ |
| ਭਿੰਡੀ | ਮਾਹੂ | ੧੫ | ੭੫ | ੫੦੦-੬੦੦ | ੩ ਦਿਨ |

**ਸਾਵਧਾਨੀ : ਇਸ ਲੇਬਲ/ ਪਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ**

**ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼** : ਪੌਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ : ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਫੁੱਟ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੈਪਸੈਕ ਬੈਟਰੀ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਅਤੇ ਏ ਐਸ ਪੀ ਈ ਈ -ਐਚ ਟੀ ਪੀ ਸਪ੍ਰੇਅਰ **ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ**: ੧. ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖੋ। ੨. ਮੂੰਹ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ। ੩. ਸਪ੍ਰੇ ਦਾ ਧੂੰਆ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ. ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰੇ ਕਰੋ। ੪. ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਦੇ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਧੋਲਵੋ। ੫. ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣਾ, ਪੀਣਾ, ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚਬਾਨਾ ਮਨਾ ਹੈ। ੬. ਮਿਲਾਨ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਪੜੇ ਪਾਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। **ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ**: ਜੇਕਰ ਖੇਤ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂਹ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਜਹਰੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। **ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਅਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ** : ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਢਿਡ ਪੀੜ ਹੋਸੱਕਦੀ ਹੈ। **ਫਸਟ ਏਡ**: ੧. ਅਗਰ ਨਿਗਲ ਲੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਹ ਉਸਨੂੰ ਗਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਦਗੁਦੀ ਕਰਕੇ ਉਲਟੀ ਕਰਵਾ ਦਿਉ। ਦੁਹਰਾਂਦੇ ਰਹੋਜਦੋਂ ਤਕ ਉਲਟੀ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਰੋਗੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਜਾਏ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ੨. ਅਗਰ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਗੰਦੇ ਹੋਨ, ਕਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦੇਵੋਅਤੇ ਗੰਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸਾਬਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਦਿਉ। ੩. ਅਗਰ ਅਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਮਕੀਨ/ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ੧੦ ਤੋਂ ੧੫ ਮਿੰਟਾਂ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ੪. ਅਗਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਤਾਜੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੋ। **ਵਨਸਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਹਰ**: ਕੋਵੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਿਸਾਰਕ ਨਹੀ ਹੈ, ਲਛਣਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ. **ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ** : ੧) ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਕੇ ਦਬਾ ਦੇਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ੨) ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਤਾਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ੩) ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਧੋਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸੱਕੇ। **ਸਟੋਰੇਜ ਹਾਲਾਤ** : ੧. ਜੇਹੜੇ ਡਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸਾਮਗ੍ਰੀ, ਨੂੰ ਰਖੱਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਖੱਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਮਾਤ੍ਰਾ ਅਤੇ ਸਵਰੂਪਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਗ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੰਦਰਾ ਚਾਬੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰਖੱਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ੨. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰਖੱਣ ਵਾਸਤੇ ਬਨਾਇਆ ਗਇਆ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ, ਸੁੱਕਾ ਰੋਸ਼ਨੀਦਾਰ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਭਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਨ ਵਾਲੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਨ ਲਈ ਯੋਗ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

**ਰਸਾਇਣਿਕ ਮਿਸ਼ਰਨ:**

| | |
|---|---|
| ਐਸੀਟਾਮੀਪ੍ਰਿਡ ਏ.ਆਈ. | ੨੦.੦੦੦ % ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ |
| ਸੋਡੀਅਮ ਡੋਡੇਸਾਇਲ ਬੇਨਜ਼ੇਨ ਸਲਫੋਨੇਟ, ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਅਲਕਾਇਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ | ੦੪.੫੦੦ % ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ |
| ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਇਟ੍ਰੇਟ, ਡੀਹਾਇਡ੍ਰੇਟ | ੩੦.੦੦੦ % ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ |
| ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਇਡ੍ਰੋਜਨ, ਫੱਸਫੇਟ ਡੀਹਾਇਡ੍ਰੇਟ | ੦੦.੧੦੦ % ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ |
| ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੱਤ (ਚਮਕਦਾਰ ਨੀਲਾ) | ੦੦.੦੫੦ % ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ |
| ਲੈਕਟੋਸ ਮੋਨੋਹਾਈਡਰੇਟ | ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ |
| **ਕੁਲ** | **੧੦੦.੦੦੦ % ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ** |

**''ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।''**

ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ : **ਘਰਡਾ ਕੇਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ**

ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਆੱਫਿਸ : ੪੮, ਹਿੱਲ ਰੋਡ, ਬਾਂਦਰਾ (ਪ.), ਮੁੰਬਈ - ੪੦੦ ੦੫੦. ਭਾਰਤ.
ਫੈਕਟਰੀ : ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਗ੍ਰੋਥ ਸੈਂਟਰ, ਫੇਜ਼ II, ਸਾਂਬਾ,( ਜੱਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ) . ੧੮੪੧੨੧

# DIRECTION FOR USE

**FOR AGRICULTURAL USE**

**कृषि उपयोग के लिए**

**Read Leaflet Before Use**

**इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।**

POLAR®

Acetamiprid 20% SP
(Insecticide)

पोलर

**ऐसिटामिप्रिड २०% एस.पी.**
(कीटनाशक)



Manufactured & Marketed by:
**GHARDA CHEMICALS LIMITED**
Regd. Office: 48, Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400 050. INDIA.
Factory : Industrial Growth Centre, Phase II, Samba, (J&K)- 184121.

निर्माता और विक्रेता:
**घरडा केमिकल्स लिमिटेड**
पंजी.कार्यालय: ४८, हिल रोड, बांद्रा (प.), मुंबई-४०००५०. भारत.
फैक्टरी : इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, फेज २, साम्बा, जम्मू-कश्मिर - १८४१२१.

For any complaints, contact Customer Care Executive at Gharda Chemicals Limited, Gharda House, 48, Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400 050. INDIA.
**Tel.: 022 26551988/66265999,**
**Email: consumercare@gharda.com;**

® - Registered Trademark of Gharda Chemicals Limited

J.09.24-01

# পোলার
অ্যাসিটামিপ্রিড ২০% এসপি
কীটনাশক

ব্যবহারের পূর্বে লিফলেট পড়ে নিন।

অ্যাসিটামিপ্রিড ২০% এসপি হল একটি দ্রবণীয় পাউডারের মিশ্রণ যাতে আছে অ্যাসিটামিপ্রিড ২০% সক্রিয় উপাদান। অ্যাসিটামিপ্রিড ২০% এসপি হল তুলা, লঙ্কা এবংচালের পোকার মত শোষক বাঁধাকপি এবং ঢেঁড়স কীটের নিয়ন্ত্রণের জন্যে একটি উচ্চমাত্রায় কার্যকরি অন্তর্বাহি কীটনাশক।

**অনুমোদন :**

| শস্য | কীটের সাশারণ নাম | প্রতি এইচ এ: এ.আই. (গ্রাম) | মিশ্রণ (গ্রাম) | দ্রবণ (লিটার) | অপেক্ষার সময়কাল শেষ স্প্রে করার সময় থেকে ফসল বোনার সময় পর্যন্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| তুলা | জাব পোক, | ১০ | ৫০ | ৫০০-৬০০ | ১৫ দিন |
| | চোষী পোকা, | ১০ | ৫০ | ৫০০-৬০০ | |
| | সাদা মাঝি | ২০ | ৫০ | ৫০০-৬০০ | |
| লঙ্কা | বাদামী শোষক | ১০-২০ | ৫০-১০০ | ৫০০-৬০০ | ৩দিন |
| ধান | ব্রাউন প্ল্যান্ট পোকা (বিপিএইচ) | ১০-২০ | ৫০-১০০ | ৫০০-৬০০ | ৭ দিন |
| বাঁধাকপি | জাব পোক | ১৫ | ৭৫ | ৫০০-৬০০ | ৭ দিন |
| ঢেঁড়স | জাব পোক | ১৫ | ৭৫ | ৫০০-৬০০ | ৩ দিন |

**সাবধানতা : এই লেভেলে / লিফ্লেটত নির্দিষ্ট করা না থাকলে ফসলে ব্যবহার করা যাবে না এই উৎপাদ মৌমাছিদের প্রতি বিষাক্ত, তাই সক্রিয় খাদ্যসন্ধানের দিনের সময়কাল চলাকালীন স্প্রে করবেন না।**

**ব্যবহার বিধি :** গাছ সুরক্ষার উপকরণ : ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, ফুট স্প্রেয়ার, কম্প্রেশন ন্যাপস্যাক ব্যাটারি স্প্রেয়ার, অ্যাসপি-এইচটিপি পাওয়ার স্প্রেয়ার। **সতর্কতা :** ১. খাদ্যদ্রব্য, খালি খাদ্যদ্রব্যের পাত্র এবং পশুখাদ্যের ছোঁয়ার বাইরে রাখুন। ২. মুখ, চোখ এবং ত্বকের স্পর্শ থেকে বাঁচান। ৩. স্প্রে'র ছিটে রস যেন নিঃশ্বাসের সাথে চলে না যায়, বাতাসের দিকে স্প্রে করুন। ৪. পোশাক এবং শরীরের স্পর্শ লাগা অংশ ভাল করে ধুয়ে নিন। ৫. স্প্রে করার সময় ধূমপান, জলীয় দ্রব্য পান বা কোনো কিছু খাবেন না। ৬. মিশ্রণ এবং স্প্রে করার সময় সম্পূর্ণ সুরক্ষিত পোশাক পরবেন। **বিষক্রিয়া :** যেমনভাবে বলা হয়েছে তেমনভাবে ক্ষেতে ব্যবহার করলে উৎপাদনটিতে কোনো বিষক্রিয়া হয় না। **বিষক্রিয়ার লক্ষণ:** মাথাঘোরা, বমি, মাথাব্যথা, বমি ভাব এবং পেটে ব্যথা হতে পারে। **প্রাথমিক চিকিৎসা :** ১. যদি গিলে ফেলে, গলায় আঙুল দিয়ে বমি করাতে চেষ্টা করবেন। যতক্ষণ না বমি হয়ে সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয় ততক্ষণ এটি চালিয়ে যান। ২. পোশাক এবং ত্বকে যদি স্পর্শ লাগে, তবে পোশাক খুলিয়ে দিন এবং স্পর্শ লাগা ত্বক প্রচুর জল ও সাবান দিয়ে ধুয়ে দিন। ৩. যদি চোখের ভিতরে চলে যায় তবে প্রচুর পরিমাণে নুন জল দিয়ে বা পরিষকার জল দিয়ে ১০ থেকে ১৫ মিনিট সময় ধরে ধুয়ে দিন। ৪. যদি নিঃশ্বাসের সাথে চলে যায়, তবে রোগীকে পরিষ্কার বাতায়নে নিয়ে যান। **প্রতিষেধক :** বিশেষ কোনো প্রতিষেধক জানা নেই। উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন। **ব্যবহৃত পাত্রগুলির বিনষ্টিকরণ :** ১. খালি পাত্রগুলি নষ্ট করে মাটির তলায় আবাস-স্থলের থেকে দূরে কোথাও পুঁতে ফেলুন। ২. ব্যবহৃত প্যাকেজগুলি অথবা অতিরিক্ত বস্তু এবং কীটনাশক ধোয়ার যন্ত্রপাতিগুলিকে নিরাপদভাবে বিনষ্ট করতে হবে এমনভাবে যাতে পুনরায় না ব্যবহার করা যায়। ৩. ব্যবহৃত প্যাকেজগুলি অথবা অতিরিক্ত অব্যবহৃত মিশ্রণটি যাতে দ্বিতীয়বার কেউ ব্যবহার না করতে পারে এমনভাবে নষ্ট করে ফেলুন যাতে পরিবেশ এবং জলের দূষণ না হয়। **সংগ্রহ করার শর্ত :** ১. কীটনাশকগুলির প্যাকেজ আলাদা ঘরে অথবা ঘর থেকে দূরে কোনো বাড়িতে অথবা বিশেষত খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা হয় এমন কোনো জায়গায় অথবা তালা চাবি দেওয়া আলাদা কোনো আলমারিতে রাখতে হবে, ওষধিনাশকটির পরিমাণ এবং গুণের উপর নির্ভর করে। ২. ঘর অথবা বাড়ি যেখানে কীটনাশক রাখা হবে সেটি হতে হবে মজবুত, প্রচুর আলোবাতাস আছে এমন এবং বেশ বড় আয়তনযুক্ত ঘরে রাখতে হবে, যেখানে জলীয় বাষ্প তৈরি না হয়।

**কেমিক্যাল কম্পোজিশন :**

| | |
|---|---|
| অ্যাসিটামিপ্রিড এ.আই. | ২০.০০০% ওঃ/ওঃ |
| সোডিউম ডোডেসাইল বেঞ্জিন সালফোনেট সোডিয়াম সালফেট অ্যান্ড সোডিয়াম অ্যালকিলেট | ০৪.৫০০% ওঃ/ওঃ |
| সোডিয়াম সাইট্রেট, ডিহাইড্রেট | ৩০.০০% ওঃ/ওঃ |
| ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট ডাইহাইড্রেট | ০০.১০০% ওঃ/ওঃ |
| কালারিং এজেন্ট (ব্রিলিয়েন্ট ব্লু) | ০০.০৫০% ওঃ/ওঃ |
| ল্যাক্টোজমোনোহাইড্রেট | কিউ.এস. |
| মোট | ১০০.০০০% ওঃ/ওঃ |

**"খালি পাত্র ব্যবহার করা বিপজ্জনক"**

**নির্মাতা ও বিক্রেতার : ঘারদা কেমিক্যালস লিমিটেড**
**রেজিস্টার্ড অফিস : ৪৮, হিল রোড, বান্দ্রা (পশ্চিম), মুম্বাই ৪০০ ০৫০ ভারত**
ফ্যাক্টৰি : ইন্ডাস্ট্ৰিয়াল গ্ৰোথ সেন্টাৰ, ফেজ নম্বর সম্বা (জম্মু-কাশ্মীৰ)-১৮৪১২১.

# పోలార్
ఏసెటామిప్రిడ్ 20% ఎస్పి
(క్రిమిసంహారిణి)

**ఉపయోగించడానికి ముందు కరపత్రం చదవండి.**

ఏసెటామిప్రిడ్ 20% ఎస్పి అనేది ఏసెటామిప్రిడ్ చురుకైన మిశ్రమం యొక్క 20% కరిగిపోయే పొడరు సూత్రం గల మిశ్రమం. ఏసెటామిప్రిడ్ 20% ఎస్పి అనేది తీవ్రం స్థాయి అంతర్వ్యాపిక క్రిమిసంహారిణి, ఇది ప్రత్తి, మిరప మరియు వరి క్యాబేజ్, బెండ పంటలలో ఉండే రసం పీల్చు పురుగులని అదుపు చేస్తుంది.

**సిఫారుసులు:**

| పంట (లు) | కీటకాల సాధారణ పేరు | ప్రతీ హెక్టారుకు మోతాదు: ఏ.ఎల్ (గ్రా) | సూత్రం (మిల్లీ లీటర్లు) | నీటి మిశ్రమం (లీటర్లు) | చివరి స్ప్రే నుండి కోత సమయం మధ్య వేచి ఉండే కాలం (రోజులు) |
|---|---|---|---|---|---|
| ప్రత్తి | ఎఫిడ్స్ | 10 | 50 | 500-600 | 15 రోజులు |
| | జసిడ్స్ | 10 | 50 | 500-600 | |
| | వైట్‌ఫ్లైస్ | 20 | 100 | 500-600 | |
| మిరప | థ్రిప్స్ | 10-20 | 50-100 | 500-600 | 3 రోజులు |
| వరి | బ్రౌన్ ప్లాంట్ హాపర్స్ (బిపిహెచ్) | 10-20 | 50-100 | 500-600 | 7 రోజులు |
| క్యాబేజ్ | ఎఫిడ్స్ | 15 | 75 | 500-600 | 7 రోజులు |
| బెండ | ఎఫిడ్స్ | 15 | 75 | 500-600 | 3 రోజులు |

జాగ్రత్త : ఈ లేబుల్/లీఫ్‌లెట్‌లో పేర్కొన్న పంటలు కాకుండా ఇతర పంటలకు వాడరాదు. ఈ ఉత్పాదన తేనెటీగలకు అత్యంత విషపూరితం, కాబట్టి రోజులో తేనెటీగలు ఎక్కువగా సంచరించే సమయంలో పిచికారి చేయకండి.

**వాడుటకు సూచనలు:** వాడుటకు ఉపయోగించే పరికరం: నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, కాలి స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ బాటరీ స్ప్రేయర్ మరియు ఏస్‌పిఇఇ-హెచ్‌టిపి పవర్ స్ప్రేయర్. **జాగ్రత్తలు:** 1. ఆహార పదార్థాలకి, ఖాళీ ఆహారపు డబ్బాలకి మరియు జంతు ఆహారానికి దూరంగా ఉంచాలి 2. నోటికి, కంటికి మరియు చర్మానికి తాకరాదు. 3.స్ప్రే పొగని పీల్చరాదు. గాలి వీచు దిశలో స్ప్రే చేయాలి 4. అంటుకున్న దుస్తులని మరియు శరీర భాగాలని శుభ్రంగా కడగాలి 5. స్ప్రే చేస్తున్నపుడు పొగత్రాగరాదు, త్రాగరాదు, తినరదు మరియు నమలరాదు 6. పూర్తి రక్షణనిచ్చే దుస్తులని కలిపేటపుడు మరియు స్ప్రే చేసేటపుడు ధరించాలి. **ఫైటోటాక్సిసిటీ :** సిఫారుసు చేసిన విధంగా పొలంలో వాడినట్లయితే ఈ ప్రొడక్ట్ ఫైటోటాక్సిక్ కాదు. విషపు లక్షణాలు: తలనొప్పి, వాంతులు, కళ్ళు తిరగడం, కడుపు నొప్పి ఏర్పడుతుంటాయి. **ప్రథమ చికిత్స :** 1. మింగినట్లయితే గొంతు క్రింద కితకితలు పెట్టి వాంతులు జరిగేలా చేయండి . వాంతు పూర్తిగా అయ్యేలా చూడండి. రోగి స్పృహలో లేకుంటే ఇలా చేయకండి. 2. చర్మానికి, బట్టలకి అంటుకున్నట్లయితే, అంటుకున్న చర్మాన్ని , బట్టలని చాలా నీటితో మరియు సబ్బుతో కడగాలి. 3. కళ్ళలోకి వెడితే కళ్ళని సెలైన్ / శుభ్రమైన నీటితో 10 నుండి 15 నిమిషాల పాటు కడగాలి 4. మింగినట్లయితే, రోగిని స్వచ్ఛమైన గాలిలోకి తీసుకెళ్ళాలి. **విరుగుడు:** ప్రత్యేకమైన విరుగుడు ఏమీ లేదు. జాగ్రత్తగా చికిత్స చేయాలి. **ఖాళీ డబ్బాలని పారేయుట:** 1. ప్యాకేజీలని విరక్కొట్టాయి మరియు పరిశరాలకు దూరంగా పాతిపెట్టాలి 2. వాడిన ప్యాకేజీలని తిరిగి వాడటానికి బయట ఉంచరాదు. 3. ఖాళీ ప్యాకేజీలు లేదా మిశ్రమం మరియు మెషీన్ల నుండి కడుగుతున్నపుడు లేదా డబ్బాలనుండి పారేసేటపుడు సురక్షితమైన ప్రదేశాన్ని చూడాలి, పరిశరాలకు దూరంగా పారేయాలి లేదా నీటి కాలుష్యం కాకుండా చూడాలి నిలవ: 1. క్రిమిసంహారక డబ్బాలను విడిగా ఉన్న గదులో లేదా పరిసరాలకు దూరంగా ఉన్న గదుల్లో ఇతర వస్తువులు మరియు ఆహార పదార్థాలు ఉన్న ప్రదేశంలో కాకుండా విడిగా ఉన్న అల్మారాలో క్రిమిసంహారకము యొక్క క్వాలిటీ మరియు స్వభావాన్ని బట్టి తాళం వేసి ఉంచాలి. గదులు లేదా పరిసరాలు చక్కటి గాలి, వెలుతురు, పొడిగా ఉండి, చక్కగా నిర్మించబడిన గదులైవుండి తేమ వుండని ప్రదేశము అయి ఉండాలి.

**రసాయనిక మిశ్రమం:**

| | |
|---|---|
| ఏసెటామిప్రిడ్ ఎ.ఐ | 20.000% డబల్యూ/డబల్యూ |
| బ్లెండ్ ఆఫ్ సోడియం డోడెసిల్ బెంజీన్ సల్ఫోనేట్, సోడియం సల్ఫేట్ ు సోడియం అల్కైలేట్ | 04.500% డబల్యూ/డబల్యూ |
| కాల్షియం సిట్రేట్, డై హైడ్రేట్ | 30.000% డబల్యూ/డబల్యూ |
| కాల్షియం హైడ్రోజెన్ ఫాస్ఫేట్ డై హైడ్రేట్ | 00.100% డబల్యూ/డబల్యూ |
| కలరింగ్ ఏజెంట్ (బ్రిలియంట్ బ్లూ) | 00.050% డబల్యూ/డబల్యూ |
| లాక్టోస్ మోనోహైడ్రేట్ | క్యూ.ఎస్ |
| మొత్తం | 100.000% డబల్యూ/డబల్యూ |

**''ఖాళీ డబ్బాలని తిరిగి ఉపయోగించడం ప్రమాదం''**

తయారు మరియు మార్కెట్ చేయువారు : **ఘర్ద కెమికల్స్ లిమిటెడ్**
రిజిస్టర్డ్ ఆఫీసు : 48, హిల్ రోడ్, బాంద్రా (వె), ముంబయ్ - 400 050 ఇండియా
ఫ్యాక్టరీ : ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ సెంటర్, ఫేజ్ ఐఐ, సాంబ, (జమ్మూ-కాశ్మీర్) - 184 121.

# போலார்
அசெடாமிப்ரிட் 20% எஸ்பி
(பூச்சிக்கொல்லி)

**உபயோகிப்பதற்கு முன்பு சிற்றேட்டை படிக்கவும்.**

அசெடாமிப்ரிட் 20% எஸ்பி தண்ணீரில் கரையக் கூடிய பவுடர் வடிவிலானது. இது 20% அசெடாமிப்ரிடை செயல்புரியும் மருந்தாக கொண்டது. அசெடாமிப்ரிட் 20% எஸ்பி பருத்தி, மிளகாய் மற்றும் அரிசி முட்டைகோஸ், வெண்டையில் உறிஞ்சும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தும் உடல்முழுவதும் பரவி வேலை செய்யும் உயர் ஆற்றல் கொண்டது.

**பரிந்துரை:**

| பயிர்(கள்) | பூச்சியின் பொதுப்பெயர் | ஹெக்டேருக்கான மருந்தளவு: ஏ.ஐ. (கிராம்) | கலவை (கிராம்) | கரைசல் (லிட்டர்) | கடைசி தெளிப்பிலிருந்து அறுவடைக்கு காத்திருக்கும் காலம் |
|---|---|---|---|---|---|
| பருத்தி | அசுவினி | 10 | 50 | 500-600 | 15 நாட்கள் |
| | பச்சைதத்துப்பூச்சி | 10 | 50 | 500-600 | |
| | வெள்ளைப் பூச்சிகள் | 20 | 100 | 500-600 | |
| மிளகாய் | அந்துப்பூச்சி | 10-20 | 50-100 | 500-600 | 3 நாட்கள் |
| அரிசி | பழுப்புநிற வெட்டுக்கிளிகள்(பிபிஎச்) | 10-20 | 50-100 | 500-600 | 7 நாட்கள் |
| முட்டைகோஸ் | அசுவினி | 15 | 75 | 500-600 | 7 நாட்கள் |
| வெண்டை | அசுவினி | 15 | 75 | 500-600 | 3 நாட்கள் |

**எச்சரிக்கை : இந்த லேபிலில்/கையேட்டில் குறிப்பிட்டு இருக்காத பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக் கூடாது. இந்த மருந்து தேனீக்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் என்பதால் தேனீக்கள் சுறுசுறுப்பாகப் பறந்து கொண்டிருக்கும் பகல் நேரத்தில் மருந்தைத் தெளிக்கக் கூடாது.**

ஃபென்பைரோக்ஸிமேட், தொடுதல் மற்றும் வயிற்று விஷத்தன்மை கொண்ட அதிக சக்திவாய்ந்த பைரோஸோல் அந்துப் பூச்சிக்கொல்லி ஆகும். ஃபென்பைரோக்ஸிமேட் தேயிலை மற்றும் மிளகாயில் உள்ள பைட்டோபாகஸ் அந்துப்பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துவதில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. **பயன்படுத்தும் முறை:** பயிர் பாதுகாப்பு கருவி: நாப்சாக் ஸ்பிரேயர், ஃபூட் ஸ்பிரேயர், கம்ப்ரெஷன் நாப்சாக் ஸ்பிரேயர், கம்ப்ரெஷன் நாப்சாக் பேட்டரி ஸ்பிரேயர் மற்றும் அஸ்பீ-எச்டிபி பவர் ஸ்பிரேயர். **முன்னெச்சரிக்கை:** 1. உணவுப்பொருட்கள், வெற்று உணவு கொள்கலன்கள் மற்றும் விலங்குகளுக்கான தீவனத்திலிருந்து தொலைவில் வைக்கவும் 2. வாய், கண்கள் மற்றும் சருமத்தில் படுவதை தவிர்க்கவும். 3. நுண் திவலைகளை உட்சுவாசிப்பதை தவிர்க்கவும் மற்றும் காற்று வீசும் திசையில் தெளிக்கவும். 4. தெளித்த பிறகு மருந்து பட்ட ஆடைகள் மற்றும் உடல் உறுப்புக்களை முழுவதுமாக கழுவவும். 5. தெளிக்கும்போது எதையும் அருந்தவோ, மெல்லவோ அல்லது புகைப்பிடிக்கவோ கூடாது. 6. கலக்கும்போதும், தெளிக்கும்போதும் உடலை முழுவதும் மூடும்படியான ஆடைகளை அணியவும். **பைடோடாக்ஸிட்டி:** பரிந்துரைக்கப்பட்டபடி வயலில் பயன்படுத்தினால் இந்த தயாரிப்புக்கு பைடோடாக்ஸிட்டி ஏற்படாது. அறிகுறிகள் மற்றும் விஷத்தன்மை: குமட்டல், வாந்தி, தலைவலி, தலைச்சுற்றல் மற்றும் வயிற்று வலி ஆகியவை ஏற்படலாம். **முதலுதவி:** 1. விழுங்கிவிட்டால், தொண்டைக்குள் விரலைவிட்டு வாந்தி எடுக்கச் செய்யவும். தெளிவாக வாந்தி எடுக்கும் வரை தொடர்ந்து அவ்வாறு செய்யவும். நோயாளி மயக்கமுற்று இருந்தால் அவ்வாறு செய்யக்கூடாது. 2. ஆடைகள் மற்றும் சருமத்தில் மருந்து பட்டால், ஆடைகளை களைந்து சோப்பு மற்றும் ஏராளமான தண்ணீர் கொண்டு கழுவவும். 3. கண்களில் மருந்து பட்டால் ஏராளமான உப்பு/சுத்தமான தண்ணீரை அடித்து தோராயமாக 10 லிருந்து 15 நிமிடங்களுக்கு கழுவவும். 4. உட்சுவாசித்தால், நோயாளியை காற்று வீசும் இடத்திற்கு கொண்டு செல்லவும். **எதிர் மருந்து:** குறிப்பிட்ட எதிர் மருந்து இல்லை. அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ப சிகிச்சைஅளிக்கவும். பயன்படுத்திய கண்டெய்னரை **அப்புறப்படுத்துதல்:** 1. வெற்று கொள்கலன்களை உடைத்து குடியிருப்பு பகுதிக்கு அப்பால் புதைக்க வேண்டும். 2. பயன்படுத்தப்பட்ட கொள்கலன்கள் அல்லது பேக்கேஜ்களை மீண்டும் பயன்படுத்தும் வண்ணம் வெளியில் விட்டு வைக்கக் கூடாது. 3. சுற்றுப்புறம் மற்றும் தண்ணீர் மாசுபடுவதை தடுக்கும் வகையில் பேக்கேஜ் அல்லது எஞ்சியுள்ள மருந்துக்கலவை மற்றும் மெஷினை கழுவிய நீரை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்த வேண்டும். **சேமித்து வைக்கும் நிலைகள்:** 1. பூச்சிக்கொல்லி கொண்ட பேக்கேஜ்களை மற்ற பொருட்களை சேமித்து வைக்கும் அறைகள் அல்லது கட்டிடங்களிலிருந்து தொலைவில் உள்ள அறைகள் அல்லது கட்டிடங்களில் பூச்சிக்கொல்லியின் அளவு மற்றும் தன்மையை பொறுத்து பூட்டு சாவியுள்ள அலமாரிகளில் வைக்க வேண்டும். 2. பூச்சிக்கொல்லியை சேமித்து வைக்கும் அறைகள் அல்லது கட்டிடங்கள் உலர்ந்த, நன்றாக கட்டப்பட்ட, நல்ல காற்றோட்டம் உள்ள மற்றும் ஆவியால் மாசுபடுவதை தடுப்பதற்கான போதுமான அளவிலானதாக இருக்க வேண்டும்.

**ரசாயன சேர்க்கை:**

| | |
|---|---|
| அசெடாமிப்ரிட் ஏ.ஐ. | 20.000% w/w |
| சோடியம் டாடெகைல் பென்ஸீன் சல்ஃபோனேட், சோடியம் சல்பேட் மற்றும் சோடியம் அல்காலேட் கலவை | 04.500% w/w |
| சோடியம் சிட்ரேட், டிஹைட்ரேட் | 30.000% w/w |
| கால்சியம் ஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட் டிஹைட்ரேட் | 00.100% w/w |
| கலரிங் ஏஜென்ட் (பிரில்லியன்ட் புளூ) | 00.050% w/w |
| லாக்டோஸ் மோனோஹைட்ரேட் | க்யூ.எஸ். |
| மொத்தம்: | 100.000% w/w |

''வெற்று கொள்கலனை பயன்படுத்துவது அபாயகரமானது''

உற்பத்தியாளர் மற்றும் விற்பனையாளர்:
**கர்டா கெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட்**
பதிவு அலுவலகம்:48, ஹில் ரோடு, பாந்திரா (மே), மும்பை-400 050. இந்தியா
ஃபேக்டரி: இண்டஸ்ட்ரியல் குரோத் சென்டர், பேஸ் ஐஐ, சம்பா, (ஜே அண்ட் கே) - 184121.

# ಪ್ರೊಲಾರ್
ಎಸೆಟಮಿಪ್ರಿಡ್ 20% ಎಸ್‌ಪಿ
(ಕೀಟನಾಶಕ)

**ಬಳಸುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿರಿ.**

ಎಸೆಟಮಿಪ್ರಿಡ್ 20% ಎಸ್‌ಪಿಯು 20% ಎಸೆಟಮಿಪ್ರಿಡ್ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕರಗುವ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸೆಟ ಮಿಪ್ರಿಡ್ 20% ಎಸ್‌ಪಿ ಇದು ಹತ್ತಿ, ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ, **ಎಲೆಕೋಸು, ಭೆಂಡೆ** ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಂತರ್‌ವ್ಯಾಪಿ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ.

**ಶಿಫಾರಸು:**

| ಬೆಳೆ (ಗಳು) | ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು | ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ: ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಸ.ಘ (ಗ್ರಾಂ) | ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆ (ಗ್ರಾಂ) | ತೆಳುಗೊಳಿಸುವುದು (ಲೀ) | ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿನ ನಡುವೆ ಕಾಯ ಬೇಕಾದ ಅವಧಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಹತ್ತಿ | ಗಿಡ ಹೇನು | 10 | 50 | 500-600 | 15 ದಿನಗಳು |
| | ಹಸಿರು ಜಿಗಿ ಹುಳು | 10 | 50 | 500-600 | |
| | ಬಿಳಿ ನೊಣ | 20 | 100 | 500-600 | |
| ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ | ನುಸಿ | 10-20 | 50-100 | 500-600 | 3 ದಿನಗಳುಭತ್ತ |
| ಕಂದು | ಜಿಗಿ ಹುಳು (ಬಿಪಿಎಚ್) | 10-20 | 50-100 | 500-600 | 7 ದಿನಗಳು |
| ಎಲೆಕೋಸು | ಗಿಡ ಹೇನು | 15 | 75 | 500-600 | 7 ದಿನಗಳು |
| ಭೆಂಡೆ | ಗಿಡ ಹೇನು | 15 | 75 | 500-600 | 3 ದಿನಗಳು |

**ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಈ ಲೇಬಲ್/ ಕರಪತ್ರ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.** ಈ ಉತ್ಪನ್ನ ಜೇನು ನೊಣಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಸಕ್ರೀಯವಾಗಿರುವ ದಿನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.

**ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ : ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣ :** ನ್ಯಾಪ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫೂಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನ್ಯಾಪ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನ್ಯಾಪ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೀ – ಎಚ್‌ಟಿಪಿ ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್. **ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆ :** 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದ ಬರಿದಾದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪಶುಗಳ ಮೇವಿನಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿರಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ. 3. ಸಿಂಪರಣಾ ತುಂತುರು ಶ್ವಾಸದೊಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸಿರಿ. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಸಿಂಪಡಿಸಿರಿ 4. ಸಿಂಪರಣೆಯ ನಂತರ ಕಲ್ಮಶಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಶರೀರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. 5. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏನನ್ನೂ ಕುಡಿಯ ಬೇಡಿ. ತಿನ್ನ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಜಗಿಯಬೇಡಿ. 6. ಮಿಶ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂರಕ್ಷಕ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿರಿ. **ಸಸ್ಯ ವಿಷಕಾರಿತ್ವ:** ಹೊಲದ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಉತ್ಪನ್ನವು ಸಸ್ಯ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ. **ವಿಷತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು :** ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ತಲೆ ನೋವು, ತಲೆ ಸುತ್ತು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. **ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ :** 1. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನುಂಗಿದ್ದರೆ ಗಂಟಲಿಗೆ ಕಚಗುಳಿ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೆಪಿಸಿರಿ. ರೋಗಿಯು ಮುರ್ಛಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೆಪಿಸಬೇಡಿ. 2. ಬಟ್ಟೆಬರೆಗಳು ಅಥವಾ ತ್ವಚೆಯು ಕಲ್ಮಶನೊಂಡಿದ್ದರೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಳಚಿರಿ ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಧಾರಾಳ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲ್ಮಶಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ತನಕ ಧಾರಾಳ ಸಲ್ಯಾನ್/ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿರಿ. 4. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಒಳ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧಗಾಳಿಗೆ ಒಯ್ಯಿರಿ. **ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ :** ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ ವಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿರಿ. **ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಂಟೈನರ್‌ನ ವಿಸರ್ಜನೆ :** 1. ಬರಿದಾದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಡೆಯ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನವಸತಿಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಹುಗಿಯಬೇಕು. 2. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳ ಮರು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟರಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ತೊಳೆದ ನೀರು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸ ಬೇಕು. **ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು :** 1. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವ ಕೋಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರ ಪಡಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. 2. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳಕು ಇರಬೇಕು. ಶುಷ್ಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಗಾಳಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಬೆಯಿಂದ ಮಲಿನವಾಗದಂತಿರಲು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು.

**ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ**

| | |
|---|---|
| ಎಸೆಟ ಮಿಪ್ರಿಡ್ ಸ.ಘ | 20.000% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು |
| ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಡೆಟಿಸೈಲ್ ಬೆನ್‌ಝೀನ್ ಸಲ್ಫೋನೆಟ್, ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಕಾಲೇಟ್ | 04.500% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು |
| ಸೋಡಿಯಂ ಸಿಟ್ರೇಟ್, ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ | 30.000% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು |
| ಕ್ಯಾಲ್ಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಾಸ್ಪೇಟ್ ಡೈ ಹೈಡ್ರೇಟ್ | 00.100% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು |
| ಕಲರಿಂಗ್ ಏಜಂಟ್ (ಬ್ರಿಲ್ಲಿಂಟ್ ಬ್ಲೂ) | 00.050% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು |
| ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಮೊನೊ ಹೈಡ್ರೇಟ್ | ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು |
| ಒಟ್ಟು | 100.000% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು |

''ಬರಿದಾದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳನ್ನು ಪುನ: ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.''

ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರು: **ಗಾರ್ಡ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್**
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸು : 48, ಹಿಲ್ ರೋಡ್, ಬಾಂದ್ರಾ (ಪ), ಮುಂಬಯಿ-400 050, ಇಂಡಿಯಾ.
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಗ್ರೋಥ್ ಸೆಂಟರ್, ಫೆಜ್ 2, ಸಾಂಬಾ, ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ್ - 184121

# پولار
ایسیٹامیپرائیڈ 20% ایس پی
(جراثیم کُش)

تریاق: کوئی مخصوص تریاق معلوم نہیں ہے۔ علامت کے مطابق علاج کریں

ایسیٹامیپرائیڈ 20% ایس پی ایک گھُل جانے والی سفوفی فارمیولیشن ہے جس میں 20% فعال اجزاء ایسیٹامیپرائیڈ موجود ہے۔ ایسیٹامیپرائیڈ 20% ایس پی کپاس، مرچی گوبھی اوکرا اور چاول میں چوسنے والے کیڑے مکوڑوں کو قابو میں کرنے کیلئے ایک بہت ہی اثردار سرائیتی جراثیم کُش ہے۔

**سفارش :**

| فصل (فصلیں) | کیڑے کے عام نام | مقدار فی ایکڑ: اے۔ آئی۔ (گرام) | فارمیولیشن (گرام) | محلول (لیٹر) | آخری چھڑکاؤ کے بعد سے فصل کی کٹائی تک انتظار کی مدت |
|---|---|---|---|---|---|
| کپاس | اینڈس | 10 | 50 | 500-600 | 15 دن |
| | جیسڈس | 10 | 50 | 500-600 | |
| | وہائٹ فلائیز | 20 | 100 | 500-600 | |
| مرچی | تھرپس | 10-20 | 50-100 | 500-600 | 3 دن |
| | براؤن پلانٹ ہوپرس (بی پی ایچ) | 10-20 | 50-100 | 500-600 | 7 دن |
| گوبھی | اینڈس | 15 | 75 | 500-600 | 7 دن |
| اوکرا | اینڈس | 15 | 75 | 500-600 | 3 دن |

**اس لیبل / ورقئے میں بیان کردہ فصل کے علاوہ دیگر فصلوں میں استعمال نہ کریں۔ پروڈکٹ شہد کی مکھیوں کیلئے زہریلا ہے اسی لئے دن کی فعّال فوریجنگ مدت کے دوران چھڑکاؤ نہیں کرنا چاہئے۔**

**استعمال کی ہدایت :** پودے کی حفاظت کے آلات : نیپ سیک اسپرئیر، فوٹ اسپرئیر، کمپریشن نیپ سیک اسپرئیر، کمپریشن نیپ سیک بیٹری اسپرئیر اور ایسپی —— ایچ ٹی پی پاور اسپرئیر۔ **احتیاط :** 1. کھانے پینے کی چیزوں، کھانے پینے کی چیزوں کے خالی کنٹینروں اور جانور کے چارے سے دور رکھیں۔ 2. منہ، آنکھوں اور جلد کے رابطے میں آنے دیں۔ 3. چھڑکاؤ کی بوچھار کو سانس کے ذریعے جانے سے دینے سے بچائیں، ہوا کے رُخ پر چھڑکاؤ کریں۔ 4. چھڑکاؤ کے بعد آلودہ کپڑوں اور جسمانی حصوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ 5. چھڑکاؤ کے دوران نہ سگریٹ نوشی کریں، نہ کچھ پئیں کھائیں اور نہ ہی کچھ چبائیں۔ 6. مکس کرنے اور چھڑکاؤ کرنے کے دوران پورے حفاظتی لباس پہنیں۔ **پودوں کیلئے زہرآلودگی :** کھیت کی سفارش کے مطابق استعمال کرنے پر یہ پروڈکٹ پودے کیلئے زہرآلود نہیں ہے۔ **زہر چڑھنے کی علامات :** متلی، قے، سردرد، چکر اور پیٹ میں درد ہوسکتا ہے۔ **ابتدائی تدارک :** 1. اگر نگل لیا جائے تو حلق میں اُنگلی ڈال کر قے کروائیں۔ جب تک قے صاف نہ ہوجائے تب تک قے کرواتے رہیں۔ اگر مریض بدحواس ہو تو قے نہ کروائیں۔ 2. اگر کپڑے اور جلد آلودہ ہوجائیں تو کپڑے اُتار دیں اور جلد کو خوب صابن اور پانی سے دھوئیں۔ 3. اگر آنکھیں آلودہ ہوجائیں تو قریب 10 تا 15 منٹوں تک آنکھوں کو سالائن / صاف پانی سے خوب دھوئیں۔ 4. اگر سانس کے ذریعے اندر چلا جائے تو مریض کو تازہ ہوا میں باہر لے جائیں۔ **تریاق :** کوئی مخصوص تریاق معلوم نہیں ہے۔ علامات کے مطابق علاج کریں۔ **استعمال کردہ کنٹینر کو برباد کرنا :** 1. خالی کنٹینروں کو آبادی سے توڑا اور دفن کردیا جائے۔ 2. استعمال کردہ کنٹینروں اور پیکیج کو اُن کے دوبارہ استعمال سے بچانے کیلئے باہر نہیں رکھ چھوڑنا چاہئے۔ 3. پیکیج یا فاضل مادّے اور مشین سے نکلنے والی دُھلن کو ایسے محفوظ طریقے سے ضائع کرنا چاہئے کہ جس سے ماحول اور پانی کو آلودہ ہونے سے بچایا جائے۔ **ذخیرہ اندوزی کی شرائط :** 1. جراثیم کُش رکھے جانے والے پیکیجیز کو دیگر چیزوں کو رکھے جانے کیلئے استعمال کردہ کمروں یا مقامات سے الگ دوسرے کمروں یا مقامات میں رکھا جانا چاہئے یا الگ سے الماری میں تالہ بند رکھنا چاہئے جس کا انحصار جراثیم کُش کی مقدار اور قسم پر ہے۔ 2. جراثیم کُش رکھے جانے والے کمرے یا مقامات روشن، بہتر تعمیرشدہ، خشک، ہوادار اور وسیع و عریض ہونے چاہئے تاکہ بھاپ کی آلود سے بچا جائے۔

کیمیائی اجزائے ترکیبی :

| | |
|---|---|
| ایسیٹامیپرائیڈ اے۔ آئی۔ | 20.000% وزن / وزن |
| سوڈیئم ڈوڈیکائیل بینزین سلفونیٹ کا امتزاج، سوڈیئم سلفیٹ اور سوڈیئم الکائیلیٹ | 04.500% وزن / وزن |
| سوڈیئم سٹریٹ، ڈی ہائیڈریٹ | 30.000% وزن / وزن |
| کیلشئیم ہائیڈروجن فوسفیٹ ڈی ہائیڈریٹ | 00.100% وزن / وزن |
| کلرنگ ایجنٹ (بریلینٹ بلیو) | 00.050% وزن / وزن |
| لیکٹوس مونوہائیڈریٹ | کیو۔ ایس۔ |
| کُل | 100.000% وزن / وزن |

**خالی کنٹینر کو دوبارہ استعمال کرنا خطرناک ہے۔**

تیارکردہ اور تجارت کردہ بہ ذریعہ:
**گھارڈا کیمیکلس لمیٹیڈ**
رجسٹرڈ آفس : 48، ہل روڈ، باندرہ (مغرب)، ممبئی - 050 400۔ انڈیا۔
فیکٹری : انڈسٹرئیل گروتھ سینٹر، فیز II، سامبا، (جے اینڈ کے) - 184121۔

# DIRECTION FOR USE

**FOR AGRICULTURAL USE**

**कृषि उपयोग के लिए**

**Read Leaflet Before Use**

**इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।**

**POLAR®**

Acetamiprid 20% SP
(Insecticide)

**पोलर**

**ऐसिटामिप्रिड २०% एस.पी.**
(कीटनाशक)

Manufactured & Marketed by:
**GHARDA CHEMICALS LIMITED**
Regd. Office: 48, Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400 050. INDIA.
Factory : Industrial Growth Centre, Phase II, Samba, (J&K)- 184121.

निर्माता और विक्रेता:
**घरडा केमिकल्स लिमिटेड**
पंजी.कार्यालय: ४८, हिल रोड, बांद्रा (प.), मुंबई-४०००५०. भारत.
फैक्टरी : इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, फेज २, साम्बा, जम्मू-कश्मिर - १८४१२१.

For any complaints, contact Customer Care Executive at Gharda Chemicals Limited, Gharda House, 48, Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400 050. INDIA.
**Tel.: 022 26551988/66265999,**
**Email: consumercare@gharda.com;**

® - Registered Trademark of Gharda Chemicals Limited



J.09.24-01