SILKY™
Thiamethoxam 30% FS
Systemic Insecticides

Read Leaflet Before Use.
Thiamethoxam 30% FS is broad spectrum systemic insecticide that is well suited for seed treatment used to control early season sucking pests. Recommended as seed treatment to control jassids, aphids and whitefly in Cotton, shoot fly on Sorghum and Maize, termites in Wheat, jassids in Okra, thrips, GLH and whorl maggot in Rice, Jassid and thrips in Sunflower, stem fly in Soybean and thrips in Chilli crop. Due to its fast action on sucking pest, it limits the transmission of leaf curl virus.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pests	Dosage/Ha A.I. (gm per kg seed)	Dosage/Ha Formulation (ml. per kg seed)	Dosage/Ha Dilution in Water (Ltr.)	Waiting Period between last spray to harvest (days)	Re-entry after each application (in hours)
Cotton	Jassids, Aphids, Whiteflies	3	10	-	This is used as seed dresser	-
Sorghum	Shoot fly	3.0	10.0	-	-	-
Okra	Jassid	1.7	5.7	-	-	-
Maize	Shoot Fly	2.4	8.0	-	-	-
Wheat	Termites	1.0	3.3	-	-	-
Rice	Thrips, GLH, Whorl Maggot	0.9	3.0	-	-	-
Sunflower	Jassid, Thrips	3.0	10.0	-	-	-
Chilli	Thrips	2.1	7.0	-	-	-
Soybean	Stem fly	3.0	10.0	-	-	-

SHAKE WELL BEFORE USE

Direction of Use: For small lots, mix the required quantity of Thiamethoxam 30% FS with 10-20ml of water for each kg of seed to be treated. Add the slurry to the seed and rotate or stir the container (Plastic drum or bag) until the seeds are uniformly covered (usually less than a minute).

It is recommended for application as slurry with continuously operating commercial seed dressing equipment. For preparation of slurry, proceed as follows: 1. Put ½ of the required water to the mix tank. 2. Add the required quantity of Thiamethoxam 30% FS while stirring continuously. 3. Allow the product to disperse. 4. Switch the agitation system or stir manually. 5. Top up with the remaining volume of water. 6. Maintain agitation of the slurry during the whole time of use. 7. The slurry has to be used with 24 hours after preparation.

Application Procedure: 1. Prepare this slurry as descried. 2. Fill the seed into the receptacle. 3. Start mixing the seed. 4. Apply the required amount of slurry by pouring onto the mixing seed. 5. Mix for about 30 seconds to one minutes to achieve a homogenous treatment. An extended mixing will lead to abrasion and dust forming.

Time of Application:

Precaution: Do not use cooking utensils for preparing slurry. Use stick for stirring the slurry solution. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Avoid inhalation of fog and vapours. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Wear protective clothing, mask goggles and boots, while mixing. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes.

Symptoms of Poisoning: Poisoning may cause symptoms of decrease in spontaneous movement, toxic convulsion and ptosis.

First Aid: Remove the affected person to a well-ventilated area or fresh air and protect him from undercooling. IN CASE OF SKIN CONTACT: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. IN CASE OF EYE CONTACT: Rinse eyes with clean water for several minutes. IN CASE OF INGESTION: Repeatedly administer medical charcoal in a large quantity of water. NOTE: Never give anything by mouth to an unconscious person. Do not induce vomiting.

Antidote: No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy.

Phytotoxicity: No phytotoxic if applied as per recommendation.

Disposal of used container: 1. Packages or surplus materials and washings from the machines and containers should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions: 1. The packages containing the Insecticide shall be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premised used for storing other articles particularly articles of food or shall a kept in separate almirahs under lock and key. 2. The room or premises meant for storing the insecticides shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition:

Thiamethoxam a.i.	30.00% w/w
Copolymer of butanol	4.30% w/w
Glycerine	5.10% w/w
1,2-Benzisothiazole-3-one	0.20% w/w
Monazo dye (irgalith Red C2B)	3.40% w/w
Polyethylene glycol	2.60% w/w
Water	QS% w/w
Total	100.00% w/w

Caution: Not to be used on crops other than those prescribed on label and leaflets. Destroy the container after use as directed on leaflet.

" DANGEROUS TO RE USE EMPTY CONTAINER "

सिल्की
थायामेथोक्साम 30% एफ एस
(अंतप्रवाही कीटनाशक)

उपयोग से पहले लीफलेट पढ़े।
थायामेथोक्साम 30 प्रतिशत एफ एस एक बहुउपयोगी अंतरप्रवाही कीटनाशक है जो बीज उपचार करने से फसल के आरंभ में आने वाले चूषक कीटों को नियंत्रित करती है। इसकी आवश्यक मात्रा कपास की फसल में होने वाले कीट जैसे तेला, माहु और सफेद मक्खी ज्वार व मक्का की प्ररोह मक्खी, गेहूँ के दीमक, भिंडी के तेला, धान के चुरदा, हरा पती का फुदका व चक्रीय मेगोट, सूरजमुखी के तेला व चुरदा, सोयाबीन के तना मक्खी तथा मिर्च के चुरदा के बीज उपचार द्वारा नियंत्रण के लिए सिफारिश की जाती है। चूषक कीटों पर शीघ्र असर होने के कारण यह पत्ता मोड़क रोग होने से रोकती है।

उपयोग:

फसल	कीट के नान	प्रति हेक्टेअर मात्रा सं. तत्व (ग्रा. प्रति किग्रा. बीज)	संरचना (नि.ली. प्रति कि.ग्रा. बीज)	पानी की मात्र (ली.)	अंतिम छिड़काव तथा फसल कटने के बीच अंतराल (दिनें)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
कपास	तेला, माहो, सफेद मक्खी	3.0	10.0	–	यह बीज उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है	–
ज्वार	प्रोह मक्खी	3.0	10.0	–	–	–
भिंडी	तेला	1.7	5.7	–	–	–
मक्का	प्रोह मक्खी	2.4	8.0	–	–	–
गेहूँ	दीमक	1.0	3.3	–	–	–
धान	चुरदा, हरा पत्ती का फुदका चक्रीय मेगोट	0.9	3.0	–	–	–
सूरजमुखी	तेला, चुरदा	3.0	10.0	–	–	–
मिर्च	चुरदा	2.1	7.0	–	–	–
सोयाबीन	तना म्क्खी	3.0	10.0	–	–	–

उपयोग करने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिलायें

उपयोग के लिए निर्देश: छोटी ढ़ेरी के लिए, इसकी आवश्यक मात्रा को उपचारित किए जाने वाले हर किलो बीज के लिए 10–20 मिली. पानी मिलायें। इस गाढ़े घोल को बीजों के साथ गिलाकर किसी डिब्बें (प्लास्टिक का पीपा या प्लास्टिक की थैली) को अच्छी तरह से तब तक (आम तोर पर एक मिनट से कम) हिलायें जब तक बीज पूरी तरह से थायामेथोक्साम 30 प्रतिशत एफ एस से मिल न जाए। ये सलाह दी जाती है कि थायामेथोक्साम 30 प्रतिशत एफ एस का उपयोग गारे के रूप में किया जाए, जिसके दौरान व्यावसायिक बीजोपचार यंत्र सतत चलाया जाना चाहिए, बनाने की विधि नीचे दी गई है।
1. घोल बनाने की टंकी में जरूरत से आधे मात्रा पानी डालें। 2. निर्धारित मात्रा थायामेथोक्साम 30 प्रतिशत एफ एस का हिलाते हुए मिलाइये। 3. उत्पादन को छितर जाने दें। 4. घोलक प्रणाली का स्विच ऑन करें या हाथ से हिलाकर घोलें। 5. घोल में बचा हुआ पानी मिला दें। 6. घोल का उपयोग करते समय उसे हिलाते रहें। 7. घोल बनाने के उपरान्त उसे 24 घंटे के अन्दर इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

इस्तेमाल का तरीका: 1. ऊपर बताये अनुसार गाढ़ा तैयार करें। 2. बर्तन में बीजों को उलट दें। 3. बीजों को मिलाना शुरू करें। 4. बीजों में घोल की अपेक्षित मात्रा मिलाकर बीजों पर लगने दें। 5. इन्हें करीब 30 सेकेण्ड से एक मिनट तक दें ताकि ये एक रामान रूप रो उपचारित हो जाए। ज्यादा देर तक मिलाने रो बीजों पर रगड़ लगेगी तथा धूल जमने लगेगी।

प्रयोग का समय:

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ: छिड़काव तैयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तन का इस्तेमाल नहीं कीजिए। छिड़काव के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का उपयोग करें। त्वचा को छिड़काव स्पर्श से बचाव के लिए दस्ताने पहनें। सांस के साथ अन्दर लेने और आंखों के सम्पर्क से भी बचें। छिड़काव करते समय सुरक्षात्मक कपड़े जैसे मास्क, चश्मा, बूट्स आदि पहनें। उत्पाद को उठाते, रखते या प्रयोग करते समय खाना, पीना या धूम्रपान नहीं करना चाहिए। कार्य रामाप्त होने के बाद हाथों को राबुन और ढ़ेर सारे पानी से धोएं। पहने हुए कपड़ों को बदल लें और उन्हें अच्छी तरह से धोएं।

लक्षण: विष के लक्षण से शरीर में ढ़ीलापन, मिर्गी जैसे झटके और प्टोसिस हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा: प्रभावित व्यक्ति को प्रदूषित जगह से हवादार कमरें या खुली हवा में ले जाए और तापमान से बचाएं। विष बाधा के लक्षण दिखाइ देने पर तुरंत चिकित्सक को बुलाइए। त्वचा में लगने पर प्रदूषित कपड़ों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। आँखों में चले जाने पर आँखों को कुछ देर तक साफ पानी से अच्छी तरह छपछपाए। निगल जाने पर पानी में मेडिसिनल चारकोल के काफी मात्रा में घोलकर बार बार दें। **सूचना:** कभी भी मूर्छित मरीज को मुँह से कुछ भी नहीं देना चाहिए। उल्टी कराने की कोशिश न करें।

विषनाशक: कोई विशेष प्रतिविष नहीं। लक्षणों के अनुसार उपचार करें।

पौधविशाक्तता: निर्धारित मात्रा अनुसार प्रयोग करने पर पौध विषाक्त नहीं है।

खाली डिब्बों का निपटारा: 1. पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए डिब्बों, बचा हुआ घोल/पदार्थ मशीनों की धोवन और खाली डिब्बों का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें। 2. उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेटों को वैसे ही बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार उनको दुबारा उपयोग किया जा सकता है। 3. डिब्बों/पैकेटों को तोड़मोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए।

संग्रहण की शर्तें: 1. कीटनाशक को डिब्बों को अन्य सामग्री खाने के संग्रहण के लिए उपयोग किए जा रहे कमरों या इमारतों से दूर अलग कमरों या इमारतों में अथवा अलग से ताला बंद आलमारियों में रखना चाहिए। 2. कीटनाशकों के संग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले कमरे या इमारत मजबूत, सूखें प्रकाशित तथा हवादार होने चाहिए तथा उनमें पर्याप्त स्थान होना चाहिए ताकि वाष्प से प्रदूषण न हो सकें।

रासायनिक संरचना:

थायामेथोक्साम स. त.	30.00% भार/भार
ब्युटनोल का कोपालिमर	4.30% भार/भार
ग्लिसरीन	5.10% भार/भार
1,2–बेन्जीसोथैयजोल–3–ओन	0.20% भार/भार
मोनाजो डाय (इरग्लिथ रेड सी 2बी)	3.40% भार/भार
पालीइथिलीन ग्याइकोल	2.60% भार/भार
पानी	पर्याप्त मात्रा % भार/भार
कुल	100.00% भार/भार

चेतावनी: इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। पत्रक पर दिए निर्देश अनुसार उपयोग के बाद खाली डिब्बों को नष्ट करें।

" खाली कंटेनर का दोबारा उपयोग करना खतरनाक है। "

ਸਿਲਕੀ
ਥਾਯੋਮੇਥੋਕਸਾਮ 30% ਐਫ ਐਸ
(ਅੰਤਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।
ਥਾਯੋਮੇਥੋਕਸਾਮ 30% ਐਫ ਐਸ ਇੱਕ ਬਹੁਉਪਯੋਗੀ ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੂਸਕ ਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲਾ, ਮਾਹੂ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਰੋਹ ਮੱਖੀ, ਕਣਕ ਦੇ ਘੁਣ, ਭਿੰਡੀ ਦੇ ਤੇਲਾ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੁਰਦਾ, ਹਰਾ ਪੱਤੀ ਦਾ ਟਿੱਡਾ ਅਤੇ ਚੱਕਰੀ ਮੇਗੋਟ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲਾ ਅਤੇ ਚੁਰਦਾ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਤਨਾ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਮਿਰਚ ਦੇ ਚੁਰਦਾ ਦੇ ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੂਸਕ ਕੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟਕ ਰੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸਤੇਮਾਲ:

ਫ਼ਸਲ	ਕੀਟ ਦੇ ਨਾਂਅ	ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮਾਤਰਾ ਸੰ ਤੱਤ (ਗ੍ਰਾ./ ਕਿ.ਗ੍ਰਾ.ਬੀਜ)	ਸੰਰਚਨਾ (ਮਿਲੀ / ਕਿ.ਗ੍ਰਾ.ਬੀਜ)	ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲੀ)	ਅੰਤਮ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)	ਮੁੜ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਵਧੀ ਹਰੇਕ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਘੰਟੇ)
ਕਪਾਹ	ਤੇਲਾ, ਮਾਹੋ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ	3.0	10.0	–	ਇਹ ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।	–
ਜਵਾਰ	ਪ੍ਰਰੋਹ ਮੱਖੀ	3.0	10.0	–	–	–
ਭਿੰਡੀ	ਤੇਲਾ	1.7	5.7	–	–	–
ਮੱਕੀ	ਪ੍ਰਰੋਹ ਮੱਖੀ	2.4	8.0	–	–	–
ਕਣਕ	ਘੁਣ	1.0	3.3	–	–	–
ਝੋਨਾ	ਚੁਰਦਾ, ਹਰਾ ਪੱਤੀ ਦਾ ਟਿੱਡਾ, ਚੱਕਰੀ ਮੇਗੋਟ	0.9	3.0	–	–	–
ਸੂਰਜਮੁਖੀ	ਤੇਲਾ, ਚੁਰਦਾ	3.0	10.0	–	–	–
ਮਿਰਚ	ਚੁਰਦਾ	2.1	7.0	–	–	–
ਸੋਇਆਬੀਨ	ਤਨਾ ਮੱਖੀ	3.0	10.0	–	–	–

ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਤਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਛੋਟੀ ਢੇਰੀ ਲਈ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਉਪਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਲਈ 10-20 ਮਿਲੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਗਾੜ੍ਹੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡੱਬੇ (ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪੀਪਾ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਥੈਲੀ) ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤਕ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਹਿਲਾਓ ਜਦੋਂ ਤਕ ਬੀਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਯੋਮੇਥੋਕਸਾਮ 30% ਐਫ ਐਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਯੋਮੇਥੋਕਸਾਮ 30% ਐਫ ਐਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਯੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1. ਘੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟੰਕੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। 2. ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਥਾਯੋਮੇਥੋਕਸਾਮ 30% ਐਫ ਐਸ ਦੀ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਾਓ। 3. ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦਿਓ। 4. ਘੋਲਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਵਿੱਚ ਔਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਘੋ ਲਓ। 5. ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। 6. ਘੋਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। 7. ਘੋਲ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ : 1. ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾੜ੍ਹਾ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। 2. ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦਿਓ। 3. ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂਕਰੋ। 4. ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। 5. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਚਾਰਿਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਰਗੜ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਘੂੜ ਜੰਮਣ ਲੱਗੇਗੀ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ:

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ਛਿੜਕਾਅ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨੋ। ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋ। ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਪੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਕ, ਚਸ਼ਮਾ, ਬੂਟ ਆਦਿ ਪਹਿਨੋ। ਉਤਪਾਦ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਸਿਗਰੇਟਨੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਪਾਏ ਹੋਏ ਕਪੜੇ ਬਦਲ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।

ਲੱਛਣ: ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾਪਣ, ਮਿਰਗੀ ਵਰਗੇ ਝਟਕੇ ਅਤੇ ਪਟੋਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਢਲੀ ਚਿਕਿਤਸਾ: ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਿਕਿਤਸਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੋ। ਨਿਗਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨਲ ਚਾਰਕੋਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿਓ। **ਸੂਚਨਾ:** ਕਰਦੇ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾਓ। ਉਸਨੂੰ ਉਲਟੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

ਜ਼ਹਿਰਨਾਸ਼ਕ: ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਹਿਰਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਪੌਦਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ: ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੌਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: 1. ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡੱਬਿਆਂ, ਬਚੇ ਘੋਲ/ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਧੁਆਈ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਰੋ। 2. ਵਰਤੇ ਗਏ ਡੱਬਿਆਂ/ ਪੈਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3. ਡੱਬਿਆਂ/ ਪੈਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ: 1. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਲਗ ਤੋਂ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁੱਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ

ਥਾਯੋਮੇਥੋਕਸਾਮ ਸ.ਤ.	30.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਬਯੁਟਾਨੋਲ ਦਾ ਕੋਪਾਲਿਮਰ	4.30% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਗਲੀਸਰੀਨ	5.10% ਭਾਰ/ਭਾਰ
1, 2 ਬੇਂਜ਼ੀਸੋਥੈਜ਼ੋਲ 3 ਓਨ	0.20% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਮੋਨਾਜ਼ੋ ਡਾਯ (ਇਰਗਲਿਥ ਰੈਡ ਸੀ 2 ਬੀ)	3.40% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਪਾਲੀਇਥਿਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ	2.60% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਪਾਣੀ	ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਕੁਲ	100.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ

ਸਾਵਧਾਨੀ:ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਪਰਚੇ ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ।

''ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।''

સિલ્કી
થાયોમેથોક્સામ 30% એફ એસ
(અંતપ્રવાહી કીટકનાશક)

વાપરતાં પહેલાં પત્રિકા વાંચો.
થાયોમેથોક્સામ 30% એફ એસ એ એક અતિ ઉપયોગી આંતરપ્રવાહી કીટકનાશક છે. જે બિયારણ વાવ્યા પછી શરૂઆતના દિવસોમાં તેને લાગતા ચૂસિયા જીવાતોનો નાશ કરે છે. તેની જરૂરી માત્રા કપાસના પાકમાં થતાં તેલા, માહુ અને સફેદ માખી તથા મકાઈમાં પડતી પ્રરોહ માખી, ઘઉંમાં પડતી ઉધઈ, ભીંડીમાં પડતી તેલા, ધાનની ચૂરદા, લીલી પત્તીની ફૂદકા અને ચક્રીય મેગોટ, સૂરજમુખીના તેલા અને ફુરદા, સોયાબીનની તના માખી તથા મરચામાં ફુરદાની સારવાર દ્વારા નિયંત્રણ માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે. ચૂસિયા જીવાત પર જલ્દી અસર થવાથી તેને પત્તા મોડક (પાંદડા વળી જવાનો) રોગ થતો અટકી જાય છે.

ઉપયોગ:

પાક	જીવાતનું નામ	હેક્ટર દીઠ માત્રા સંરક્ષક તત્વ (ગ્રામ / કિ.ગ્રા.દીઠ)	સંરચના (ગ્રામ) મિલી / કિ.ગ્રા.દીઠ	પાણીની માત્રા (લીટર)	છેલ્લો છંટકાવ તથા પાક લણવા વચ્ચેનો સમય (દિવસ)	પુનઃ પ્રવેશની મુદ્દત પ્રત્યેક છંટકાવ બાદ (કલાક)
કપાસ	તેલા, માહો, સફેદ માખી	3.0	10.0	-	આનો ઉપયોગ બિયારણની ઉપરના આવરણ તરીકે	-
જુવાર	પ્રરોહ માખી	3.0	10.0	-	-	-
ભીંડા	તેલા	1.7	5.7	-	-	-
મકાઈ	પ્રરોહ માખી	2.4	8.0	-	-	-
ઘઉં	ઉધઈ	1.0	3.3	-	-	-
ધાન્ય	ચૂરદા, લીલા પાનની ફૂદકા, ચક્રીય મેગોટ	0.9	3.0	-	-	-
સૂરજમુખી	તેલા, ચૂરદા	3.0	10.0			
મરચાં	ચૂરદા	2.1	7.0			
સોયાબીન	તના માખી	3.0	10.0			

વપરાશ પહેલાં બાટલીને યોગ્ય રીતે હલાવો.

ઉપયોગ માટેનો નિર્દેશ:
નાના જથ્થા માટે બિયારણના એક કિલોગ્રામ દીઠ 10-20 મિલી પાણીની સાથે થાયોમેથોક્સામ 30% એફ એસની જરૂરી માત્રા ભેળવીને મિશ્રણ બનાવો અને તેને પ્લાસ્ટિકના કન્ટેનર (ડ્રમ કે થેલી)માં (સામાન્ય રીતે એકાદ મિનિટ સુધી) હલાવો કે જેથી થાયોમેથોક્સામ 30% એફ એસ અને બિયારણ બધું એકરૂપ થઈ જાય. એવી સલાહ આપવામાં આવે છે કે થાયોમેથોક્સામ 30% એફ એસ નો ઉપયોગ દ્રાવણના રૂપે કરવામાં આવે. આ દરમિયાન વ્યાવસાયિક બીજોપચાર યંત્રને સતત ચલાવતા જાઓ. દ્રાવણ બનાવવાની રીત નીચે મુજબ છે: 1. દ્રાવણ બનાવવાની ટાંકીમાં જરૂરથી અડધું પાણી ઉમેરો. 2. તેમાં થાયોમેથોક્સામ 30% એફ એસની જરૂરી માત્રા હલાવીને ભેળવો. 3. ઉત્પાદનને તેમાં ભેળવવાનું શરૂ કરો. 4. હવે આ મિશ્રણને યંત્ર અથવા તેને હાથથી હલાવો. 5. વધેલું પાણી આ મિશ્રણમાં ભેળવી દો. 6. મિશ્રણનો ઉપયોગ કરતી વખતે તેને હલાવતા રહો. 7. આ દ્રાવણ બનાવ્યા પછી તેનો ઉપયોગ 24 કલાકમાં કરી લેવો.

વપરાશની રીત: 1. ઉપર જણાવ્યા મુજબ દ્રાવણ તૈયાર કરો. 2. પાત્રમાં દ્રાવણને નાખો. 3. તેમાં બિયારણ ભેળવવું શરૂ કરો. 4. આ બિયારણોમાં દ્રાવણની યોગ્ય માત્રા ભેળવી દો. 5. હવે આ મિશ્રણને 30 મિનિટ સુધી રહેવા દો જેથી બધું એકરૂપ થઈ જાય. વધુ સમય હલાવવાથી બિયારણ પર ઘસારો લાગશે તથા તેના પર ધૂળ જામશે.

પ્રયોગનો સમય:

વપરાશકાર માટે સાવચેતીઓ: છાંટવા માટેનું આ દ્રાવણ બનાવવા માટે રાંધવાના વાસણોનો ઉપયોગ કરવો નહી. દ્રાવણને હલાવવા માટે લાકડીનો ઉપયોગ કરો. આ દ્રાવણ હાથ પર ન લાગે તે માટે હાથ પર મોજા પહેરો. આ દ્રાવણને શ્વાસમાં લેવાથી તેમજ આંખોના સંપર્કથી બચો. આ દ્રાવણનો છંટકાવ કરતી વખતે માસ્ક, ચશ્માં, બૂટ વગેરે પહેરો. આ દવા લઈ જતી વખતે અને તેનો ઉપયોગ કરતી વખતે કશું ખાવું કે પીવું ન જોઈએ તમજ ધૂમ્રપાન પણ ના કરવું જોઇએ. કામ પત્યા પછી સાબુ અને પાણીથી હાથ ધુઓ. પહેરેલાં કપડાં બદલી નાખો અને તેને સારી રીતે ધોઈ નાખો.

વિષના લક્ષણ: વિષના લક્ષણથી શરીર ઢીલું પડી જાય છે તેમજ વાઈ આવતી હોય તેમ થાય છે.

પ્રાથમિક ઉપચાર: પ્રભાવિત વ્યક્તિને પ્રદુષિત જગ્યાએથી દૂર હવાઉજાસ ધરાવતા ઓરડા અથવા ખુલ્લી જગ્યામાં લઈ જાઓ અને તાપમાનથી બચાવો. ઝેર ચઢવાંનાં લક્ષણો જણાતા તરત ડૉક્ટરને બોલાવો. ત્વચાના સંસર્ગમાં આવતાં દુષિત કપડાંને કાઢી નાંખો તથા શરીરના પ્રભાવિત હિસ્સાઓને સાબુ અને પાણી વડે સારી રીતે ધોઈ નાંખો. આંખોમાં જવાની સ્થિતિમાં આંખોને થોડો સમય ચોખ્ખાં પાણી વડે સારી રીતે વીંછળો. ગળી જવાની સ્થિતિ સર્જાતા પાણીમાં મેડિસિનલ ચારકોલને ખૂબ વધુ માત્રામાં મિશ્રિત કરીને વારંવાર આપો. **સૂચના:** બેભાન દર્દીને ક્યારેય કંઇપણ મોં વાટે આપવું જોઇએ નહીં. ઉલટી કરાવવાનો પ્રયાસ કરશો નહીં.

વિષનાશક: ઝેરનું કોઈ ખાસ મારણ નથી. આથી લક્ષણો મુજબ સારવાર કરવી. **છોડની વિષયુક્તતા:** જરૂરી માત્રામાં ઉપયોગ કરવાથી છોડને ઝેર ચઢતું નથી.

ખાલી ડબ્બાંઓનો નિકાલ: 1. પર્યાવરણને પ્રદુષિત થતું બચાવવા ડબ્બાં, બાકી બચેલાં દ્રાવણ/પદાર્થ, મશીનમાંથી નીકળેલા ધોવાણ અને ખાલી ડબ્બાંઓનો નિકાલ સુરક્ષિત સ્થળે કરો. 2. ખાલી ડબ્બાં/પેકેટોનો ફરીથી ઉપયોગ થઈ શકે તે રીતે તેમને ખુલ્લામાં ત્યજી દેવા જોઇએ નહીં. 3. ડબ્બાં/પેકેટોને તોડીને વસતીથી દૂર જમીનમાં દાટી દેવા જોઇએ.

સંગ્રહની શરતો: 1. જીવાતનાશકના ડબ્બાઓને અન્ય ખાવા-પીવાની ચીજો રાખવાના રૂમ અને મકાનોથી દૂર અલગ રૂમ અને મકાનમાં અથવા અલગ તાળાબંધ કબાટમાં રાખવા જોઈએ. 2. જીવાતનાશકના ડબ્બાઓને રાખવાના રૂમ અને મકાન મજબૂત, સૂકાં, પ્રકાશિત અને હવાઉજાસવાળાં હોવાં જોઈએ તથા તેનું વરાળના રૂપે હવા પ્રદૂષણ ન થાય તે માટે પૂરતી જગ્યા હોવી જોઈએ.

રાસાયણિક સંરચના

થાયોમેથોક્સામ સ. ત.	30.00% ભાર/ભાર
બ્યુટનોલનું કોપાલીમર	4.30% ભાર/ભાર
ગ્લિસરીન	5.10% ભાર/ભાર
1,2-બેંઝીસોથેયઝોલ-3-ઓન	0.20% ભાર/ભાર
મોનાઝો ડાય-(એરિગ્લિથ સી 2 બી)	3.40% ભાર/ભાર
પોલીથીલીન ગ્યાઈકોલ	2.60% ભાર/ભાર
પાણી	જરૂરી માત્રા% ભાર/ભાર
કુલ	100.00% ભાર/ભાર

સાવધાની: લેબલ અને પત્રિકાઓ પર સૂચવવામાં આવેલ સિવાયના પાકો પર ઉપયોગ ન કરવો. પત્રિકા પરના નિર્દેશ મુજબ ઉપયોગ કર્યા પછી કન્ટેનરનો નાશ કરો.

''આલી ડબ્બા ફરીથી ઉપયોગ કરવાનું અતરનાક છે.''

سلکی
تھیومےتھوکسام 30% ایف ایس
[illegible]

استعمال سے پہلے ساتھ میں فراہم کی گئی ہدایات کی پرچی پڑھ لیں۔
تھیومےتھوکسام اےآئی 30% ایف ایس بہت سے جرثوموں کےخلاف ایک باضابطہ دودکش ہےجوبیج کے معالجہ کے لئےانتہائی مؤثرہےاورجس کا استعمال فصل کےابتدائی دنوں میں رس چوسنے والے کیڑوں کوکنٹرول کرنےکےلئےکیا جاتا ہے- اس کےاستعمال کی سفارش کپاس میں لگنےوالےکیڑوں جیسےتیلا،ماہواورسفید مکھی،جواراورمکئی میں شوٹ مکھی، گیہوں میں دیمک، بھنڈی میں تیلا، دھان میں چردہ، ہری پتی کا کیڑااورگول گچھےکامیگوٹ، سورج مکھی میں تیلااورہری چوس، سویابین میں تنامکھی اورمرچی میں ہری چوس کوکنٹرول کرنےکےلئےکی جاتی ہے-

سفارش :

فصل	کیڑے کا عام نام	خوراک/ہکٹر اے آئی (گرام فی کیلوگرام بیج)	گھول (ملی لیٹر فی کیلوگرام بیج)	نی میں گھول (لیٹر)	آخری اسپرے اورکٹائی کے دوران انتظار کی مدت (دنوں میں)	دوبارہ داخلے کی مدت ہرایک چھڑکاؤ کے بعد (گھنٹے)
کپاس	تیلا،ماہواور سفید مکھی	3.0	10.0	-	اسےبیجوں کےمددگار کےطورپراستعمال کیا جاتاہے	-
جوار	شوٹ مکھی	3.0	10.0	-	-	-
بھنڈی	تیلا	1.7	5.7	-	-	-
مکئی	شوٹ مکھی	2.4	8.0	-	-	-
گیہوں	دیمک	1.0	3.3	-	-	-
دھان	چردہ،ہری پتی کا کیڑا اورگول گچھےکامیگوٹ	0.9	3.0	-	-	-
سورج مکھی	تیلااورہری چوس	3.0	10.0	-	-	-
مرچ	ہری چوس	2.1	7.0	-	-	-
سویابین	تنا مکھی	3.0	10.0	-	-	-

استعمال سے پہلے اچھی طرح سے ہٹ ہلا

استعما ل کے لئےہدایت: چھوٹی کھیپ کے لئے، تھیومےتھوکسام 30% ایف ایس کی ضروری مقدارکومعالجہ کےلئےدرکارفی کیلوبیج میں10سے20 ملی لیٹرپانی ملائیں — محلول کو بیج میں ڈال دیں اوربرتن (پلاسٹک کی بالٹی یا بیگ)کوہلائیں یہاں تک کہ محلول پورے بیج پرپہنچ جائے(عام طورپر ایک منٹ سے بھی کم)- محلول کےمسلسل استعمال کےلئےکمرشیل سیڈ ڈریسنگ آلےکےاستعمال کی سفارش کی جاتی ہے- گیلا محلول بنانےکےلئےیہ طریقہ اختیار کریں (1) درکارپانی کا 1/2 حصہ گھول کے ٹینک میں ڈالیں (2) پھر تھیومےتھوکسام اےآئی 30% کی درکارمقدارکواس میں ڈال کے اچھی طرح ہلائیں (3) پروڈکٹ کو پھیل جانےکا موقعہ دیں (4) گھمانے کی مشین کو چالوکریں یا ہاتھوں سے ہی خوب گھمائیں (5) پھربقیہ پانی کواوپرسےڈال دیں (6) محلول کو استعمال کے وقت برابرگھماتے رہیں (7) تیارکرنےکےبعد اس محلول کو24 گھنٹےکےاندراندر استعمال کریں-

طریقہ استعمال : 1- اوپربیان کردہ طریقوں سےاس محلول کوتیارکریں 2- بیج کو برتن میں ڈال دیں 3- بیج کوملانا شروع کریں 4- محلول کی درکارمقدارکوملانےگئےبیج میں ڈال دیں 5- یکسا ں معالجہ کے لئے اسے 30 سکنڈ سےایک منٹ تک برابرملاتےرہیں — اس سے زیادہ ملانے سےرگڑاورمٹی بنےگی-

استعمال کا وقت :-

احتیاط : گھول تیارکرنےکے لئےکھانےپینےکا برتن استعمال نہ کریں — گھول کوہلانےکےلئےلکڑی کا استعمال کریں - اسےآنکھ کپڑوں اورجلد پرنہ لگنے دیں — ملاتے وقت اسےاوراس کی بھاپ کو نگلنےسےبچیں- جلدپرلگنےسےبچنےکےلئےہاتھوں میں دستانےپہنیں- گھولتےوقت پورے حفاظتی کپڑے پہنیں پوراچشمہ لگائیں اورجوتےپہنیں- اسپرے کرتےوقت پورے حفاظتی کپڑے پہنیں - نیزاسپرےکرتےوقت سگریٹ نوشی، کھانے پینےاورکسی چیزکوچبانےسےبچیں — کام ختم ہونے کےبعد ہاتھوں کوصابن سےاچھی طرح دھلیں اورکپڑے بدل لیں اورآلودہ کپڑوں کودھوڈالیں-

علامات : زہرکےاثرات کی وجہ سےاس کی نقل وحرکت پرفوری اثرپڑسکتا ہے، تشنج ہوسکتا ہے یااعضاء ڈھیلےپڑسکتے ہیں —

ابتدائی علاج: متاثرہ شخص کوآلودہ مقام سے ہوادار کمرے یا کھلی ہوا میں لے جائیں اوردرجہ حرارت سے بچائیں۔زہر کی علامات نظر آنے پرفوراًڈاکٹرکو بلائیے۔جلد متاثر ہونے پر آلودہ کپڑوں کو اتاردیں اورجسم کے متاثرہ حصے کوصابن اور پانی سے اچھی طرح سے دھوئیں۔آنکھوں میں چلے جانے پرآنکھوں کوکچھ دیر تک صاف پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔دوانگل جانے پرمیڈیسنل چارکول کی کافی مقدار پانی میں گھول کر بار بار دیں۔ اطلاع: بیہوش مریض کوکبھی بھی منہ کے ذریعے کچھ نہیں دینا چاہئے۔الٹی کرانے کی کوشش نہ کریں۔

تریاق: اس کا کوئی خاص تریاق نہیں ہے- علامات کےمطابق علاج کریں-

پودوں کےلئےسمیت : اگراوپربتائےہوئےطریقوں سےاستعمال کی جائےتواس میں کوئی سمیت نہیں ہے-

خالی ڈبوں کا نمٹارہ: 1. ماحول کا آلودہ ہونے سے بچانے کیلئے خالی ڈبوں، بچاہواسیال/مادہ، مشینوں کادھلاپانی اورخالی ڈبوں کانمٹارہ محفوظ جگہ پرکریں۔ 2. استعمال کئے گئےڈبوں/پیکٹوں کویونہی باہرنہ چھوڑنا چاہئے۔اس طرح سےان کا استعمال دوبارہ کیا جاسکتا ہے۔ 3. ڈبوں پیکٹوں کوتوڑمروڑکر آبادی سےدورزمین میں گاڑدیناچاہئے۔

ڈبوں کواسٹورکرنا — 1- تیارشدہ مواد کےڈبوں کوان کےاصل ڈبوں میں الگ کمرے یا الماری میں کھانےپینےکی چیزوں سےدورتالے چابی کےاندررکھیں — اسے بچوں ، گھریلوجانوروں اور پالتو کتوں کی دسترست سےدوررکھیں — 2- ان دودکش مواد کوخشک، روشن ، کشادہ اورہوا دارجگہ میں رکھیں تاکہ اس کی بھاپ سےآلودگی نہ پیدا ہو-

کیمیائی ترکیب :

تھیومےتھوکسام اےآئی	30.00% w/w
بیٹانول کاکوپلمر	4.30% w/w
گلسرین	5.10% w/w
1,2-بنزی سوتھیازون– 3 اون	0.20% w/w
مونازوڈای (ارگالتھ ریڈ سی 2 بی)	3.40% w/w
پولی تھلین گلائی کول	2.60% w/w
پانی	کیو ایس % ڈ بلو/ڈ بلو
کل:	100.00% w/w

انتباہ : ہدایات کی پرچی / لیبل میں درج فصلوں کے علاوہ کسی اور فصل پر اس دواکا استعمال نہ کریں۔

خالی کنٹینر کو دوبارہ استعمال کرنا خطرناک ہے۔

DIRECTION FOR USE

FOR AGRICULTURAL USE
कृषि उपयोग के लिए

Read Leaflet Before Use
इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

SILKY™
Thiamethoxam 30% FS
(Systemic Insecticide)

सिल्की
थायामेथोक्साम ३०% एफ एस
(अंतप्रवाही कीटनाशक)

Marketed by:
GHARDA CHEMICALS LIMITED
Regd. Office: Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400 050. INDIA

Manufactured by:
Saraswati Agro Chemicals (India) Pvt. Ltd.
Regd. Office: Village Dao Majra, Kharar Kurali Road, Distt. S.A.S. Nagar (Mohali), Punjab - 140301.
Factory: Lane-2, Phase-1, SIDCO Industrial Complex, Bari Brahmana, Distt. Jammu-181133 (J&K)

विक्रेता: घरडा केमिकल्स लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: घरडा हाउस , ४८ हिल रोड, बांद्रा (प), मुंबई – ४०० ०५०. भारत

निर्माता : **सरस्वती एग्रो केमिकल्स (इंडिया) प्रा. लि.**
रजि. ऑफिस: गाँव दाव माजरा, खरड़ कुराली रोड, जिला एस.ए.एस. नगर (मोहाली), पंजाब–१४०३०१.
फैक्ट्री: लेन–२, फेस–१, सिडको इण्डस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स, बारी ब्राम्हना, जिला जम्मू–१८११३३ (जे एण्ड के)

For any complaints, contact Customer Care Executive at Gharda Chemicals Limited, Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400050. INDIA
Tel.: 022 66265998 / 66265999
Email: consumercare@gharda.com
Website: www.gharda.com

TM-Trademark of Gharda Chemicals Limited

JM.03.26-01

सिल्की

थायामेथोक्साईम 30% एफ एस

(अंतप्रवाही कीटकनाशक)

वापरण्यापूर्वी माहिती पत्रक वाचा.

थायामेथोक्साम 30% एफ एस बहुउपयोगी अंतरप्रवाही कीटकनाश्क आहे जे बीज उपचार करण्यासाठी सुरूवातीला येणारी चूषक कीटकांना नियंत्रित करते. याची आवश्यक मात्रा कापसाच्या पिकांवर होणारे कीटक जसे तेला, मावा आणि पांढरी मासी ज्वारी व मका यांच्या तसेच मासी, गव्हातील उधळी, भेंडीची तेला, धानातील चुरदा, सोयाबीनमधील तना मासी आणि मिरचीवरील चुरदा यांच्यावरील उपचारासाठी सिफारस करण्यात येते. चूषक कीटकांवर शीघ्र असर करत असल्याने पाने मोडणाऱ्या रोगावर नियंत्रण करते.

उपयोग:

पीक	कीटकांचे नाव	प्रति हेक्टर मात्रा			अंतिम फवारणी तथा पीक कापण्याच्या काळात अंतर (दिवस)	पुन:प्रवेशाचा कालावधी प्रत्येक फवारणी नंतर (तास)
		स.तत्व (ग्रा. प्रति किग्रा.बीज)	संरचना (मि.ली प्रति कि.ग्रा. बीज)	पाण्याचे प्रमाण (ली.)		
कपूस	तेल मावा, पांढऱ्या माशा	3.0	10.0	-	हे बीज उपचाराकरिता प्रयोग केले जाते	-
ज्वारी	प्ररोह माशी	3.0	10.0	-	-	-
भेंडी	तेला	1.7	5.7	-	-	-
मका	प्ररोह माशी	2.4	8.0	-	-	-
गहू	उधळी	1.0	3.3	-	-	-
धान	चुरदा, हिरव्या पानावरील कीड चक्रीय मेगोट	0.9	3.0	-	-	-
सूरजमुखी	तेला, चुरद	3.0	10.0	-	-	-
मिरची	चुरदा	2.1	7.0	-	-	-
सोयाबीन	तना माशी	3.0	10.0	-	-	-

वापरण्यापूर्वी बाटली व्यवस्थित हलवा

उपयोगाचे निर्देश: लहान ढेरीकरिता आवश्यक मात्रेत उपचारित करण्यात येणाऱ्या एक किलो बिजाकरिता 10.20 मिली, पाणी मिसळा. हे मिश्रण विजासोबत मिसळून कोणत्याही डवे (प्लास्टिकवा पीपा किंवा प्लास्टिकची थैली) यात चांगल्या, प्रकारे मिसळा (एक मिनिटापेक्षा कमी हलवा) बीज पूर्णपणे थायामेथोक्साम 30 टक्के एफ एस मध्ये मिसळेपर्यंत हलवा. थायामेथोक्साम 30 टक्के एफ एसचा उपयोग गारा म्हणून करण्यात यावा असा सल्ला देण्यात येतो. या काळात व्यावसायिक बिजोपचार यंत्र सतत चालविले जावे, तयार करण्याची विधी खाली दिली आहे. 1. मिश्रण तयार करण्याच्या टाक्यात गरजेच्या अर्धे पाणी टाकावे. 2. निर्धारित मात्रा थायामेथोक्साम 30 टक्के एफ एस चे मिश्रण घोळून मिसळावे. 3. उत्पादन चांगले ढवळून घ्यावे. घोळण्याचा प्रणालीचे बटन ऑन करा आणि हाताने हलवून धुवून काढा. 5. उरलेले पाणी मिश्रणात टाकावे. 6. मिश्रणाचा उपयोग करते वेळी ते हलवत राहावे. 7. मिश्रण तयार केल्यावर ते 24 तासांच्या आत उपयोगात आणावे.

वापराची पद्धत: 1. वर सांगितल्याप्रमाणे काढा तयार करावा. 2. भांडयामध्ये बिज टाकून द्या. 3. बिजांना मिसळून घ्या. 4. बिजांमध्ये मिश्रणाची अपेक्षित मात्रा टाकून ते बिजांना लागू द्यावे. 5. हे जवळपास 30 सेकंद ते एक मिनीट पर्यंत राहून द्यावे जेणेकरून हे एक समानपणे उपचारित होवू शकेल. अधिक वेळ पर्यंत मिसळल्याने विजांवर जखमा होतील आणि धूळ जमा होईल.

प्रयोगाची वेळ:

प्रथमोपचार: प्रभावित व्यक्तिला प्रदूषित जागेपासून हवेशीर खोली किंवा मोकळ्या हवेत घेऊन जावे आणि तापमानापासून सुरक्षित ठेवावे. विषबाधेची लक्षणे दिसून आल्यावर त्वरित डॉक्टरांना बोलवा. त्वचेवर लागल्यानंतर प्रदूषित कपडे उतरवा आणि शरीराच्या प्रभावित भागांना साबण आणि पाण्याने चांगल्याप्रकारे धुवा. डोळ्यात गेल्यानंतर डोळे थोडा वेळपर्यंत स्वच्छ पाण्याने चांगले थपथपून धुवावे. पोटात गेल्यास पाण्यात मेडिसिनल चारकोल पुरेशा प्रमाणात मिसळून वारंवार द्यावे. **सूचना:** बेशुद्ध रुग्णाला कधीही तोंडावाटे काहीही देऊ नये. उलटी करवण्याचा प्रयत्न करु नये.

लक्षण: विषाची कारणे शरीरात ढिलेपणा, मिर्गी सारखे झटके आणि प्टोसिस होवू शकते.

प्राथमिक चिकित्सा: प्रभावित व्यक्तीला प्रदूषित जागेपासून हवेशीर खोली किंवा मोकळया हवेत घेवून जावे आणि तापमानापासून बचाव करावा. त्वचेवर लागल्यास प्रदूषित कपडयांना काढून टाकावे आणि प्रभावित भाग चांगल्या पाण्याने आणि साबणाने धुवून काढावा. डोळयामध्ये गेल्यास काही वेळ पर्यंत स्वच्छ पाणी मारावे. खाण्यात गेल्यास पाण्यात मेडिसिनल चारकोलचे भरपूर प्रमाणात द्यावे. **सूचना:** मुर्छित रुग्णाला तोंडावाटे काहीही देवू नये. उलटी करण्याचा प्रयत्न करु नये.

विषनाशक: कोणतेही विष प्रतिरोधक नाही. लक्षणानुसार उपचार करावा.

झाडांना विषबाधा: निर्धारित प्रमाणात प्रयोग केलात तर झाडाला विषबाधा होत नाही.

रिकाम्या डब्यांचा निपटारा: 1. पर्यावरणाला प्रदूषणापासून वाचवण्यासाठी डबे, शिल्लक द्रावण/पदार्थ, मशीन धुतल्याचे पाणी आणि रिकाम्या डब्यांचा निपटारा सुरक्षित ठिकाणी करावा. 2. वापरासाठी डबे/पाकिटे तशीच उघड्यावर टाकू नयेत. अशाप्रकारे त्यांचा पुन्हा वापर केला जाऊ शकतो. 3. डबे/पाकिटे तोडून वस्तीपासून दूर जगिनीत गाडून टाकावीत.

संग्रह करण्याच्या अटी: 1. कीटकनाशकांचे डबे हे इतर सामुग्री किंवा खाण्यापिण्याच्या खोलीपासून दूर ठेवावे आणि डबे बंद खोलीमध्ये व कुलुपबंद वेगळया आलमारित ठेवावे. 2. कीटकनाशक ठेवलेली खोली हवेशीर असावी त्यात भरपूर प्रकाश यावा, त्यात सूर्यप्रकाश असावा. जागा मोकळी असावी आणि ती प्रदूषणापासून दूर असावी.

रासायणिक संरचना:

थायामेथोक्साम स.त.	30.00 % भार / भार
ब्युटनोलचा कोपालिमर	4.30 % भार / भार
ग्लिसरीन	5.10 % भार / भार
1,2 – बेन्जीसोथैयजोल–3–ओन	0.20 % भार / भार
मोनाजो डाय (इरग्लिथ रेड सी 2बी)	3.40 % भार / भार
पालीथिलीन ग्याइकोल	2.60 % भार / भार
पाणी	पुरेशी मात्रा % भार / भार
एकूण	100.00 % भार / भार

खबरदारी : लेबल व पत्रकांवर लिहून दिलेल्या पिकांखेरीज इतर पिकांवर वापरू नये. पत्रकावर सांगितल्याप्रमाणे वापरल्यानंतर कंटेनर नष्ट करा.

" रिकामे कंटेनर पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे."

ஸில்க்கி

தயாமெத்தோக்ஸம் 30% எ.ப் எஸ்

உள்ளுக்குள் பரவும் பூச்சிமருந்து

সিল্কি

থায়োমিথোক্সাম 30% এফ এস

(সিস্টেমিক ইনসেক্টাসাইড)

ব্যবহারের আগে পত্রিকা পড়া

থায়োমেথাক্সাম 30 শতাংশ এফ এস একটি বহুপযোগী সিস্টেমিক কীটনাশক বীজ যা দিয়ে শোধন করার ফলে ফসলের শুরুতেই শোষক পোকা নিয়ন্ত্রণ করে। এর উপযুক্ত মাত্রা কার্পাসের ফসলে লাগা তেলা. জাব পোকা এবং সাদা মাছি প্রতিরোধ. জোয়ার এবং ভুট্টাই শুট ফ্লাই . গমে উইপোকা. ভেন্ডি তে তেলা পোকা, ধানে চুরদা. GLH এবং শূককীট, সূর্যমুখীতে জাব পোকা এবং চুরদা, সয়াবিনে স্টেম ফ্লাই এবং লঙ্কায় চুরদা প্রতিরোধ করে। শোষক পোকার উপর দ্রুত কার্যকারিতার জন্য. এটি পাতার কোঁকড়ানো রোগ ভাইরাস ছড়িয়ে পড়া রোধ করে।

ব্যবহারঃ

ফসল	কীটের নাম	প্রতি হেক্টরে মাত্রা			শেষ ছেটানোর সময় এবং ফসল কাটার মধ্যে সময়ের ব্যবধান (দিন)	পুনঃ প্রবেশের সময়কাল প্রত্যেকবার স্প্রে করার পর (ঘন্টা)
		এ.আই. (গ্রাম প্রতি কেজি বীজে)	ফর্মুলেশন (মি.লি. প্রতি কেজি বীজে)	জলের পরিমাণ (লি)		
কার্পাস	তেলা. জাব পোকা, সাদা মাছি	3	10.0	-	বীজ প্রস্তুতির জন্য এটি ব্যবহৃত হয়	-
জোয়ার	মাছি	3.0	10.0	-	-	-
ভেন্ডি	জাব পোকা	1.7	5.7	-	-	-
ভুট্টা	মাছি	2.4	8.0	-	-	-
গম	উই পোকা	1.0	3.3	-	-	-
ধান	চুরদা, GLH, শূককীট	0.9	3.0	-	-	-
সূর্যমুখী	জাব পোকা, চুরদা	3.0	10.0	-	-	-
লঙ্কা	চুরদা	2.1	7.0	-	-	-
সয়াবিন	স্টেম ফ্লাই	3.0	10.0	-	-	-

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান

ব্যবহারের বিধিঃ ছোট গুচ্ছের জন্য থিয়ামেথোক্সাম 30% কে খণ এর সঙ্গে 10-20 মিলি জল মেশান, যা প্রতি কেজি বীজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ঘন মিশ্রনকে বীজের সঙ্গে মিশিয়ে কোন পাত্রে (প্লাষ্টিক এর পিপে বা থলি) নিয়ে ভালো করে ততক্ষন নাড়ান (সাধারণত এক মিনিটের কম) যতক্ষন না বীজ ভালো করে থিয়ামেথোক্সাম 30% এর সঙ্গে মিশে যায়। এই থিয়ামেথোক্সাম 30% এফ এস কে মিশ্রনের আকারে ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এই সময় বানিজ্যিক বীজ উপচার যন্ত্র সব সময় চালাতে হবে। এটি তৈরির পদ্ধতি নীচে দেওয়া হল।

1. মিশ্রন বানানোর পাত্রে প্রয়োজনের তুলনায় অর্ধেক জল ঢালুন। 2. উপযুক্ত মাত্রায় থিয়ামেথোক্সাম 30% এফ এস কে নাড়াতে নাড়াতে মেশান। 3. উপাদনটিকে ছড়িয়ে পড়তে দিন। 4. ম্যানুয়ালি মেশান বা নাড়ানোর যন্ত্র ব্যবহার করুন। 5. অবশিষ্ট জল দিয়ে টপ আপ করুন। 6. মিশ্রন প্রয়োগের সময় সেটিকে নাড়াতে থাকুন। 7. মিশ্রন তৈরির 24 ঘন্টার মধ্যে তার ব্যবহার করুন।

ব্যবহারের পদ্ধতিঃ 1. উপরে বলা পদ্ধতি অনুযায়ী মিশ্রণ তৈরি করুন। 2. পাত্রে বীজ গুলি ঢালুন। 3. বীজগুলি মেশাতে শুরু করুন। 4. উপযুক্ত মাত্রায় মিশ্রণ ঢেলে বীজে মিশতে দিন। 5. এটিকে 30 সেকেন্ড থেকে এক মিনিট সময় ধরে রাখুন যাতে তা ভালো ভাবে মিশ্রিত হয়ে যায়। বেশী সময় ধরে মেশালে বীজে ধূলো আকারে জমতে পারে।

প্রয়োগের সময়ঃ

ব্যবহারকারীদের জন্য সতর্কতাঃ ছেটানোর কাজে খাদ্য তৈরির কাজে লাগে এমন পাত্রের প্রয়োগ করবেন না। মিশ্রণকে নাড়ানোর জন্য কাঠির ব্যবহার করুন। ত্বক, চোখ এবং জামাকাপড়ের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন। এর বাস্পকে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করবেন না। ত্বকের সংস্পর্শ এড়াতে গ্লাভস ব্যবহার করুন। ঢাকা দেওয়া জামাকাপড়, মুখোশ, গগলস এবং বুট জুতো পরুন। প্রোডাক্ট টি ব্যবহারের সময় খাদ্য দ্রব্য, পানীয় গ্রহণ এবং ধূমপান করবেন না। কাজ শেষ হলে হাত সাবান দিয়ে এবং প্রচুর জল দিয়ে ধুয়ে নিন, জামা কাপড় পালটে ফেলুন। দূষিত পোশাকগুলি কেচে নিন।

লক্ষণঃ বিষক্রিয়ার লক্ষণ হল দেহে দূর্বলতা, মৃগীর মতো ঝটকা এবং টোসিস।

প্রাথমিক চিকিৎসাঃ প্রভাবিত ব্যক্তিকে দূষিত স্থান থেকে খোলা হাওয়া বা হাওয়া যুক্ত ঘরে নিয়ে যান ও তাপমাত্রা থেকে বাঁচান। বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দেওয়া মাত্রই অবিলম্বে ডাক্তার ডাকুন। ত্বকে লাগলে দূষিত কাপড় ছাড়িয়ে দিন এবং শরীরের প্রভাবিত অংশ সাবান ও জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে দিন। চোখে গেলে পরিষ্কার জল দিয়ে কিছুক্ষণ চোখে ঝাপটা মারুন। খেয়ে ফেললে, জলে মেডিসিনাল চারকোল যথেষ্ট মাত্রায় গুলে বার বার খাওয়ান। **দ্রষ্টব্যঃ** অজ্ঞান হয়ে যাওয়া রুগীকে কখন মুখ দিয়ে কিছু খাওয়ানো উচিত নয়। বমি করানোর চেষ্টা করবেন না।

বিষনাশকঃ কোন বিশেষ বিষ নাশক নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিসা করুন।

উদ্ভিদ বিষক্রিয়তাঃ সঠিক মাত্রায় ব্যবহার করলে উদ্ভিদ বিষাক্ত হয় না।

খালি প্যাকেট বর্জনঃ 1. যাতে পরিবেশ দূষণ না হয় তার জন্য বেঁচে যাওয়া খোল/সামগ্রী, মেশিন ধোয়া জল এবং খালি প্যাকেট সুরক্ষিত স্থানে বর্জন করুন। 2. ব্যবহৃত পাত্র/প্যাকেট বাইরে ফেলে রাখবেন না। যাতে তা পুনরায় না প্রয়োগ করা যায়। 3. পত্র/প্যাকেট ভেঙ্গে, গুঁড়িয়ে জনবসতি থেকে দূরে মাটিতে পুঁতে ফেলা উচিত।

সংরক্ষণের শর্তাবলীঃ 1. কীটনাশকের পাত্রকে খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা স্থানে সংরক্ষন করবেন না। এটিকে আলাদা ঘরে বা আলাদা ভাবে তালাবন্ধ আলমারিতে রাখুন। 2. এই ধরণের কক্ষ মজবুত. শুকনো, সূর্যালোক বা হাওয়া চলাচল করতে পারে এবং বাষ্প থেকে যাতে দূষণ না ছড়ায় তা দেখতে হবে।

রাসায়নিক গঠন ঃ

থিয়ামেথোক্সাম এ আই	30.00% w/w
বুটানোলের কোপলিমার	4.30% w/w
গ্লিসারিন	5.10% w/w
1,2 বেঞ্জিসোথিয়াজোল-3-ওয়ান	0.20% w/w
মোনাজো ডাই (ইরগালিথ রেড C2B)	3.40% w/w
পলিইথিলিন গ্লাইকল	2.60% w/w
জল	পর্যাপ্ত মাত্রা% w/w
মোট	100.00% w/w

সতর্কতা: লেবেল এবং লিফলেটগুলিতে নির্দিষ্ট করা ছাড়া অন্য ফসলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন না। ব্যবহারের পরে লিফলেটে দেওয়া নির্দেশাবলী অনুসারে পাত্রটির নিস্পত্তি করুন।

"খালি পাত্র ব্যবহার করা বিপজ্জনক"

DIRECTION FOR USE

FOR AGRICULTURAL USE

कृषि उपयोग के लिए

Read Leaflet Before Use

इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

SILKY™

Thiamethoxam 30% FS

(Systemic Insecticide)

सिल्की

थायामेथोक्साम ३०% एफ एस

(अंतप्रवाही कीटनाशक)

Marketed by:
GHARDA CHEMICALS LIMITED
Regd. Office: Gharda House, 48 Hill Road,
Bandra (W), Mumbai - 400 050. INDIA

Manufactured by:
Saraswati Agro Chemicals (India) Pvt. Ltd.
Regd. Office: Village Dao Majra, Kharar Kurali Road,
Distt. S.A.S. Nagar (Mohali), Punjab - 140301.
Factory: Lane-2, Phase-1, SIDCO Industrial Complex,
Bari Brahmana, Distt. Jammu-181133 (J&K)

विक्रेता: घरडा केमिकल्स लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: घरडा हाउस , ४८ हिल रोड,
बांद्रा (प), मुंबई – ४०० ०५०. भारत

निर्माता : **सरस्वती एग्रो केमिकल्स (इंडिया) प्रा. लि.**
रजि. ऑफिस: गाँव दाव माजरा, खरड़ कुराली रोड,
जिला एस.ए.एस. नगर (मोहाली),पंजाब–१४०३०१.
फैक्ट्री: लेन–२, फेस–१, सिडको इण्डस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स,
बारी ब्राम्हना, जिला जम्मू–१८११३३ (जे एण्ड के)

For any complaints, contact Customer Care Executive at Gharda Chemicals Limited, Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400050. INDIA
Tel.: 022 66265998 / 66265999
Email: consumercare@gharda.com
Website: www.gharda.com

TM-Trademark of Gharda Chemicals Limited

JM.03.26-01